



Boc
7125.2.40

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

H. A. Hagen library.

No. 23,584.

May 12, 1904.

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE
BELGIQUE



BRUXELLES
P. WEISSENBRUCH, IMP. DU ROI
45, RUE DU POINÇON

BULLETIN

OU

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE

BELGIQUE

ANNÉE 1884

BRUXELLES

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE

—
1884

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE BELGIQUE.

Série III. — N° 44.

Assemblée mensuelle du 5 janvier 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, De Raeck, Determe, Devaux, Donner, Du Pré, Fologne, Jacobs, Lallemand, Lameere, Remy, Vanden Branden, Vandervelde, Van Rossen, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. Bergé, Capronnier, H. Donckier de Donceel, Duvivier et Kerremans ont fait excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures, dans la salle des séances de la Commission de la Carte géologique, rue de Ruysbroeck, 44.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 1^{er} décembre 1883 est approuvé.

Le Président annonce que le Comité d'administration s'est constitué en choisissant pour vice-président M. Weinmann, et en continuant MM. Fologne et Preudhomme de Borre dans leurs fonctions de trésorier et de secrétaire-bibliothécaire. M. Lallemand a été nommé secrétaire adjoint, et M. Vanden Branden a été désigné pour les fonctions de bibliothécaire adjoint.

Ainsi qu'il avait déjà été annoncé à notre assemblée générale, le Gouvernement, à la suite de l'incendie du Palais de la Nation, a interdit l'éclairage dans plusieurs édifices publics, notamment dans le Palais des Musées, où notre Société jouissait depuis plus de vingt-cinq ans d'une salle pour ses réunions. M. le Directeur du Musée Royal d'Histoire naturelle, garant des engagements de l'État vis-à-vis de notre Société, s'est gracieusement empressé de mettre provisoirement à notre disposition, dans un local voisin du Musée, la salle des séances de la Commission de la Carte géologique.

L'assemblée vote des remerciements à M. le Directeur du Musée et décide que des démarches seront faites auprès du Gouvernement afin de faire valoir les droits que nous donne la convention du 27 septembre 1868, et d'obtenir une salle de séances plus spacieuse que celle où l'hospitalité nous est provisoirement accordée.

Le Président annonce que le Conseil a reçu les démissions de MM. Coulon, membre effectif, et Branquart, associé. Il a admis deux nouveaux membres effectifs : M. H. De Le Court, jusqu'alors associé, sur sa demande, et M. T. Vernieuwe, employé au Ministère de l'Intérieur, à Schaerbeek, présenté par MM. Lameere et Preudhomme de Borre. A été admis comme membre associé, M. Mathias Kraus, instituteur communal à Luxembourg, présenté par MM. Preudhomme de Borre et H. Donckier de Donceel.

Correspondance.

La Société Royale Linnéenne nous adresse un programme de conférences.

La Société Zoologique Natura Artis Magistra, d'Amsterdam, l'Académie Royale Danoise des Sciences et des Lettres, le *Geological Survey*, à Washington et la Rédaction de la Revue *Science*, à Cambridge, nous remercient pour l'envoi de nos publications.

Les Sociétés Scientifique Argentine et des Sciences naturelles de Carlsruhe et la Direction du Musée de Gênes nous annoncent l'envoi de leurs publications.

La Rédaction d'un nouveau recueil américain : *Science Record*, demande à entrer en relation d'échange de publications. — L'assemblée décide que nos Comptes-rendus lui seront adressés.

La Société a reçu un catalogue de Lépidoptères à vendre chez J. Anderegg à Gamsen, près Brieg (Valais), un catalogue d'objets d'histoire naturelle du Dr Schaufuss, à Dresde, un numéro du *Mésos*, des catalogues de livres de Friedländer, Wesley et Calvary.

Rapports, lectures, communications.

M. le Dr Dugès envoie du Mexique le manuscrit d'un travail

accompagné de figures et ayant pour titre : *Métamorphoses du Tropisternus lateralis Fabr.* MM. Sharp et Preudhomme de Borre sont chargés de l'examiner.

M. de Borre présente un travail ayant pour titre : *Tentamen Catalogi Glomeridarum hucusque descriptarum.* — Rapporteurs : MM. Plateau et Mac Leod.

M. de Selys-Longchamps donne lecture des deux notes suivantes, la première de M. Mac Lachlan, la seconde de lui-même :

DESCRIPTION

DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE GOMPHINES ORIENTALES

par M. R. MAC LACHLAN, F. R. S.

Macrogomphus thoracicus Mac Lachl., n. sp.

♀. Abdomen, 56 mill.; aile inférieure, 55 mill.

♂. Inconnu.

♀. Ailes hyalines (une très légère indication brunâtre à leur base extrême). Réticulation noire y compris la nervure costale. Ptérostigma très long (de 6 1/2 mill.) non dilaté, brun cendré surmontant 8 cellules; 21 antécubitales et 13-14 postcubitales aux supérieures.

Tête grande (large de 11 1/2 mill.), noir luisant, excepté la lèvre inférieure et les lobes latéraux jaunâtres (la lèvre même entourée de noir) et une bande transversale (imprimée au milieu) jaune pâle au front devant les ocelles. Lane de l'occiput étroite, le bord à peine évidé avec une très petite dent triangulaire au milieu. Derrière de la tête également noir.

Prothorax noir, excepté une petite tache et le bord antérieur étroitement jaunes. Thorax noir, marqué de jaune citron ainsi qu'il suit : les deux tiers inférieurs du devant jusqu'au bord mésothoracique (ce dernier restant noir vis-à-vis du prothorax) et la bande citron se continuant sur le premier espace latéral après la suture humérale, qui est très étroitement noirâtre; enfin, une tache ovale assez grande au centre du dernier espace latéral. Les deux parties latérales citron dont je viens de parler, sont largement séparées par le fond noir, mais chacune d'elles offre un petit prolongement pointu dirigé l'un vers l'autre au niveau du stigmate. Espace interalaire avec une bande maculaire citron.

Abdomen noir. Le 1^{er} segment presque en entier, les 2-7^e avec une très grande tache jaune antérieure, mais ne touchant pas le bord postérieur, excepté au 2^e, ces taches occupant au moins le tiers de chaque segment (la moitié au 2^e); l'arête dorsale étroitement noire

(excepté au 2°); les 8-10° noirs en entier. Le 9° presque aussi long que les 7° et 8° réunis (long de 8 mill.); le 10°, très court (de 2 mill.) plus large que long. Vus de profil, les 9-10° sont un peu courbés en bas et amincis. Appendices anals aussi longs que le 10° segment, noirs, très pointus. Écaille vulvaire nulle (ou rudimentaire).

Pieds noirs, les fémurs un peu jaunâtres; ongles jaune verdâtre à pointe obscure.

Patrie : Perak (Péninsule de Malacca), une femelle unique. Coll. Mac Lachlan.

Cette superbe espèce diffère du mâle du *M. quadratus* Selys, de Sumatra, par la taille plus forte, le ptérostigma beaucoup plus long et la bande citron du devant du thorax prolongée sur le premier espace latéral; enfin par la tache jaune du dernier espace plus grande.

Cependant il subsistera un léger doute sur la distinction des deux espèces tant que la femelle du *quadratus* et le mâle du *thoracicus* resteront inconnus (voir plus bas la comparaison avec la femelle du *M. abnormis* par M. de Selys).

Gomphus abdominalis Mac Lachl., n. sp.

♂. Abdomen, 50 mill.; aile inférieure, 37 mill.

Ailes hyalines; réticulation noire, nervure costale jaune en dehors; ptérostigma jaune (long de 3 1/2 mill.) surmontant 3 cellules 12; 13 antécubitales et 10-11 postcubitales aux supérieures.

Tête jaune clair presque en entier, excepté les mandibules, et une large bande noire en dessus, entre les yeux, renfermant les ocelles. (La suture basale de la lèvre supérieure étroitement noire.) Lane de l'occiput jaune, large, son bord entier, subarrondi, presque droit, à poils cendrés, longs. Derrière de la tête jaune, noir seulement contre la lane occipitale.

Prothorax jaune avec une bande transverse antérieure assez large, ne touchant pas la base et la suture basale du lobe postérieur noirs; celui-ci arrondi, un point très enfoncé de chaque côté de la partie médiane. Thorax d'un jaune un peu olivâtre, revêtu de poils cendrés, avec des dessins noirs ainsi qu'il suit: un collier transverse assez large près du prothorax, renfermant une petite tache jaune de chaque côté; les lignes médianes confluentes formant ainsi une seule ligne assez étroite amincie en avant et renfermant la crête dorsale jaune (mais cette crête noire en arrière, où elle devient fourchue vers les sinus antéalaïres); les lignes antéhumérales et humérales rapprochées, parallèles, étroites, les antéhumérales ne touchant pas le haut; subitement amincies dans leur moitié supérieure, elles sont plutôt brunâtres que noires. Sur les

côtés, on voit une petite ligne inférieure étroite et la suture médiane également et étroitement noire, se continuant sous la base des ailes. Espace interalaire jaune, à sutures noires. Poitrine jaune.

Abdomen long, un peu déprimé, étranglé au 3^e segment, aminci vers le bout. Oreillettes grandes, très proéminentes, semicirculaires jaunes. Les hameçons des parties génitales du 2^e segment larges à la base, assez subitement amincis ensuite, l'extrémité fortement recourbée en crochet noir, le lobe postérieur noir. La couleur de l'abdomen est jaune un peu olivâtre comme le reste du corps; le dessus marqué de chaque côté d'une bande longitudinale irrégulière interrompue noire, épaissie dans la partie postérieure de chaque segment jusqu'au 6^e, formant en dedans une petite dent noire à son dernier quart. Cette bande plus complète et régulière sur les 7-10^e segments; les sutures transverses noires. De profil, on voit un trait postérieur noirâtre aux 4-7^e segments, rejoignant obliquement la bande et une autre bande noire le long de la suture ventrale.

Appendices anals supérieurs très divariqués, un peu plus longs que le dernier segment, noirs, assez robustes; leur bout coupé obliquement, la pointe interne prolongée et aiguë. Appendice inférieur de même longueur, ses branches aussi divariquées que les appendices supérieurs, jaune à la base en dessous, mais les branches, qui sont larges et obtuses et un peu recourbées en haut, sont noirâtres au bout.

Pieds jaunâtres, l'intérieur des premiers fémurs, une bande à l'intérieur des seconds dans leur moitié apicale et l'intérieur des fémurs de la troisième paire, le bout de tous, le dessous des tibias et les tarses (excepté une tache jaune à l'intérieur du premier article) noirs. Onglets bruns. Les fémurs et les tibias garnis de petites dents. Pieds postérieurs très longs (fémurs : 10 mill.).

♀. Inconnu.

Patrie : Intérieur de la Chine septentrionale. Un mâle unique. Coll. Mac Lachlan.

C'est l'une des plus grandes espèces du sous-genre *Gomphus* proprement dit. Elle n'a pas d'analogie avec les espèces particulières au Japon et à la Sibérie orientale. Par les dessins du thorax, elle ressemble beaucoup au *pulchellus* d'Europe, dont elle paraît en effet voisine, s'en distinguant par sa grande taille, l'absence de ligne noire à la suture entre le front et le nasus, la lame occipitale subarrondie non bordée de noir, le prothorax beaucoup plus jaune, la première ligne latérale des côtés du thorax incomplète, les taches dorsales jaunes formées par les deux bandes noires latérales des 4-7^e segments beaucoup plus larges, rappelant un peu celles de la femelle de l'*Onychogomphus forcipatus*.

La grande taille, la face jaune et le peu de lignes noires des côtés du thorax donnent à l'*abdominalis* une physionomie rappelant le *pallidus* de l'Amérique septentrionale ; mais il n'y a pas là d'affinité, ces espèces appartenant à deux groupes différents.

DIAGNOSE D'UN NOUVEAU MACROGOMPHUS

par M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Macrogomphus abnormis Selys, n. sp.

♀. Abdomen, 56-58 mill.; aile inférieure, 56-59 mill.

♂. Inconnu.

♀. Très voisin du *M. quadratus* Selys (4^{es} Addit. au Syn. des Gomphines, n° 1^{bis}) de Sumatra, dont le mâle est seul connu. Elle n'en diffère que par ce qui suit :

1^o Taille beaucoup plus grande; ptérostigma noir un peu plus long, surmontant 7 cellules, par conséquent une ou deux de plus. Aux supérieures 19-23 antécubitales et 16-27 postcubitales, nombres un peu plus grands que chez le *quadratus* ;

2^o Les triangles ont une tendance manifeste à être irrégulièrement traversés par une nervule, ce qui est une chose tout à fait anormale dans la légion des *Gomphus*. Ainsi, l'un de mes deux exemplaires montre cette transversale aux triangles discoïdaux des deux ailes supérieures ; — chez l'autre, ce triangle est traversé à l'aile supérieure droite seulement ; mais il l'est également à l'aile inférieure gauche ;

3^o La large bande transverse jaune citron qui occupe plus de la moitié inférieure du devant du thorax est prolongée *sans interruption à travers tous les espaces* des côtés du thorax.

Patrie : Probablement Bornéo. Je la dois à la générosité de M. van Lansberge.

N. B. Il est possible que les *M. quadratus*, *thoracicus* et *abnormis* soient trois formes locales d'une même souche, telles qu'on en observe chez beaucoup d'Odonates de la Malaisie.

Les mâles du *thoracicus* et de l'*abnormis* étant inconnus, je ne puis comparer entre elles que les femelles de ces deux formes.

L'*abnormis* femelle est distinct du *thoracicus* par ce qui suit :

1^o La taille encore plus forte ; mais le ptérostigma *notablement plus court* ;

2^o La bande citron du devant du thorax prolongée *sans interruption à travers les trois espaces* des côtés. Chez le *thoracicus*, la suture humérale est noirâtre et sur les côtés la bande citron n'est prolongée que dans le premier espace, reparaissant seulement sous forme de tache dans le troisième.

M. de Borre demande la parole et lit le travail suivant :

NOTE SUR LES GLOMÉRIDES DE LA BELGIQUE.

Les Myriapodes de notre pays n'ont guère attiré jusqu'ici l'attention des collectionneurs et partout, en réalité, ils sont un des groupes d'Articulés dont la science compte le moins d'adeptes.

Un premier jalon a été posé en 1872 par notre savant collègue, M. le professeur F. Plateau, qui a publié une note ⁽¹⁾ résumant l'état de ses connaissances sur les Myriapodes belges, étant le seul qui jusqu'alors s'en fût occupé. Mais ce travail, ainsi que l'auteur en convenait lui-même, ne pouvait être qu'un premier essai, forcément incomplet, ainsi que l'est tout travail dont l'auteur a dû se procurer les matériaux par ses seuls efforts, sans l'assistance de nombreux chasseurs et de riches collections, comme nous pouvons le faire pour les principaux ordres d'insectes.

Si, ayant aujourd'hui occasion de m'occuper de ces Articulés douze ans plus tard, j'ai quelque chose à ajouter aux laborieuses recherches de mon savant ami, mon travail restera toujours bien loin de ce que devrait être une étude complète des Myriapodes belges, car, de 1872 à 1884, pas plus qu'avant 1872, nous n'avons vu chez nous les recherches se porter davantage vers ce groupe d'animaux si délaissés.

C'est la mise en ordre des Myriapodes de notre Musée Royal qui m'a fourni cette occasion et jusqu'ici je n'ai examiné que les *Glomeris*, seul genre indigène de la petite famille des Glomérides.

Comme je viens de le faire entendre, mon impression capitale est que ce qui manque pour une connaissance plus parfaite de ce groupe d'animaux, c'est qu'il ait été travaillé par un plus grand nombre de personnes. Il ne suffit pas que deux ou trois savants de premier ordre aient traité le sujet; il faut aussi que leurs travaux aient été soumis au contrôle minutieux et quotidiennement répété de beaucoup d'amateurs; quand il en aura été ainsi, les Myriapodes seront connus comme le sont les Coléoptères ou les Lépidoptères, mais pas auparavant. Si savant que soit le maître qui occupe la chaire, il lui faut des élèves.

Certes, il y a eu des travaux d'auteurs compétents, et la littérature des Myriapodes d'Europe forme déjà une petite bibliothèque. Leach, Brandt, Gervais, les deux Koch, Meinert, Stuxberg, Plateau, Fanzago, Fedrizzi, Cantoni ont consacré assez bien de

(¹) *Matériaux pour la Faune belge. Deuxième note. Myriapodes* (Bull. de l'Académie royale de Belgique, 2^e série, XXXIII, n^o 5).

travaux (1) à leur examen ; mais ils n'ont guère été suivis et nous ne voyons pas des collectionneurs de Glomérides en nombre suffisant pour avancer par leurs chasses les études faunistiques sur ce petit groupe.

Pour ces petits animaux, il y aurait d'ailleurs autre chose à faire que de les chasser pour en former des collections. La science a besoin d'études biologiques à leur sujet, et la taxonomie réclame elle-même ces études, car, nonobstant tous les travaux dont ils ont été l'objet, on est encore bien loin d'être d'accord sur le nombre de leurs espèces en Europe, sur la valeur spécifique ou non spécifique de certaines formes qui ne sont peut-être que des races locales ; il n'est pas même établi que certaines différences dans la taille, la couleur et même d'autres caractères, ne sont pas dues au sexe ou à l'âge.

Les rares études que font un petit nombre de zoologistes sur la faible quantité de *Glomeris* renfermés dans quelques collections,

(1) LEACH. — *A tabular View of the external Characters of Four Classes of Animals, which Linné arranged under Insecta*, etc. (Transact. Linn. Soc., XI, 1814, p. 306.)

BRANDT. — *Tentaminum quorundam monogr. Prodromus* (Bull. Soc. Natur. de Moscou, VI, 1833.

— *Recueil de Mémoires relatifs à l'ordre des Insectes Myriapodes et lus à l'Acad. Impér. des sciences de Saint-Pétersbourg*, 1844.

GERVAIS. — *Études pour servir à l'histoire naturelle des Myriapodes* (Ann. des Sciences naturelles. Série II, Zool., vol. VII, et Série III, Zool., vol. II).

— et WALCKENAER. — *Histoire naturelle des Insectes. Aptères*, IV. Paris, 1847 (Suites à Buffon).

KOCH (C.-L.). — *Deutschlands Crustac., Myriap. und Arachn.* — Ratisbonne, 1844.

— *System der Myriapoden*. — Ratisbonne, 1847.

— *Die Myriapoden getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben*. — Halle, 1863, 2 vol.

KOCH (LUDW.). — *Zur Arachniden- und Myriapoden-Fauna Sud-Europas* (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII).

MEINERT (F.). — *Danmarks Chilognather* (Naturh. Tidsskr., 3^e sér., V). — Kopenhague, 1868.

STUXBERG (A.). — *Sveriges Chilognather* (Oefvers. Vet. Akad. Förhandl., 1870).

PLATEAU (F.). — *Op. supra citat.*

FANZAGO (F.). — *Sui Chilognati Italiani* (Atti Soc. Veneto-Trentina di Sc. naturali, III).

FEDRIZZI (G.). — *Miriapodi del Trentino* (Ann. Soc. Natur. Modena, XI et XII).

CANTONI (E.). — *Miriapodi di Lombardia* (Atti Soc. Ital. Scienze natur., XXIII).

n'ont pas, pour la solution de ces questions litigieuses, l'efficacité qu'aurait l'application au sujet d'un grand nombre d'amateurs, les recherchant et les observant, soit en liberté, soit confinés dans des vivarium, où ils se nourrissent très bien. Brandt, dans un mémoire lu à l'Académie de Saint-Petersbourg, le 18 décembre 1841 (*Recueil de Mémoires relatifs, etc.*, p. 161), nous a relaté ses propres observations sur des *Glomeris* conservés en captivité et donné des conseils sur les procédés pratiques à employer pour ces observations. A notre époque, ces observations devraient être répétées en divers lieux, et la science en obtiendrait assurément et rapidement des résultats fort désirables sur les points encore douteux de leur histoire naturelle.

Pour mieux engager nos jeunes collègues à aborder cette étude, je pense qu'il convient d'abord de leur donner un caractère qui leur permette de reconnaître à première vue et sans hésitation possible un *Glomeris*.


Les *Glomeris*, s'ils ne le savent pas déjà, sont des Myriapodes Chilognathes, de forme courte et un peu épaisse, vivant dans les endroits humides, dans les forêts surtout, circulant lentement sur le sol et rappelant fort par leur facies les Cloportes, de la classe des Crustacés, dont leur organisation est cependant bien éloignée. Il serait d'autant plus aisé à un débutant de confondre les Glomérides et les Cloportides, que les *Armadillidium*, un genre de ceux-ci, ressemblent aux *Glomeris* d'une manière surprenante et ont, comme eux, la faculté de se ramasser en boule, ne présentant plus de toutes parts que la surface de leur bouclier dorsal annelé, lorsqu'on les inquiète. De nombreux caractères les séparent pourtant. En voici un d'usage très aisé et qui suffira seul :

Chez l'*Armadillidium*, et généralement chez tout Cloportide, le bouclier dorsal se termine en arrière par plusieurs segments plus étroits, concentriquement excavés, et la dernière excavation est occupée par une pièce de forme irrégulièrement pentagonale, laissant de chaque côté un vide que vient remplir une petite pièce latérale ou lamelle insérée un peu plus bas.

Chez le *Glomeris*, le dernier arceau dorsal est très grand, très bombé, arrondi à son bord postérieur ; c'est un véritable capuchon qui vient recouvrir la tête quand l'animal fait la boule.

Ce seul caractère permettra, sur le terrain de chasse même, de ne pas prendre pour des *Glomeris* les *Armadillidium*, beaucoup plus communs chez nous.

Quatre formes spécifiques ou subs spécifiques peuvent actuellement être indiquées en Belgique.



1. *Glomeris annullata* Brandt.

Ne l'ayant point vu, je ne le cite que d'après M. Plateau, qui en a pris un exemplaire aux environs de Gand.

Il est noir. Les anneaux de son bouclier dorsal sont largement marginés en arrière et sur les côtés de brun rougeâtre, devenant plus pâle chez les individus desséchés ou conservés quelque temps dans l'alcool. Sa taille est plus petite que celle de la plus commune de nos espèces, le *Gl. marginata*; enfin, d'après Koch (*Die Myriapoden*, I, Tab. I, f. 1), il se distingue de tous les autres *Glomeris* en ce que la lame collaire ou corselet, c'est-à-dire la plaque en arrière de la tête, dans l'échancrure antérieure du premier anneau dorsal, est absolument dépourvue de strie transversale. Le premier anneau du bouclier dorsal a de chaque côté trois stries, dont la première va rejoindre celle du côté opposé; les suivantes sont raccourcies (¹).

2. *Glomeris marginata* Villers.

Gl. limbata. Oliv., Latr. et autres.

Plus grand, également noir, avec les bordures claires des segments plus étroites. Trois stries transverses sur la lame thoracique. Quant aux stries des côtés du premier anneau dorsal, je ne leur ai pas trouvé assez de fixité en nombre et en forme pour les employer comme caractère.

Cette espèce est très commune chez nous, ainsi que M. Plateau l'avait constaté, et son habitat s'étend aux environs de Bruxelles. Je n'ai pu vérifier s'il est exact de dire, comme M. Plateau, que le *Gl. annullata* la remplacerait dans les Flandres. Voici les localités d'où proviennent les exemplaires de la collection du Musée Royal de Belgique :

BRABANT : La Cambre, Groenendael, Rhode-Saint-Genèse, Rouge-Cloître, Saventhem.

HAINAUT : Braine-le-Comte, Lessines, Baudour, Peissant.

LIÈGE : Flémalle-Haute, Loën.

LUXEMBOURG : Poix.

NAMUR : Dinant, Hastière, Furfooz, Cerfontaine, Rochefort.

3. *Glomeris hexasticha* Brandt.

Noir, avec six rangées longitudinales de traits jaunes obliques s'étendant sur les anneaux du bouclier dorsal, à l'exception du

(¹) Ces stries ne semblent pas avoir l'importance que Koch et d'autres auteurs leur accordent; il paraîtrait qu'elles sont sujettes à varier en nombre et en longueur, non seulement dans la même espèce, mais parfois d'un côté à l'autre d'un même individu.

dernier segment, qui est seulement marqué de deux taches jaunes plus ou moins ovales. Le jaune peut être très réduit, même assez effacé, mais, dans d'autres exemplaires, il prédomine et les traits obliques jaunes s'élargissent, en même temps que le noir, qui les sépare, se réduit à de simples raies. Trois stries transversales à la lame thoracique; sept à huit de chaque côté du premier anneau dorsal, la première allant d'un côté à l'autre, les suivantes alternativement plus longues et plus courtes.

J'ai sous les yeux des individus de cette forme pris à Groenendael et à Rhode-Saint-Genèse, près la forêt de Soignes, à Lessines (M. Th. Le Comte), à Ghlin près Mons et à Rhisnes près Namur.

Est-ce une véritable espèce, comme l'ont cru Brandt, C. L. Koch et d'autres? N'est-ce qu'une variété du *Gl. marginata*, comme le pense M. Meinert? Je ne suis pas à même de me prononcer, mais j'inclinerais à en admettre la valeur spécifique, jusqu'à preuve du contraire.

4. *Glomeris ovatoguttata* C. L. Koch.

M. H. Donckier a trouvé à Flémalle-Haute (province de Liège), avec beaucoup d'exemplaires du *Gl. marginata*, un petit individu que je rapporte, avec assez de doute, à cette espèce décrite et figurée par Koch. (*Syst. der Myriapoden*, p. 95, et *Die Myriapoden*, I, 70, Tab. XXXI, f. 61).

Il est noir, et quatre rangées (deux discoïdales et deux marginales) de taches jaunâtres s'étendent sur les dix premiers segments dorsaux, le dernier n'ayant que deux grandes macules ovales.

Il faut encore ajouter que le *Gl. ovatoguttata* est une forme dont l'existence spécifique n'est pas encore mise hors de contestation et qui n'a été indiquée que pour les environs de Berlin.

Pas plus que M. Plateau, je n'ai rencontré le *Glomeris pustulata* Latreille, indiqué dans les Pays-Bas par Snellen van Vollenhoven. Il se pourrait que ce *pustulata* de M. Snellen van Vollenhoven fût la même forme que l'exemplaire liégeois que j'ai rapporté avec doute à *Poratoguttata*, mais qui me paraît différer beaucoup du véritable *pustulata*. M. de Bertolini m'a envoyé de Trentin (Tyrol) de nombreux exemplaires du *Glomeris pustulata* et de ses variétés.

On voit que, s'il m'a été donné de pouvoir, douze ans après le travail de notre savant confrère et ami M. Plateau, ajouter quelques faits à ceux que ce travail nous apprenait touchant les *Glomeris* belges, il y a encore bien des points d'interrogation pour ceux qui voudront s'en occuper.

La parole est ensuite donnée à M. le Dr Jacobs, qui lit le travail suivant :

TENTHRÉDINES, CÉPHIDES & SIRICIDES

DES ENVIRONS DE BRUXELLES

AVEC REVUE ET DESCRIPTION DE QUELQUES ESPÈCES DES GENRES

BLENNOCAMPA (Hartig),

NEMATUS (Jurine), **CEPHUS** (Latr.) et **PHYLLÆCUS** (Newman)

DÉNOMMÉES PAR FEU LE PROFESSEUR WESMAEL.

Cette publication n'est que la liste des insectes de ma collection, capturés aux environs de Bruxelles; elle serait restée incomplète sans les renseignements puisés dans la collection Wesmael, propriété du Musée de l'Etat, et dans celle de mon ami M. le Dr Tosquinet.

J'espère, par ce travail, attirer l'attention sur l'étude des Hyménoptères, presque abandonnée en Belgique, et donner aux commençants des facilités pour leurs recherches et pour la classification des insectes de cet ordre. Un ouvrage de M. André de Beaune, rédigé en langue française et en cours de publication, viendra puissamment en aide à ceux qui tenteraient d'entrer dans cette voie. Un grand nombre de renseignements insérés dans cette notice se trouvent consignés dans le volume paru.

Dans une revision des Tenthredines de la collection Wesmael, Snellen van Vollenhoven avait reconnu qu'un certain nombre d'espèces dénommées par l'auteur du *Tentamen* comme nouvelles, pouvaient se rapporter à des descriptions déjà données par les auteurs et n'avaient pas lieu d'exister et de conserver leur dénomination. Je me suis occupé de la même étude pour des insectes trouvés dans ces conditions et j'ai pu réduire ce qui restait de noms nouveaux et les rapporter à ce qui avait déjà été fait. Il reste cependant une *Blennocampa* et deux *Nematus* que je considère comme espèces inédites. J'en ai donné la description.

1^{re} FAMILLE : TENTHREDINIDÆ.

1^{re} TRIBU : CIMBICIDÆ.

GENRE 1 : *Cimbex* Ol. (1798), Fabricius, Klug.

HUMERALIS Fourcroy ♂ ♀. *axillaris* Latreille.

Collect. Wesm. — Juillet : Tervueren. — Rare aux environs de Bruxelles.

— La larve vit sur le *Crataegus Oxyacantha* et le *Prunus Padi*.

FEMORATA Lin.

1^{re} VARIÉTÉ NOIRE.*femorata* ♂ ♀ Lin.

Collect. Wesm. — Juin : Forêt de Soignes, Saint-Job.

tristis ♀ Fab.

Collect. Wesm.

2^e VARIÉTÉ A ABDOMEN ROUGE EN SON MILIEU.*sylvarum* ♂ Fab.

Collect. Wesm. — Mai : La Hulpe, Bois de Verrewinkel.

3^e VARIÉTÉ A ABDOMEN JAUNE, TACHÉ DE NOIR.*lutea* ♂ ♀ L.Collect. Wesm. — Juillet : Avenue de Lorraine; mai : Rouge-Cloître,
Bois de Soignes. — Variété se rencontrant assez souvent.CONNATA Schrank. *montana* Pz.

Collect. Wesm.

GENRE 2 : *Trichiosoma* Leach (1814).

LUCORUM ♂ ♀ Lin.

Juin : La Hulpe, Groenendael, Buysinghen. — La larve vit de juillet à
octobre, sur les bouleaux, les saules.

BETULETI ♂ ♀ Klug.

Juillet : Rouge-Cloître, Vivier d'Oie. — Sur le *Cratægus* en août.

VITELLINÆ ♂ ♀ Lin.

Juin : Bodeghem-Saint-Martin, Tervueren, Boitsfort; Juillet : Gaes-
beek. — La larve vit sur le bouleau, l'aune, de juillet à août.

Ces trois espèces ne sont pas très rares.

GENRE 3 : *Clavellaria* Leach (1814).

AMERINÆ ♂ ♀ Lin.

Juillet : Bois de Soignes. — Assez commun. — La larve se trouve de
juillet à août, sur les saules.GENRE 4 : *Abia* Leach (1814)

SERICEA ♀ ♂ Linn.

Juin, juillet, août et septembre. — Peu commun. — La larve se rencontre
sur la *Scabiosa succincta*, de juillet à août.GENRE 5 : *Zaræa* Leach (1814).

FASCIATA ♂ ♀ Lin.

Juillet et août : Boitsfort. — Assez rare. — La larve vit en automne, sur le
Lonicera et le *Viburnum*; la femelle se rencontre plus fréquem-
ment que le mâle; celui-ci est si rare, d'après André, que l'on n'est pas
certain que les individus reconnus comme tels appartiennent à l'espèce.

2^e TRIBU : HYLOTOMIDÆ.GENRE 6 : *Hylotoma* Latreille (1804).

ENODIS Lin. var. *atrata* Klug. 54. 2. Hartig 83. 2.

Mai et août : Boitsfort, Jette-Saint-Pierre, Dilbeek. — Les larves se trouvent sur les Rosacées de mai à août, ce qui suppose une double génération, comme pour les autres espèces du genre.

BERBERIDIS Schrank.

Juin et juillet : Gaesbeek. — Sur le *Berberis vulgaris*.

USTULATA Lin.

Juillet et août : Rixensart, Boitsfort, Jette, Wemmel, etc. — Commun.

— Larve de juillet à septembre sur les *Salix caprea* et *fragilis*.

ATRATA Fœrster. *segmentaria* Pz.

Juin à fin juillet : Val d'Argent, Ohain. — Assez rare. — La larve vit de juillet à septembre, sur l'aune.

CILIARIS Lin. *cœrulea* Klug.

Août : Tervueren. — Rare. — La larve vit de juillet à septembre, sur le *Salix fragilis*.

ROSÆ De Geer.

Août et juillet : Hoeylaert et Rixensart. — La larve vit de juillet à septembre et octobre sur les rosiers et les églantiers; deux générations dans l'année.

CYANOCROCEA Fœrster. *cœrulescens* Fab.

Mai et juillet. — Commun.

MELANOCHROA Gmelin. *femorals* Klug.

Juin et juillet. — Commun. — La larve sur le *Salix fragilis*.

PAGANA Pz.

Juillet et août : Leeuw-Saint-Pierre. — Rare. — La larve sur les églantiers.

CYANELLA Klug.

Collect. Wesm.

GRACILICORNIS Klug.

Collect. Wesm.

FUSCIPES Fall.

Auderghem. — Collect. D^r Tosquinet.

GENRE 7 : *Schizocera* Latreille (1806).

FURCATA ♂ ♀ Villers.

Septembre : voisinage de Rixensart. — Très rare dans les environs de la ville. — La larve vit sur le *Rubus idæus*.

GEMINATA Gmelin.

Collect. Wesm. — Sans indication de lieu d'origine. — Sa larve vit sur le *Rumex acutus*; l'insecte parfait en mai et juin.

3^e TRIBU : LOPHYRIDÆ.GENRE 8 : *Lophyrus* Latreille (1806).

PINI Lin.

Voisinage des bois de sapin. — Rarement dans nos environs. — Un exemplaire trouvé par M. de Borre en pleine ville, square de l'Industrie. — Les larves vivent sur les arbres résineux, auxquels elles causent de grands dommages. M. Perris a étudié les mœurs des larves de certaines espèces et leur manière de se nourrir. (ANDRÉ, p. 57.)

FRUTETORUM Fab.

Collect. Wesm. — Sans indication d'habitat.

4^e TRIBU : NEMATIDÆ.GENRE 9 : *Cladius* Illiger (1801).

PECTINICORNIS Fourcroy.

La larve, de juin à septembre, sur le dessous des feuilles du rosier; il y a deux générations; une hiverne; l'insecte paraît en mai et en juillet.

GENRE 10 : *Trichiocampus* Hartig.RUFIPES Lepeletier. *uncinatus* Klug.

Mai : Laerbeek-Bosch.

VIMINALIS Fallen.

La larve vit en août et septembre, sur le saule, le peuplier, dont elle mange le dessous des feuilles; l'insecte parfait paraît en juin. — Juin : Eppegghem.

ERADIATUS Hart. *denticornis* Wesm.

Collect. Wesm.

DREWSENI Thoms.

Collect. Wesm.

GENRE 11 : *Priophorus* Latreille (1806).PADI Linn. *albipes* Klug.

Mai et juin : Bois de la Cambre, Buysinghen. — La larve se rencontre, au commencement de l'été et en automne, sur le dessous des feuilles de cerisier. — Première génération en avril, seconde en juillet.

GENRE 12 : *Cryptocampus* Hartig (1837).ANGUSTUS Hartig. *niger* Jurine.

Mai : Buysinghen. — Les larves sur le *Salix viminalis*; elles pénètrent dans la moelle des rameaux pour se transformer; l'insecte paraît au printemps et en été.

SALICETI Fallen. *mucronatus* Hartig. *facialis* Wesm.

Collect. Wesm.

GENRE 13 : **Dineura** Dahlbom (1835).

DESPECTA Hartig.

Mai à juillet : Haeren. — La larve ronge les feuilles du bouton d'or.

STILATA Klug.

Buysinghen. — Collect. D^r Tosquinet.

DEGEERI Klug.

Collect. Wesm.

OPACA Hartig.

Collect. Wesm.

PALLIPES Hartig.

Collect. Wesm.

GENRE 14 : **Hemichroa** Stephens (1830).

ALNI Lin.

La larve vit en août sur le bouleau, l'aune, le saule; l'insecte éclot en juin. — Juin : Boendael.

RUFA Pz.

L'insecte éclot en juin. — Mai : Rixensart.

GENRE 15 : **Nematus** Jurine (1807).

SEPTENTRIONALIS Lin.

Mai : La Hulpe; juillet : Eppeghem. — La larve vit en société sur l'aune, le bouleau, le peuplier, depuis le mois de juin jusqu'en octobre.
— Deux générations, la première en mai, la seconde en août.VARUS de Villaret. *albilabris* Wesm.

La larve vit comme la précédente. — Il y a deux générations. — Août : Bodeghem-Saint-Martin.

LATIPES de Villaret.

Rare. — Groenendael. — Collect. D^r Tosquinet.QUERCUS Hartig. *vittatus* Lepeletier. *haemorrhoidalis* Spen.La larve vit sur le *Vaccinum Myrtillus*; l'insecte en juin, juillet, août. — Septembre : La Hulpe.

LUCIDUS Pz.

La larve vit sur l'aubépine; l'insecte éclot en août et mai. — Mai : Saint-Job.

HISTRIO Lepeletier.

La larve vit sur les *Salix aurita* et *fragilis*; l'insecte paraît en août.
— Mai : Linkebeek.VITTATUS Lepeletier. *haemorrhoidalis* Lepel. *fullax* Lepel.

Juin : Haeren.

KIRBY Th., p. 40, n° 40.

Août : Strombeek.

CAPREÆ Pz.

La larve vit sur le *Carex filiformis* en juillet et en automne; on trouve l'insecte en mai, juin et juillet. — Laeken, Rixensart.

RUMICIS Fall. *capreæ* Hartig.

 Août : Val d'Argent.

TURGIDUS Zadd.

 L'insecte en août : Hoeylaert.

CÆRULEOCARPUS Hartig.

 La larve vit en juillet sur les saules ; l'insecte en mai et juin — Dilbeek.

SULCIPES Fall. *callopus* Wesm.

 Juillet : Bois de la Cambre.

MOLLIS Hartig. *obscurus* Wesm.

 La larve vit sur le pin. — Mai : Vivier d'Oie.

RUFIPES Lepeletier ♀.

 Mai : Avenue de Lorraine.

OBLITUS Lepeletier ♀.

 Juillet : Boitsfort (cimetière).

PELETIERI André ♀.

 Septembre : Groenendael (château).

PUNCTICEPS Thomson.

 Bois de Soignes, Grande-Espinette.

ABBREVIATUS Hartig ♀.

 Août : Rixensart.

LEUCOSTICTUS Hartig.

lineipes ♂ Wesm.

nasutus ♀ Wesm.

fuscus ♂ Wesm.

 Collect. Wesm. — Juin : Wommel, Dilbeek. — La femelle pond ses œufs sur différents saules ; l'insecte apparaît en mai.

PALLIPES Fallen.

 Fin avril : Ruysbroeck.

ZEUCOGASTER Hartig ♀.

pallilabris ♀ Wesm.

 Collect. Wesm. — L'insecte en juin et juillet, pris à Loth. — Groenendael. — Collect. D^r Tosquinet.

OBDUCTUS Hartig.

 Août : Beersel.

APICALIS Hartig.

 L'insecte en mai à Eschenbeek.

NIGER Jurine ♀.

 Collect. Wesm.

AMENTORUM Foerster.

 La larve sur les saules. — Juillet : Anderlecht.

RIBESII Scopoli. *trimaculatus* Lepel.

 La larve naît en août et dévore les feuilles du *Ribes rubrum* et *R. uva-crispa* de mai à septembre ; l'insecte se rencontre d'avril à juillet. — Assez commun.

UMBRATUS Thomson.

 Septembre : Groenendael (bois).

PAPILLOSUS Retzius.

La larve ronge les feuilles de saule en juin et juillet; la nymphe passe l'hiver en terre; l'insecte naît en juin. — Ruysbroeck, La Hulpe, Saint-Job.

CONSOBRINUS Vollenhoven.

La larve vit sur le *Ribes grossulariæ*; l'insecte, qui a deux générations, paraît en juillet et mai. — Val d'Argent. — Assez rare.

MYOSOTIDIS Fabricius. *interruptus* Wesm.

La larve vit en août, sur le *Trifolium pratense*; l'insecte en juin et juillet. — Ruysbroeck.

CITREUS Zaddach.

La larve sur le *Populus tremulæ*. — Juillet : Beersel.

PAVIDUS Lepeletier. *Whewaalli* Sn. Voll.

SALICIS Lin.

La larve vit de juillet à octobre, sur diverses espèces de saules; l'insecte sort de mai à août. — Leeuw-Saint-Pierre, Ruysbroeck, Hoeylaert.

CROCEUS Fallen.

trimaculatus ♀ Voll.

De juillet à septembre, sur les saules; l'insecte, de mai à juillet. — Loth et collect. Wesm.

BETULÆ Retzius. *trimaculatus* Wesm.

La larve vit sur le *Betula alba*; l'insecte paraît en septembre. — Peu commun. — Dilbeek.

ALBIPENNIS Hartig. *xanthomelas* Wesm.

Août. — Peu commun. — Rouge-Cloître. — Collect. Wesm.

MINIATUS Klug.

Groenendael. — Collect. Dr Tosquinet.

MELANOSTERNUS Lepeletier.

Collect. Wesm. — Juillet : vallée de la Woluwe.

CONJUGATUS Dahlbom.

Sur le *Salix fragilis*. — Juillet : Stockel.

LUTEUS Pz.

La larve vit sur l'*Alnus glutinosa*; l'insecte se trouve en juin. — Boitsfort, Anderlecht.

DORSALIS Lepeletier. *acuminatus* Thomson.

Sur le *Betula alba*; il y a double génération. — Collect. Wesm. — Mai : Buysinghen.

BIPARTITUS Lepeletier. *acuminatus* Thomson.

Rare. — Mai : Wommel.

ABDOMINALIS Pz. *ventralis* Hartig. *fuscipennis* Lepel.

Mai : Rouge-Cloître. — Collect. Wesm.

MILIARIS Pz.

virescens Hartig.

pallidus ♀ Wesm.

pulchellus ♀ Wesm.

On trouve la larve sur les saules en avril, juillet, septembre, octobre; l'insecte paraît en juin et août; il y a deux générations. — Welrieken, Verrewinkel, Linkebeek et collect. Wesm.

TESTACEUS Thomson ♀. *unicolor* ♀ Wesm.

Collect. Wesm. et collect. Jacobs. — Juillet : Droogenbosch.

FENNICUS André.

Vivier d'Oie. — Collect. D^r Tosquinet.

BRACHYACANTHUS Thomson. *cœruleocarpus* Hartig.

La Hulpe, Vivier d'Oie. — Collect. D^r Tosquinet

PALLIATUS Dahlb.

L'insecte en mai et juin. — Juin : Groenendael.

CRASSICORNIS Hartig.

Mai : Groenendael; juin : Buysinghen.

COMPRESSICORNIS Fab.

Août : Rhode-Saint-Genèse.

FILICORNIS Thomson.

Mai : Buysinghen.

VAR. à labre noirâtre.

LATIVENTRIS Thomson.

Août : Rhode-Saint-Genèse.

FULVIPES Fall.

Juin : Groenendael.

VAR. ♂ Thomson.

IMMACULATUS Vollenh. ♀.

Collect. Wesm. — Notes de Sn. v. Vollenh. sur la collection Wesmael.

ensicornis ♀ Wesm. *in sched.*

Long. 6 mill. — Tête noire, ainsi que le labre et les mandibules, palpes blanches, épistome tronqué, forte prééminence frontale interantennaire. Tête soyeuse, antennes noires en dessus, brun foncé en dessous, articles amincis en dessous et prolongés vers leur partie supérieure, ces prolongements moins apparents aux deux derniers articles. Pronotum noir, bord postérieur avec un liséré brun foncé, mésonotum et scutellum noir luisant. Abdomen noir, luisant en dessus et en dessous. Pattes blanches, hanches noires à leur extrême base, trochanters blanches, tibias blancs, les deux antérieurs avec une teinte foncée à leur extrémité; cette teinte est plus marquée à ceux du milieu, les tibias postérieurs noirs jusqu'à la moitié de leur hauteur. Tarses antérieurs légèrement brunâtres avec un anneau blanc au premier article; ceux du milieu sont plus foncés avec le même anneau. Ongles bifides. Ailes hyalines, nervure costale brunâtre, ainsi que toutes les nervures, stigma brun foncé, écaillette des ailes blanche. — Collect. Wesm.

testaceicornis ♀ Wesm. *in sched.*

Long. 6 mill. — Tête et parties de la bouche noires, mandibules brunâtres. Antennes avec les deux premiers articles noirs, les autres noirs en dessus, brun pâle en dessous. Pronotum, tout le corselet et le scutellum noirs. Abdomen noir luisant en dessus et en dessous. Pattes blanches; base des hanches noire, extrémité de celles-ci et trochanters blancs, base des cuisses de même couleur, avec une fascie noire à la partie inférieure et supérieure de la première paire; à la seconde et à la troisième paire, le noir est plus foncé et plus

étendu et ne laisse de blanc que les deux extrémités apicales. Tibias antérieurs et intermédiaires blancs, les postérieurs avec l'extrémité noirâtre. Tarses antérieurs et intermédiaires blancs, tarses postérieurs enfumés. Ongles des tarses bifides. Ailes hyalines, nervure costale blanche, stigma brun entouré de blanc, écaillette blanche. — Collect. Wesm.

5^e TRIBU : PHYLOTOMIDÆ.GENRE 16 : *Phænusa* Leach (1814).

PYGMÆA Kl.

Juin : Buysinghen. — La larve vit sur le chêne en été et en automne.

PUMILA Klug.

Assez rare.

GENRE 17 : *Fenella* Westw. (1840).

NIGRITA Westw.

La Cambre. — Collect. Dr Tosquinet.

GENRE 18 : *Phyllotoma* Fallen (1829), *Elasmus* Wesm.

OCHROPODA Klug.

La larve en automne sur le peuplier noir. — Mai : Loth.

VAGANS Fallen.

Sur l'*Alnus glutinosa*. — L'insecte en juin et août. — Ruysbroeck.

MICROCEPHALA Klug.

Sur les saules. — L'insecte en août. — Leeuw-Saint-Pierre.

NEMORATA Fall.

Collect. Wesm.

6^e TRIBU : EMPHYTIDÆ.GENRE 19 : *Emphytus* Klug (1818).

TIBIALIS Pz.

Sur le chêne en juin et juillet; l'insecte en septembre. — Bois de Soignes, Laerbeek-Bosch.

CEREUS Klug.

Fin novembre : Vivier d'Oie. — Collect. Dr Tosquinet.

TENER Fall. *patellatus* Klug.

La larve sur l'*Abies excelsa*. Hartig indique la larve au commencement de mai sur le chêne et le hêtre. Dours la place sur les feuilles mortes de sapin. (ANDRÉ, p. 247.) — Septembre : Bois de Verrewinkel.

BASALIS Klug.

Août : Bois de Verrewinkel.

SUCCINCTUS Klug.

Août : Uccle.

CINCTUS Lin.

La larve vit en automne, sur les rosiers ; elle opère sa nymphose dans la moelle des tiges sèches ; l'insecte éclot en mai. — Juin : Saint-Job.

CALCEATUS Klug.

Août : Boitsfort.

GROSSULARIÆ Klug.

La larve sur les groseillers, l'insecte en mai et août. — Commun.

TOGATUS Klug. 195. Fab.

Août : Beersel. — Collect. Wesm.

DIDYMUS Klug.

Juin : Val-Duchesse, Vallée de la Woluwe.

FILIFORMIS Klug.

Mai : Haeren.

RUFOCINCTUS Retzius.

Septembre : Eppeghem.

SEROTINUS Klug.

Juin : Rouge-Clotre.

CINGULUM Klug.

Collect. Wesm.

FILIFORMIS Klug. 8.

Collect. Wesm.

GENRE 20 : **Harpiphorus** Hartig (1818).

LEPIDUS Klug.

Rare.

GENRE 21 : **Dolerus** Jurine (1807).

PALMATUS Klug.

Commun. — Avril, mai.

VESTIGALIS Klug.

Commun. — Avril, mai.

PRATORUM Fallen, Th. 5. *equiseti* Klug.

Une éclosion au printemps ; j'ai rencontré des femelles en octobre 1883.

— Commun. — Juillet.

TIMIDUS Klug. Th. 6. ♀.

Peu commun. — Mai.

DUBIUS Klug. Th. 7.

Peu commun. — Ruysbroeck.

TRISTIS Fab. Th. 8. ♀.

Juillet : Val d'Argent.

PALUSTRIS Klug. Th. 9.

Commun. — Juillet, août.

PRATENSIS Lin. Th. 10. *eglantariæ* Klug.

La larve vit sur les jones ; l'insecte paraît en mai et juin. J'ai pris des femelles en octobre 1883.

GONAGER Fab. Th. 13.

La larve vit en juin et juillet sur les herbes des prairies ; l'insecte vole en août, mai, juin. — Commun.

PUNCTICOLLIS Thoms. Th. 14.

Mai : Buysinghen, Ruysbroeck.

HÆMATODES Schrank. Th. 21.

Sur le *Juncus effusus* en juin ; l'insecte paraît en mai. — Commun.

NIGER Lin. Th. 22.

Assez rare. — Mai : Buysinghen.

GIBBOSUS Hartig 34. Th. 23.

Mai : La Hulpe.

CENCHRIS Hartig 32. Th. 24.

Mai, juin : La Hulpe, Verrewinkel.

ANTHRACINUS Klug. Th. 25.

Commun.

VARISPINUS Hartig 30. Th. 27.

Mai : Dilbeek, Anderlecht.

ÆNEUS Hartig 33. Th. 28.

Juin : Esschenbeek. — Peu commun.

ANTICUS Klug. Th. 18.

Rare. — Juin : Boitsfort.

DESERTUS Klug. ♂.

Rare. — Mai : Auderghem. — Collect. Wesm.

TRIPPLICATUS Klug. Th. 16.

Rare. — Avril : Eppeghem.

LATERITIUS Klug. Th. 17.

Très rare aux environs de Bruxelles. — Collect. Wesm. — Vivier d'Oie. — Collect. Dr Tosquinet.

7^e TRIBU : ATHALIDÆ.GENRE 22 : *Athalia* Leach (1814).

LUGENS Klug.

La larve vit, durant la moitié de son existence, dans les pseudo-galles de la *Clematis erecta* ; elle se rencontre avec toute sa croissance en juin, elle se transforme en insecte soit la même année, soit l'année suivante. — Juillet : Loth.

SPINARUM Fabricius.

La larve en mai et juin, sur les crucifères, auxquelles elle cause des désastres. — Deux ou trois générations. — Commun.

GLABRICOLLIS Thomson.

Assez rare dans nos environs. — Août et septembre.

ANNULATA Fabricius.

Sur la *Veronica beccabunga*. — En mai, juin et août : La Hulpe.

ROSÆ Lin.

L'insecte d'avril à mai et de juin à août, puis en automne. Il y aurait ainsi trois générations. — Commun.

8^e TRIBU : SELANDRIDÆ.GENRE 23 : *Selandria* Klug (1818).

SERVA Fabricius. *socia* Kl.

Sur les plantes aquatiques. — La Hulpe : juillet. — Commun.

SIXII Vollenhoven. *interstitialis* Thomson.

La larve en juin et juillet. Elle sort en août; il y a une seconde génération qui hiverne. — Rare. — Jette-Saint-Pierre.

FLAVESCENS Klug. *flavens* Hartig.

Assez rare. — Août : Beersel.

APERTA Hartig.

Juin, juillet : Gaesbeek.

STRAMINEIPES Klug.

Mai, juin : Leeuw-Saint-Pierre.

MORIO Fab.

Sur les groseillers. — Mai, juin : La Hulpe.

GENRE 24 : *Blennocampa* Hartig (1837).

ATERRIMA Klug. *Phymatocera aterrima* Klug.

Sur les *Convallaria multiflora*, *polygonata*. — Naît en mai. — Rare. — Tervueren.

GAGATINA Klug. *Monophadnus* Hartig.

Mai : Laerbeek-Bosch. — Rare.

SERICANS Hartig. *Monophadnus* Hartig.

Mai : Laerbeek-Bosch.

MICANS Klug. *Monophadnus* Hartig.

Mai : Laerbeek-Bosch. — Coll. Wesmael.

EPHIPPIUM Pz. *æthiops* Kl. 41. Hartig 267.5.

La larve sur les aunes. — Juin, juillet : La Hulpe.

FULIGINOSA Schrank.

Mai : Rixensart.

FUSCIPENNIS Fallen. *Monophadnus luteiventris* Hartig.

Mai : Rixensart.

ALBIPES Gmelin. *Monophadnus* Hartig.

La larve vit sur les *Ranunculus*. Mai : Laerbeek-Bosch.

GENICULATA Hartig. *M. longicornis* Hartig.

Collect. Wesm.

BIPUNCTATA Klug. *tenuicingulatus* Costa. *Monophadnus* Hartig.

Collect. Wesm.

BETULETI Klug.

Collect. Wesm. — Mai : Laerbeek-Bosch.

LINEOLATA Klug.

Rare. — Collect. Wesm. — Juin : Peuthy.

NANA Klug.

Juin : Hoeylaert.

XXVIII

MELANOCEPHALA Fab.

Collect. Wesm.

NIGRIPES Klug. *Monophadnus* Hartig.

Juin : Rixensart.

MONTICOLA Hartig. *Monophadnus*.

Mai : Saint-Job.

PUSILLA Klug.

Rare. — Août : Buysinghen. — La larve vit sur le *Rosa canina*.

CINEREIPES Klug.

Juillet : Eppegghem.

SUBCANA Zadd.

Rare. — Un exemplaire. — Mai : Buysinghen.

ALTERNIPES Klug.

Rare. — Août : Dilbeek.

UNCTA Klug.

Rare. — Un exemplaire à Buysinghen. — Mai.

SEMICINCTA ♀ Hartig. *nigrina* ♀ Wesm.

Collect. Wesm.

TENEBROSA ♀ Wesm.

Collect. Wesm. — D'après Snellen van Vollenhoven, cette espèce serait une variété de la *B. æthiops*. (Notes manuscrites sur la collection Wesmael.)

flavicollis ♀ Wesm. *in sched.*

Long. 7 mill. — Tête noire et toutes les parties de la bouche noires. Antennes noires. Pronotum avec les angles et le bord inférieur rouge foncé. Mésonotum, scutellum et abdomen, en dessus et en dessous, noir luisant. Hanches, trochanters et base des cuisses noirs. Tibias blancs, l'extrémité des deux dernières paires légèrement enfumée; tarses noirâtres, le premier article blanc à la base. Ongles bifides. Ailes hyalines; écaille rougeâtre, nervure costale noire, ainsi que les nervures du limbe de l'aile, stigma noir. Ailes inférieures avec une cellule discoïdale fermée.

Collect. Wesm.

GENRE 25 : *Eriocampa* Hartig (1837).

OVATA ♀ Lin.

Sur la face inférieure des feuilles d'aune; l'insecte d'août à septembre.

— Commun.

VARIPES Klug. ♂.

Rare. — Juin : bois de Verrewinkel.

ANNULIPES Klug.

L'insecte en juin. — Saint-Job. — La larve sur le saule en juin et juillet.

LIMACINA Retzius. *adumbrata* Klug. *æthiops* Fab. Lepel.

L'insecte en mai et juin. — Buysinghen. — La larve sur les feuilles des arbres fruitiers.

UMBRATICA Klug.

Juin : Gaesbeek.

CINXIA Klug.

Juin : Leeuw-Saint-Pierre.

LUTEOLA Klug.

Collect. Wesm.

GENRE 26 : **Hoplocampa** Hartig (1837).

FERRUGINEA Pz. *brunnea* Klug.

Mai : La Hulpe.

CRATÆGI Klug.

En juin : sur le *Pyrus aucuparia*. — Juin : La Hulpe.

RUTILICORNIS Pz.

Sur le *Prunus spinosa*. — Mai : Strombeek.

9^e TRIBU : TENTHREDINIDÆ.

GENRE 27 : **Pœcilosoma** Dahlbom.

PULVERULATUM Retzius (1763). *obesa* Klug (1818).

En août sur les aunes; l'insecte en mai. — Rare. — Boitsfort.

GUTTATUM Fallen (1808). *impressa* Klug (1818).

Juin : Hoeylaert.

SUBMUTICUM Thomson.

Groenendael. — Collect. D^r Tosquinet.

GENRE 28 : **Taxonus** Megerle (1801).

GLABRATUS Fallen (1808). *agilis* Klug (1818).

La larve sur le *Polygonum bistorta* et l'*Arundo Phragmites*. — Mai, juin. — Commun.

AGRORUM Fallen (1808). *nitida* Klug (1818).

Commun. — Mai, juin.

EQUISETI Fallen (1808). *bicolor* Klug (1818).

La larve sur le *Rumex acetosella* et les *Veronica*. — Juin. — Commun.

PULCHELLUS Costa.

Boitsfort. — Collect. D^r Tosquinet.

GENRE 29 : **Pachyprotasis** Hartig (1837).

RAPÆ Lin.

Juin, juillet, septembre, octobre. — Commun.

SIMULANS Klug.

Assez rare. — Septembre : Beersel.

DISCOLOR Klug.

Collect. Wesmael.

ANTENNATA Klug.

Auderghem. — Collect. D^r Tosquinet.

GENRE 30 : **Macrophya** Dahlbom (1835)

RUSTICA Lin.

Juin, juillet. — Ombellifères. — Commun.

MILITARIS Klug.

Rare aux environs. — Collect. Wesm. — Hocylaert : juillet, 1 ♂. —

Vivier d'Oie. — Collect. Dr Tosquinet.

DUODECIM-PUNCTATA Lin.

Sur l'*Alnus glutinosa*. — Mai : bois de Soignes.

HÆMATOPUS Fabr.

Sur le *Corylus avellana* L. — Juin : Rixensart.

PUNCTUM-ALBUM Lin.

Sur les *Cratægus oxyacantha*, *Fraxinus excelsior*, *Ligustrum vulgare*. —

Mai : Boitsfort.

QUADRI-MACULATA Fab.

La larve vit sur l'érable. — Juin : Uccle, Verrewinkel.

RIBIS Schrank.

La larve vit sur les groseillers, *Ribes uva-crispa* L. — Commun. — Juin.

ALBICINCTA Schrank.

La larve vit sur les groseillers, sur les *Sambucus nigra* et *racemosa* L. —

Commun. — Juin.

BLANDA Fabr.

Mai, juillet : Bois de la Cambre, Gaesbeek.

NEGLECTA Klug.

Juin : La Hulpe.

ALBO-ANNULATA ♂ Costa (1860).

Pris à Eskenberg le 21 mai 1882, sur le *Lonicera caprifolium*.

GENRE 31 : **Allantus** Jurine (1807).ARCUATUS Foerster (1771), *notha* Klug (1818).

Commun. — Mai, août, septembre.

TRICINCTUS Fab.

Sur le *Lonicera caprifolium*. — Commun. — Juin.

ZONA Klug. *cingulum* (ex parte) Cam.

Rare. — Juin : Gaesbeek.

MARGINELLUS Fr. *viennensis* Schrank.

Sur les ombellifères. — Commun. — Juillet, août, septembre.

ZONULA Klug. *cingulum* (ex parte) Cam.

Commun. — Juillet, août.

SCROPHULARIÆ Lin.

Sur les *Scrophularia* et *Verbascum*. — Août : Buysinghen.

BICINCTUS Lin. (1789). *bifasciatus* Scop. (1763). *cingulum* Kl. Hartig.

Rare. — Juin : Boitsfort.

VIDUUS Rossi.

Rare aux environs de Bruxelles. — Août : Rouge-Clotre.

GENRE 32 : **Sciapterix** Stephens (1819).

·CONSOBRINA Klug.

Août : Rixensart ; mai : Boitsfort.

·COSTALIS Fabricius.

Rare. — Juin : Saint-Job. — Collect. Wesm.

GENRE 33 : **Strongylogaster** Dahlbom (1835).

·CINGULATUS Fab.

Sur les fougères de la lisière des forêts. — Juin : Vivier d'Oie.

·VIRIDIS Schmiedeknecht.

Vivier d'Oie. — Collect. D^r Tosquinet.

·MACULA Klug.

Verrewinkel. — Collect. D^r Tosquinet.GENRE 34 : **Synairema** Hartig (1837).

·RUBI Pz.

Très rare. — Juin : Saint-Job.

GENRE 35 : **Perineura** Hartig (1837).

·BREVIUSCULA Costa ♀.

Pas rare. — Mai, juin : Verrewinkel, Boitsfort, La Hulpe.

·PUNCTULATA Klug.

Assez rare. — Mai, juin : Hoeylaert.

·VIRIDIS Lin.

Sur les saules ; elle ne se nourrit que la nuit. — Mai, juin. — Commun.

·SCALARIS Klug.

Commun. — Mai, juin.

·LATERALIS Fab.

Mai : Boitsfort.

·SOLITARIA Schrank. *aucupariæ* Klug.

Mai : Laerbeek-Bosch.

·PICTA Klug. *Tenthredo permixta* Wesm.

Collect. Wesm. — Boitsfort.

·ORNATA Lepeletier.

Juin : Boitsfort, Groenendael, Linkebeek.

·SCUTELLARIS Pz. Fab. Hartig. *Tenthredopsis instabilis* Costa. *T. scutellaris* Cameron.

Commun. — Mai, juin.

·SORDIDA Klug. *Tenthredopsis dorsalis* Lepel. *T. sordida* Costa.

Commun. — Mai, juin, juillet.

·NASSATA Lin. *Tenthredopsis instabilis* Kl. Dhl. Hartig. *T. nassata* Costa.

Sur les tilleuls. — Commun. — Mai.

·CORDATA Fourcroy. *Tenthredopsis instabilis* Costa. *T. dimidiata* Cameron.

Assez commun. — Juin, juillet.

GENRE 36 : *Tenthredo* Lin. (1759).

MANDIBULARIS Fab.

Juin : Vallée de la Woluwe.

ATRA Lin.

Sur les saules, l'aune. — Mai, juin. — Les ♂ plus fréquents en août.
— Vallée de la Woluwe.

RUFIPES Klug.

Juillet : Stockel.

BICINCTA Lin.

Commun. — Mai.

ZONATA Pz. (1805). *maculata* Fourcroy (1783).

Sur le chêne. — Assez rare. — Lisière de la forêt de Soignes.

VAR. avec les segments jaunes tachés de noir au milieu.

FLAVA Scopoli (1766). *flavicornis* Villers.Juillet. — Commun en 1883 dans les prairies de Beersel. — Groenendael,
Bodeghem-Saint-Martin.

ALBICORNIS Fab.

Juin : Rixensart.

MAURA Fab. (1792).

Juillet : Boitsfort.

FAGI Pz. (1789).

Juin : Wemmel.

VELOX Fab.

Juin : Tervueren.

LIVIDA Lin.

Commun. — Juin, juillet et septembre.

COLON Klug.

Août : Gaesbeek.

RUFIVENTRIS Fab.

Juin : Boitsfort.

CONSPICUA Klug.

Juillet : Esschenbeek.

BIGUTTATA Hartig.

Bois de sapin sur les hauteurs de Buysinghen. — Deux mâles en juin 1868.

DISPAR Klug.

Rare.

RUDOWI André.

Verrewinkel. — Collect. Dr Tosquinet.

10^e TRIBU : LYDIDÆ.GENRE 37 : *Lyda* Fab. (1804).

STELLATA Christ.

Juin : La Hulpe. — Bois de sapins.

MARGINATA Lepel.

Vivier d'Oie. — Collect. D^r Tosquinet.

ERYTHROCEPHALA Lin.

Rare aux environs de Bruxelles, sur les feuilles des *Pinus sylvatica*, *Picea*,
Abies et *Larix*.

HYPOTROPHICA Hartig.

La Cambre. — Collect. D^r Tosquinet.

HORTORUM Klug.

Juin : Buysinghen. — Sur les aubépines.

SYLVATICA Lin.

Mai : Buysinghen. — La larve vit en juillet et août sur le *Salix cuprea*
et le *Populus tremula*.

AURITA Klug. *betulae* Lin.

Juin : Buysinghen.

FLAVIVENTRIS Retzius. *clypeata* Klug.

Collect. Wesm.

BETULÆ Lin.

Collect. Wesm.

2^e FAMILLE : CEPHIDÆ.

GENRE 1 : *Cephus* Latreille (1796).

PYGMÆUS Lin. *Cephus rufipes* Wesm. ♀.

VAR. immature.

Juin, juillet : commun.

TROGLODYTES Fab.

Rare. — Collect. Wesm.

PALLIPES Klug. *varipes* Wesm. ♀.

Mai : Ruysbroeck. — Collect. Wesm.

NIGRINUS Thomson.

Mai, juin : Bois de Soignes.

GENRE 2 : *Phyllæcus* Newmann (1846).

CYNOSEBATI Lin.

Cephus cephalotes Wesm. ♀. Variété à cuisses noires.

Cephus annulatus Wesm. ♀. Variété à cuisses jaunes.

Août : Buysinghen.

3^e FAMILLE : SIRICIDÆ.

GENRE 1 : *Sirex* Linné (1735).

GIGAS Lin.

Juillet et août. — La larve reste deux ou trois ans avant de se transformer
en nymphe; l'éclosion a lieu peu de temps après la nymphose. Elle vit

dans le chêne, le saule, le bouleau, le sapin, etc. On rencontre quelquefois l'insecte parfait dans l'intérieur des habitations; il sort alors des bois employés à la construction, où il se trouvait à l'état de larve. — Rare aux environs de Bruxelles; a été pris dans l'avenue de Lorraine, à Boitsfort et à Rixensart.

JUVENCUS Lin.

Assez rare; a été pris en abondance dans le bois de Soignes, il y a quelques années, par un amateur de chasse aux lépidoptères. — Rixensart, Gaesbeek.

GENRE 2 : *Xyphydria* Latreille (1802).

CAMELUS Lin.

Très rare aux environs de la ville; un exemplaire capturé à Watermael par M. Donckier de Donceel.

M. le Dr Heylaerts nous adresse les deux travaux suivants :

OBSERVATIONS SYNONYMIQUES ET AUTRES

RELATIVES A DES PSYCHIDES

AVEC DESCRIPTIONS DE *NOVÆ SPECIES*

par F.-J.-M. Heylaerts.

1° Ex Museo Oberthür :

- a. *Psyche hirtella* Bdvl., Bruand. *Mon. des Psychides*, p. 61, fig. 38, pl. I; Staudinger, *Catal.*, 1871, n° 839. ? *Hirtella*.

J'ai examiné l'exemplaire original de Boisduval. Sans aucun doute, *Ps. hirtella* Bdvl. est *Ps. angustella* H.-S., et ne provient certainement pas de la Laponie, quoi qu'en dise Bruand.

- b. *Ps. hispidella* Bdv.

L'exemplaire original de la collection Boisduval, pris dans la forêt de Fontainebleau, est un spécimen très grand de *Ps. opacella* H.-S.

- c. *Ps. siculella* Bdvl. Bruand, *Mon. des Psychides*, p. 60, pl. I, fig. 33; Staudinger, *Catal.*, 1871, n° 840.

L'exemplaire original de la collection Boisduval, pris dans l'île de Sicile, est sans aucun doute la variété *melasoma* Staud. de *Ps. apiformis* Rossi. La variété sera donc nommée *Siculella* Bdvl.

- d. *Ps. casanella* Bdvl., Bruand, *Mon. des Psychides*, p. 53.

L'exemplaire original de la collection Boisduval est pour sûr un grand exemplaire de *Ps. villosella* O.

Les trois exemplaires semblables proviennent de Casan.

e. *Ps. muscella* Hb.; Staudinger, *Catal.*, 1881, n° 842.

La citation : *Dup. IV*, 56,4 sera rayée, car j'ai eu la bonne fortune de pouvoir examiner l'exemplaire original qui a servi à la figure de Duponchel (teste Guénée), et qui n'est autre qu'un exemplaire typique de *Ps. atra* L. = *plumifera* O. (Cet exemplaire est dans la collection Guénée et porte une étiquette de la main de Duponchel lui-même.) La citation : " ? Godt. IV. 29. 8 " peut être aussi rayée, la figure n'étant pas reconnaissable.

Oreopsyche Pyrenaella H. S. var. *Albescens* m.

Jusqu'aujourd'hui seulement, des exemplaires typiques ont été connus. MM. Ch. et R. Oberthür ont eu la bonne fortune de trouver un exemplaire qui est un peu passé, mais dont le thorax et l'abdomen, ainsi que la tête, portent des poils blanchâtres. Les poils des pseudopalpes ont cette couleur et sont mêlés de poils noirâtres. La bordure noire des ailes est très mince. L'exemplaire est très grand, a la nervulation typique, et porte l'étiquette : " Asturies. Picos de Europa (2,000 m.). Juillet 1882. "

2° Ex Museo Moeschler :

a. *Psyche Surinamensis* Möschl., *Beitr. zur Schmetterlings-fauna von Surinam. Verh. K. K. zool.-bot. Ges. in Wien*, 1878, p. 41.

En examinant l'exemplaire original de l'auteur, j'ai remarqué que l'exemplaire en question est une *Oiketicide* vraie et appartient à mon genre *Lansdownia* (mieux EUMETA Wlk, voyez plus bas).

Ex Museo Snellen.

a. *Psyche leucosoma* Snell., *Tijdschr. v. ent. Ned. ent. Ver.*, t. XXIV, p. 125.

J'ai examiné cette petite *Psychide*, et nonobstant cette petitesse (exp. alarum 15 mill.), elle est également une *Oiketicide* vraie appartenant à mon genre *Lansdownia* (mieux EUMETA Wlk.).

Ex Museo Heylaerts :

a. *Acanthopsyche Ritscheri* Heyl., *Notes from the Leyden Museum*, vol. III, p. 89.

Dans le Musée de Leyde, il y avait trois exemplaires de cette espèce, tous les trois en mauvais état. N'ayant pas la permission, en les examinant, d'enlever les écailles pour voir les nervures, et les poils, couvrant une partie de la

base et du bord intérieur, s'étant agglutinés, je crus voir la bifurcation de la dorsale. En même temps les poils des palpes étaient collés ensemble; par conséquent, ces derniers ressemblaient parfaitement aux pseudopalpes des *Psychides*. La nervulation, la coupe des ailes, etc., ressemblent tellement à celles des *Psychides* vraies, que je pensai ne pas me tromper en déterminant; même l'épine tibiale est à sa place ordinaire. Je fis la description, mais ayant obtenu par échange un des exemplaires en question, l'ayant ramolli avec patience, et, écartant poil par poil, je reconnus bien vite ma méprise, car la bifurcation de la dorsale n'existe pas, et les pseudopalpes disparurent pour faire place à des palpes formés comme ceux des *Liparides*: une petite spirित्रомpe même se montra. Je m'empresse maintenant de publier mon erreur. Pourtant cette erreur me donne une certaine satisfaction, car elle est une preuve que la place que j'ai donnée aux *Psychides* près des *Liparides* est la bonne. — Voici la rectification synonymique :

A. Ritsemæ Heyl. = *Perina nuda* F. = *Perina basalis* Walk. ♂.

Il paraît heureusement que je ne suis pas le seul qui ait cru que la *Perina* susmentionnée était une *Psychide*. Walker l'énumère parmi les *Psychidæ*; Guénée l'avait dans sa collection sous le nom d'*Animula spec.*, et, après ma description, je l'ai reçue des plus grands entomologistes de notre temps comme *Psychide*. L'honneur d'avoir rectifié la synonymie de ce singulier lépidoptère (la ♀ ne ressemble en rien au ♂, sauf par la nervulation) revient à M. F. Moore.

Je copie ce qu'il en dit : *Lepidoptera of Ceylon*, part VII, p. 94. (L'espèce est figurée pl. 114, fig. 1, 1a, 1b) :

Perina nuda F. = *Perina basalis* Walk. ♂ = *Euproctis antica* var. c. Walk ♀ = *Stilpnotia subtineta* Walk. ♀ = *Euproctis combinata* Walk. ♀.

Ex Museo Staudinger :

a. *Kophene minor* Moore, *Descr. of new Indian Lepid. Insects from the collect. of the late M. W. S. Atkinson*, part. I, p. 73.

L'*unicum* précité m'a été envoyé gracieusement par le Dr Staudinger pour l'étudier. L'examen m'a appris que l'exemplaire n'appartient nullement au genre *Kophene* Moore, mais à mon groupe *Oiketieoides* (mieux *Chalia* Moore). La nervulation ressemble en tout point à celle de l'*O. inquinata* Led. Peut-être est-ce une variété locale de la dernière espèce.

J'ai dit dans la première partie de ma *Monographie des Psychides*, 1881, que ma classification des Psychides exotiques n'était que provisoire. Depuis ce temps, j'ai eu l'occasion d'en étudier plusieurs espèces. Je remarque maintenant :

1^o Que mon genre *Lansdownia* doit faire place au genre *Eumeta* Walker, qui comprend les mêmes caractères génériques ;

2^o Que le genre *Dappula* Moore, constitué pour *Oiketicus tertius* Templeton = *Templetonii* Westw., peut être rayé : l'insecte en question est un *Oiketicus* vrai ;

3^o Que le genre *Bambalina* Moore, constitué pour *O. consortus* Templeton, peut être rayé également : l'*O. consortus* Templ. étant une *Eumeta* vraie.

4^o Que mon groupe *Oiketicoides* doit céder le pas au genre (groupe) *Chalia* Moore (*Annals of Nat. History*, 1877, p. 345) ; le dernier ayant la priorité ;

5^o Qu'il est nécessaire de faire pour les *Oiketicides* un genre nouveau, que je nommerai *Deborrea*. (Je dédie ce nouveau genre à M. A. Preudhomme de Borre, le savant entomologiste qui a tant fait pour la collection des insectes du Musée royal d'histoire naturelle, et qui est l'âme et la vie de la Société entomologique belge.)

Comme le groupe *Chalia* Moore (*Oiketicoides* m.) relie les *Oiketiciina* H.-S. aux *Psychina* par l'anastomose des internes, le genre *Deborrea* m. est le trait d'union entre les deux sous-familles en ce que les internes sont formés comme pour les *Psychina* (1).

DEBORREA nov. gen.

Antennes bipectinées jusqu'au sommet. Les ailes sont allongées, et relativement larges. L'abdomen dépasse à peine l'angle anal. La cellule discoïdale des ailes antérieures et postérieures a une cellule interposée. L'interne 1a ne s'anastomose pas avec l'interne 1b.

Deborrea Malgassa m.

Mas. Griseo-fuscus, supra pallidior, subtus obscurior, fere brunneo-fuscus ; dense hirtus ; capite antice fusco, postice griseo ; antennis hirtis griseo-fuscis, ad apicem bipectinatis, ciliis medio-criter longis, a medio ad apicem decrescendis, 38-articulatis ; pseudopalpis brunneo-fuscis, brevibus ; thorace abdomineque griseis, dense et longe hirtis ; abdomine angulum analem haud superante.

(1) J'espère bientôt prouver que, depuis l'*Oiketicus* vrai de Lansd.-Guilling jusqu'aux *Flumea* inclusivement, on ne peut admettre qu'une seule et même famille.

Pedibus griseis, tibiis tarsisque pilosis; tibiis anterioribus spina maxima tibiam superante, adhærente.

Alis anterioribus elongatis, dense squamulis, supra griseis, subtus griseo-brunneis, obtectis; alis inferioribus, præsertim margine exteriori, rotundatis, apicibus tamen angulisque analibus.

Fimbriis griseo-fuscis nitidis.

Alis anterioribus costis 12; posterioribus 8; cellulis discoidalibus cellula intrusa.

Expansio alarum 36 mill.

Sine larvæ involucro; larva feminaque ignotæ.

Habitat : Insula Madagascar.

♂ in Museo Staudinger.

La description détaillée suivra dans ma monographie.

Au genre *Animula* H.-S., j'ai à ajouter deux espèces nouvelles :

1^o ***Animula dimidiata* m.**

Mas. Brunneo-fuscus, dense hirtus; capite antice posticeque albo-griseo; antennis brevibus flavo-griseis, ciliis longioribus fuscis, 26-articulatis; pseudopalpis griseis; thorace abdomineque pilis longis obtectis griseis; partibus genitalibus flavis; abdomine angulum analem haud superante.

Pedibus flavis dense griseo-hirtis, tarsisque fere nudis.

Alis anterioribus elongatis basi angustiori, marginem tamen versus exteriorem latioribus, ad basin squamulis fusco-brunneis dense obtectis sed parte exteriori hyalina, marginibus omnibus anguste nigris, fimbriis basi nigricantibus parte exteriori flavicantibus nitidis atque brevibus; costis 11.

Alis posterioribus rotundatis, ad basin dense squamulis fusco-brunneis obtectis; parte exteriori hyalina, marginibus anguste nigris, fimbriis ut apud alas superiores, costis 7. — Cellularum discoidalium cellula intrusa nulla.

Expansio alarum 22 mill.

Femina erucaque ignotæ.

Involucrum erucæ longum, ad basin latissimum, foliis siccis majoribus minoribusque longitrorsum atque irregulariter obtectum; longitudine 60 mill.

Habitat : Patria incognita.

♂ (e Museo Guénée) in Museo Oberthür.

(De cette espèce, comme de la suivante, je donnerai aussi la description détaillée dans ma monographie. D'ailleurs, toutes les espèces nouvelles des *Psychides* seront figurées.)

2^o ***Animula basalis* m.**

Mas. Albo-griseus; capite antice posticeque albo-griseo; anten-

nis flavis, ad apicem bipectinatis, ciliis longioribus fuscis, brevibus, 26-articulatis; pseudopalpis longis albidis; thorace abdomineque pilis albidis obtectis; abdomine angulum analem haud superante.

Pedibus flavis, dense hirtis, tarsisque fere nudis.

Alis anterioribus fere totis hyalinis, pars basalis tamen cellularum omnium squamulis fuscis dense oblecta; costis 11.

Alis posterioribus totis hyalinis, subrotundatis, margine interno pilis longis albidis; costis 7.

Fimbriis alarum omnium albidis. — Cellularum discoidalium cellula intrusa nulla.

Expansio alarum 24 mill.

Sine larvæ involucro. Femina erucaque ignotæ.

Habitat : Patria ignota.

♂ in Museo Staudinger.

M. Francis Walker a fait (Lists of the spec. of Lepid. Insects in the Collection of the British Museum, part IV, *Lep. Heterocera*, et les suppléments 2 et 5) de la famille des *Psychidæ* une *olla podrida* de *Psychidæ*, *Liparidæ*, *Tineidæ*, etc.; donc, il n'a pas peu contribué à la confusion qui existe malheureusement encore aujourd'hui. Il suffit de rappeler ici que les genres dont les chenilles se fabriquent un fourreau, ou dont les insectes parfaits ont la cellule discoïdale divisée par une nervule (et de ces derniers il y a une grande quantité) n'appartiennent pas pour cela à la famille des *Psychidæ*.

Les *Oecobia Frauenfeldi* Scott, *Conceca Guildingi* Scott, *Oecinea Felderi* Scott et *Scotti* Mac Leay (*Australian Lepidoptera*, by A. W. Scott, plate 9) ne sont certainement pas des *Psychides*, et je suspecte même un peu *Aprata Thrailesii* Moore et *A. Mackwoodii* Moore, nonobstant le fourreau héliciforme de la première, de ne pas appartenir à cette famille. (Vide : *Lepidoptera of Ceylon*, part VII, pl. 118.)

Il y a bien peu de familles si parfaitement circonscrites et limitées que les *Psychides*, mais il faut les considérer *sensu Schranki*, en y ajoutant naturellement les améliorations en fait de description du Dr Herrich-Schäffer et des autres maîtres en lépidoptérologie.

On peut rayer de notre famille, même sans les avoir vus, tous les genres dont Walker dit, par exemple : " Palpi porrecti, palpi nigri basi albi ", en un mot, dont il décrit les palpes, et sa division entière *A. Femina alata*.

Ses genres *Psychographa*, *Psychanisa*, *Pseudopusa*, *Lobedera*, *Perina*, *Nemeta*, *Panisa*, *Gonometa*, *Entometa*, *Perophora* (Harris), son *Oiketicus basiger*, *Phryganidea* Pack (mentionnée

par lui), *Casphalia*, *Crexa* et *Eupalia* ne doivent pas être comptés parmi les *Psychides*, tandis que le genre *Eumeta* et le genre *Moneta* y appartiennent, comme aussi les genres *Thyridopteryx* Steph. et *Kophene* Moore.

Au genre *Eumeta* Walk., j'ai à ajouter deux espèces nouvelles.

1° *Eumeta Japonica* m.

Mas. Brunneo-fuscus, dense hirtus; capite antice posticeque fusco; antennis fuscis ad apicem bipectinatis, ciliis brunneo-fuscis a medio decrescens, 36-articulatis; pseudopalpis longioribus, fuscis; thorace abdomineque omnino fuscis.

Pedibus fuscis, dense pilosis etiamque tarsis; tibiis anterioribus spina maxima, tibiam superante, adhærente.

Alis anterioribus dense squamulis brunneo-fuscis obtectis, margine tamen anteriori dilutiori; costis 12.

Alis posterioribus dense ut supra squamulatis, margine exteriori paulo excavato; costis 8.

Fimbriis basi brunneis, parte exteriori flavescentibus.

Expansio alarum incerta, quia alæ imperfectæ sunt.

Larva feminaque mihi ignotæ.

Larvæ involucrum pyriforme, magnum, conis *Pini cedri* valde simile est, ramulis foliisque *Cedri* aut *Thuie* obtectum; longitudo 35 mill.

Pupa maris nigra nitida, segmentibus abdominalibus supra nigris, infra flavo-brunneis.

Habitat: Japan, prope Tokio.

♂, pupa et involucrum in Museo Heylaerts.

2° *Eumeta brasiliensis* m.

Mas. Brunneo-fuscus, dense hirtus; antennis fuscis ad apicem bipectinatis, ciliis longioribus, obscurioribus; pseudopalpis brunneo-fuscis ut thorace abdomineque.

Pedibus flavo-brunneis, dense pilosis.

Alis anterioribus brunneo-fuscis, dense squamulatis; margine anteriori subrotundato; costis 12.

Alis posterioribus ut supra, margine exteriori paulo excavato; costis 8.

Expansio alarum 23 mill.

Larvæ involucrum cylindricum, longit. 24 mill., dense ramulis, lichenibus albis et foliis siccis brunneis obtectum.

Larva nigricans, capite nigro, strigis punctisque flavis, segmentis tribus primis dorso nitido-flavis, nigro strigatis et punctatis.

Pupa maris castanea.

Habitat: Brasilia. — Pinal.

2 ♂♂. Unus in Museo Zeller (nunc Lord Walsingham ; alter cum larva sicca, et involucrum in Museo Heylaerts.

Cette espèce s'approche un peu de l'*Oik. Surinamensis* Möschl., mais je donnerai, dans ma monographie, une description plus ample.

M. le professeur Carlos Berg a eu la bonté de me faire parvenir son *Annecta lepidopterologica* (Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, t. XIV). Il y décrit, page 276, l'*Oik. Platensis* Berg, et en fait une espèce nouvelle. Effectivement M. C. Berg a bien vu ; l'*Oik. Kirbii* Lansd.-Guild. de la République Argentine a la coupe des ailes comme il le dit. Pourtant *Oik. Kirbii* Lansd.-Guild. varie. Au Mexique, dans l'île de Cuba, l'on trouve la variété *Poeyi* Luc. Le type se trouve à la Guyane, au Brésil, etc., et la variété *Platensis* en Argentina et Uruguay. Qu'on pense seulement à *Ps. Villossella* O. et ses variétés. J'ai ici le type et ses deux variétés devant moi, et je ne vois pas la moindre différence en nervulation et en dessins.

DESCRIPTION DE DEUX BOMBYCIDES EXOTIQUES NOUVELLES.

Parmi les quelques lépidoptères que M. le Dr Staudinger a soumis à mon examen, il y en a deux que je m'empresse de décrire. Ce sont :

1° *Pentophora Bolivari* m.

Mas. Niger, dense hirtus ; antennis nigris, longis atque ad apicem pectinatis, ciliis longis, longitudine fere æqualibus, medio tamen paululo longioribus, 34-articulatis ; capite parvo nigro hirsuto ; palpis brunneo-nigris hirsutis ; lingua spirali invisibili ; thorace nigro hirsuto ; abdomen deest.

Pedibus nigris pilosis ; tibiis anterioribus spina tibiali, posterioribus calcaribus parvis.

Alis anterioribus atque posterioribus subrotundatis, hyalinis, nigro-marginatis, venis nigris ; primis costis 12, secundis costis 8.

Expansio alarum 16 mill. (N. B. *Pentophora Morio* L. exp. 23 mill. !)

Habitat : Merida (Venezuela interior).

♂ in Museo Staudinger.

A la diagnose, je n'ai presque rien à ajouter, si ce n'est que la bordure noire est surtout intense sur le bord antérieur et externe des deux ailes. Ensuite, j'ai pu m'assurer que le dessin du Dr Herrich-Schäffer (Syst. Bearb. Schm. von Europa, VI, pl. XX, fig. 27) est incomplet, car la cellule discoïdale des ailes antérieures est assurément

ment divisée par une nervule. Mes exemplaires de *P. Morio* L. et l'espèce que je viens de décrire en sont les preuves. Quant à la nervulation, il y a quelque différence entre les espèces européenne et américaine, mais pas assez grande pour faire un genre nouveau, bien s'en faut. *Bolivari* m. a, pour les ailes antérieures, l'excavation du bord extérieur de la cellule discoïdale (discocellulaire) plus profonde que *Morio* L.; 6^e et 7^e des ailes postérieures naissent chez la seconde d'un seul point, tandis que chez la première, elles prennent leur origine isolément.

2^o *Nemeta Sumatrensis* m.

Mas. Flavo-brunneus, fuliginoso partim varius: capite parvo antice posticeque flavo-brunneo ut palpi ascendentes breves; oculis magnis; antennis flavo-brunneis, 22 primis basi approximatis articulis bipectinatis ciliis mediis longioribus, 26 aut 28 sequentibus serratis; thorace abdomineque robustis atque pilosis.

Abdomen angulum analem valde superans.

Pedibus fulvis pilosis fortiterque ciliatis, tibiis posticis calcaribus concoloribus apicalibus.

Alis anterioribus valde elongatis, apice subrotundato, marginibus ant. et int. fere rectis, ext. subrotundatis, flavo-brunneis fuliginoso-obscuratis; strigis transversis duo nigris, prima angulata, secunda perobliqua et supra retrorsum angulata, marginem anteriorem versus divergentibus; macula discali parva flava, macula apicali magna nigra.

Alis posterioribus nigris, trigonis, margine interiori piloso, exteriori truncato aut paulo excavato. — Fimbriis omnino flavo-brunneis, nigro-variis.

Alis subtus nigris nigris flavo-brunneo marginatis, macula apicali nigra.

Expansio alarum 30 mill.

Habitat : Insula Sumatra, Sipoholon.

♂ in Museo Staudinger.

♂. La tête, très velue, est relativement petite, les yeux assez grands et ronds, les palpes ne dépassent pas la tête et sont d'un brun jaunâtre assez clair, ascendants, ronds, velus, et le 3^e article a la figure d'un pompon. Les antennes sont brunes, les 22 premiers articles sont bipectinés, tandis que le reste est simplement crénelé, les dents ou crénelures étant très fortes.

Le thorax est très fort et large; le collier est également très large, d'un brun jaunâtre plus foncé et porte une strie noirâtre assez forte au milieu; les ptérygodes sont noirâtres, bordées d'un brun jaunâtre assez clair, le reste du thorax est plus foncé en dessus et plus clair en dessous. Les poils squammeux qui couvrent

les parties décrites sont surtout très larges sur le collier et la partie inférieure du thorax, où ils forment trois grandes touffes; la plus large, au milieu, couvre presque entièrement le premier segment abdominal; les deux autres s'étendent jusque sur la base des ailes antérieures.

Sur l'abdomen, les poils squammeux sont mêlés de poils ordinaires et plus noirâtres, et sur la face dorsale des 3^e et 4^e segments, de petites touffes en sont formées également.

Sur le dernier segment, se trouvent cinq faisceaux de poils : un très large sur la face dorsale; deux des deux côtés et deux en dessous; ces deux derniers sont plus clairs et ils entourent les organes sexuels. Les pinces ou valves sont démesurément longues et larges; en dessus, elles ont la livrée de l'abdomen, en dessous, elles portent des poils d'un jaune d'or et ont, en bas, une bordure noire assez large.

Les pattes sont assez grêles, les dernières très longues et très velues, même les tarses. Des poils squammeux, très longs et fourrés, garnissent la face postérieure, surtout de la dernière paire, comme une espèce de frange. Cette frange est colorée comme le dessous de l'abdomen, mais à l'extérieur, le fuligineux prédomine.

Les ailes antérieures sont très allongées, à apex arrondi, et les bords, etc., sont comme les décrit la diagnose. Leur couleur en dessus est d'un jaune brunâtre presque orangé, seulement visible à la base et aux bords, surtout l'antérieur et l'interne. Le reste est couvert de fuligineux. La première strie transversale, bien visible seulement vers le bord interne, est presque verticale, mais anguleuse, et forme, avec une petite strie longitudinale qui la coupe, un M renversé (∇). La deuxième est très oblique et s'étend d'un peu avant l'angle anal vers l'apex, mais, avant de l'atteindre, elle se courbe en arrière et se perd près du bord antérieur. Entre elles, tout près du bord antérieur, se trouve une petite tache discale qui a la couleur du fond, entourée de trois taches noirâtres. Une large tache noire couvre la région apicale. En dessous, la couleur est d'un fuligineux noirâtre, le bord extérieur est jaune brunâtre. La tache apicale seule se voit et les nervures y sont blanches; pour le reste des ailes, elles sont brunes.

Les ailes postérieures sont, en dessus comme en dessous, fuligineuses, plus claires au milieu, et ont une bordure jaune brunâtre.

La nervulation est la suivante. Les cellules discoïdales sont divisées par une nervule. Les ailes antérieures ont 12 nervules. Les deux internes touchent toutes les deux le bord et sont convergentes, 2, 3 et 4 naissent de la partie inférieure de la cellule; 5 naît un peu en dessous de la nervule divisant la cellule; 6, un peu au-dessus; 7, 8 et 9 naissent d'un même pédoncule; 10 prend son origine de

l'angle supérieur cellulaire; 11, un peu plus en arrière et 12 de la base de l'aile.

Les ailes postérieures ont 3 internes. 2, 3, 4 et 5 naissent isolément de la partie inférieure cellulaire; 6 et 7 de l'angle antérieur cellulaire et 8 de la base. Comme il n'y a pas d'ocelles, la nervulation indique que *Nemeta Sumatrensis* est une *Cossina* sensu Herrich-Schäffer.

Dans un petit travail, qui paraîtra prochainement dans les *Notes from the Leyden Museum*, j'aurai l'occasion de dire un peu plus sur le genre *Nemeta* Walk.

Je terminerai en faisant la remarque synonymique suivante :

Pseudo-psyche Dembrowskyi Oberthür. Étude V (déc. 1880), p. 41, pl. 2, fig. 4 ♂, fig. 5 ♀. M. F. Moore décrit (*Annals and Magaz. of Natural History*, vol. XX, 4^e sér. 1877, p. 85) la même espèce, pour laquelle il érige le genre *Preyeria*. Il paraît qu'il n'a pas vu la femelle, car il dit les antennes *broadly pectinate, plumose*. Toutefois, le genre et l'espèce sont très reconnaissables. A la dernière, il donne le nom de *Sinica* Moore.

Preyeria Sinica Moore a donc la priorité sur *Pseudopsyche Dembrowskyi* Oberthür. M. le Dr Staudinger m'a soumis un couple de la même espèce (la femelle malheureusement sans antennes) parfaitement conservé et frais. La femelle est comme la décrit M. Oberthür, mais le mâle, dont M. F. Moore donne une description à peu près pareille à celle du premier auteur, diffère en ce que le *jaune* du thorax, du bord interne des ailes supérieures et de l'abdomen est d'un beau *rouge vermillon*. Je proposerais de laisser le nom *Dembrowskyi* Oberthür à cette aberration ou variété et de placer genre et espèce parmi les *Cossina* (sensu Herr.-Schaff.), car je crois que M. Moore se trompe en les plaçant parmi les *Zygoina*. La *nervulation* et le *manque des ocelles* (du moins je ne les vois pas du tout) le veulent ainsi.

M. de Borre prend la parole et s'exprime comme suit :

Il vient d'être imprimé, à Bruxelles, mais en langue espagnole, ce qui en limitera nécessairement beaucoup les lecteurs parmi nous, un très intéressant mémoire sur les origines de la sériciculture au Mexique (*Apuntes historicos sobre el cultivo de la seda en Mexico*. — Bruxelles, Mayolez, 1883.) L'auteur, don Angel Nuñez Ortega, ministre résident des États-Unis mexicains en Belgique, est un savant distingué, qui a déjà publié d'autres travaux relatifs à son pays.

Des recherches érudites dans les auteurs anciens, à partir des contemporains de la découverte et de la conquête du Mexique par Fer-

nand Cortez, lui ont permis d'établir, pour la sériciculture mexicaine, une double origine. L'importation de cette industrie en Amérique par les Espagnols, très peu après leur établissement au Mexique, se déduit aisément de nombreux documents historiques imprimés ou reposant, manuscrits, dans les archives de l'ancienne colonie et de la mère patrie. Mais en même temps, il y a une sériciculture autochtone ou plus probablement d'origine asiatique, vu les rapports de long-temps antérieurs à la découverte de l'Amérique par les Européens, rapports que les recherches récentes établissent tous les jours plus clairement avoir existé entre les peuples de l'Asie orientale et l'Amérique occidentale. Mais quelle était cette sériciculture? Faut-il y voir, avec Humboldt, l'éducation ou l'utilisation industrielle des chenilles de certains grands Saturnides, comme le *Mylitta* ou le *Yama-Mai*, que les Orientaux auront introduits en Amérique? S'agit-il peut-être d'espèces indigènes? Ou le *Sericaria mori* était-il arrivé d'Asie au Mexique avant même d'y être apporté par les Espagnols, et s'y trouvait-il avoir déjà produit une race locale sauvage, comme le ferait penser une phrase de l'historien Frère Toribio de Benavente, qui écrivait au milieu du xvi^e siècle? Tout cela est exposé et discuté par l'auteur, mais sans qu'il ait réussi à dissiper entièrement l'obscurité de ces origines. Nous pensons qu'elles ne pourront l'être que lorsque la question aura été aussi abordée et consciencieusement travaillée au point de vue entomologique, avec une connaissance plus complète des Bombycides de la faune mexicaine, de leurs mœurs et de leur origine que celle que la science possède actuellement. C'est afin d'exprimer ce désir que j'ai cru devoir signaler ici l'intéressante étude de M. Nuñez Ortega.

M. Donner donne ensuite lecture de la note suivante :

Il est probable que le ver à soie dont il est question dans le mémoire de M. Nuñez Ortega sur l'histoire de la sériciculture au Mexique, et que l'on rencontre dans une zone qui s'étend du golfe de Tehuantepec à travers les districts de Michoacan, Chilpaninga et Mixteca, jusqu'au golfe du Mexique, n'est autre que le *Bombyx Psidii* décrit par M. A. Sallé et dont M. Maurice Girard, dans sa conférence du 16 juillet 1863, sur les auxiliaires du ver à soie, disait ce qui suit :

« Le Mexique présente une espèce de *Bombyx* dont les mœurs et l'utilité sont analogues à celles des *Bombyx Diego* et *Kadama* de Madagascar. C'est le *Bombyx Psidii* décrit par M. Sallé, qui a le premier signalé sa soie sauvage. Les insectes parfaits ressemblent, par le port et la coloration, au *Bombyx Rubi* d'Europe. Les chenilles se trouvent dans la région tempérée du Mexique;

« ainsi, près de Cordova (État de Vera-Cruz), par 900 mètres
 « d'altitude, elles vivent sur le Goyavier et sur une espèce de
 « chêne. Elles font un nid commun de 80 centimètres de hauteur,
 « d'une blancheur souvent éclatante, et dans lequel chaque che-
 « nille se file un cocon. Elles restent larves environ, huit mois
 « avant de se chrysalider. On file les grands cocons ou poches au
 « fuseau, et l'on en obtient des tissus très réguliers. »

Sauf les dimensions des poches ou nids, la description donnée par M. Girard s'accorde avec celle qui se trouve dans le mémoire de M. Nuñez Ortega, mais cette divergence peut s'expliquer par le fait rapporté par ce dernier, que le nombre de chenilles qui se réunissent pour filer une seule et même poche présente un écart considérable.

La soie de ces poches ou nids et des cocons qu'elles contiennent, ne peut se dévider ; elle doit être travaillée à la machine à carder, comme les cocons percés et doubles du *S. Mori* ainsi que ceux de l'*Attacus Cynthia* et autres cocons à ouverture naturelle. Elle est ensuite filée sur des machines analogues à celles dont on se sert pour le coton et la laine.

Ce travail de cardage et de filature se fait de la façon la plus parfaite chez MM. Clayton, Marsdens et Holt, à Halifax (Angleterre).

Les soies à carder, débarrassées de leurs chrysalides, valent actuellement en Angleterre 1 shelling 3 pences à 1 shelling 6 pences la livre anglaise.

La soie dévidable des cocons fermés des séricigènes sauvages a une valeur triple. Il y aurait donc intérêt pour le gouvernement du Mexique à faire rechercher si, sur les vastes territoires de ce pays, où le chêne et le pin maritime abondent, il ne se rencontre pas, comme dans les contrées de l'Amérique septentrionale et méridionale qui avoisinent le Mexique, des cocons sauvages fermés, dont la soie dévidable pourrait concourir avec les soies sauvages de la Chine et de l'Inde et produire un revenu important pour le pays, soit en travaillant les cocons sur place par des procédés récemment découverts, soit en les vendant en Europe.

La Société Entomologique étudierait avec intérêt, au double point de vue scientifique et industriel, les envois que M. Nuñez Ortega lui ferait parvenir.

Quant aux hypothèses soulevées dans son mémoire par M. Nuñez Ortega, relativement aux caractères et à la provenance des soies qui auraient été connues au Mexique à une époque antérieure à la conquête espagnole, il y aurait peut-être, à défaut de documents écrits autres que ceux mentionnés par M. Nuñez Ortega et dont les indications n'offrent aucun point de repère pour des recherches, et à côté de l'étude, au point de vue entomologique, des séricigènes du

Mexique, un autre moyen d'investigation qui reposerait sur l'examen de spécimens de tissus dont la fabrication remonterait incontestablement à une époque antérieure à la conquête du Mexique, si tant est que des fouilles pratiquées dans ce pays aient fourni de semblables spécimens.

L'étude comparée de ces anciens tissus et des cocons des séricigènes qui se rencontrent actuellement au Mexique, contribuerait probablement à élucider les questions posées par M. Nuñez Ortega, savoir :

« Les tissus de soie connus au Mexique avant la conquête espagnole étaient-ils :

1^o Le produit de séricigènes indigènes ?

2^o Ou de séricigènes étrangers introduits et élevés au Mexique ?

3^o Ou constituaient-ils simplement un article d'importation sans rapports avec l'industrie indigène ? »

Voici les considérations sur lesquelles cette opinion est fondée.

Les brins des séricigènes dits sauvages, connus et étudiés, tels que ceux originaires des États-Unis d'Amérique, de la Guyane, du Brésil, de l'Afrique, de la Chine, du Japon et de l'Inde, présentent non seulement entre eux, mais encore avec ceux des différentes espèces de vers à soie du mûrier, des différences de forme, de poids, d'élasticité et de couleur assez notables pour être distingués les uns des autres au moyen du microscope, du micromètre et des instruments employés au titrage des soies. Il est à présumer que les séricigènes du Mexique, qui n'ont pas encore été étudiés, mais dont on pourrait obtenir des cocons, présenteront également des caractères à eux particuliers.

Il s'ensuit que l'on pourrait, par l'examen d'un tissu de soie, arriver à déterminer, sinon avec une certitude absolue, du moins avec grande probabilité, l'espèce de séricigène dont sa fibre provient. Le filage, le tissage et les couleurs du tissu feront connaître le pays de provenance de celui-ci et peut-être aussi l'époque à laquelle sa fabrication remonte, les musées de l'Angleterre renfermant une riche collection de spécimens modernes et anciens qui pourraient servir de types de comparaison.

Ce ne serait qu'au cas où il s'agirait de déterminer l'origine d'un tissu composé de soie des espèces des vers du mûrier que cette étude comparative ne serait pas applicable à la détermination de l'espèce et de son lieu d'origine, les brins des différentes espèces des vers à soie du mûrier, où que ceux-ci aient été élevés, ne présentant plus, une fois décrus et travaillés, de caractères distinctifs assez marqués pour les faire reconnaître. En ce cas, le filage, le tissage et les couleurs du tissu pourraient seuls fournir les indications nécessaires, et cela suffirait pour le but que poursuit M. Nuñez Ortega,

puisque, d'après son mémoire, il est établi que ce sont les Espagnols qui ont introduit le mûrier, et par conséquent le ver à soie du mûrier au Mexique. Donc, s'il a été trouvé, dans les fouilles faites au Mexique, des tissus de soie anciens, que l'examen ferait reconnaître comme composés de soie du ver du mûrier, ce ne pourraient être que des tissus importés dont l'ouvraison et les couleurs feraient reconnaître l'origine.

Si la Société Entomologique croit utile de soumettre ces observations à M. Nuñez Ortega, il y aurait lieu de lui signaler que l'apparence des tissus de soie de fabrication très ancienne, notamment lorsqu'ils se composent en tout ou en partie de soie dite sauvage, diffère notablement de celle des tissus de soie modernes; que parfois même ils ressemblent, à s'y méprendre, à des tissus de fibres végétales et que, par suite, il pourrait ne pas être sans intérêt de soumettre à un examen attentif même les tissus anciens qui, à priori, auraient été considérés comme composés de fibres autres que la soie. Même à notre époque, quelques peuplades à demi sauvages de la frontière de l'Inde et de la Chine font, de la soie des *Attacus Pernyi*, *Mylitta* et *Assamensis*, des tissus grossiers qui ressemblent plus à du lin qu'à de la soie.

M. Donner met ensuite sous les yeux de l'assemblée un écheveau de la soie ouvrée résultant de ses dernières expériences de dévidage des cocons de l'*Attacus Mylitta* de l'Inde septentrionale. Le titre le plus fin qu'il a ainsi obtenu est celui qui, en langage du métier, s'appelle *organsin 24 deniers*. Il donne quelques détails intéressants sur les procédés qu'il a employés.

M. de Borre demande la parole et donne lecture d'une lettre que lui a récemment adressée notre collègue M. Weyers :

En examinant hier soir chez moi la troisième édition du *Catalogus coleopterorum Europæ et Caucasi* (auct. L.v. Heyden, Reitter et Weise), j'ai remarqué, parmi les espèces du genre *Cicindela*, une indication qui semble confirmer une observation que j'ai faite jadis et dont j'avais fait part à notre regretté M. Putzeys.

Je chassais à cette époque presque continuellement à Calmpthout et je lui remettais régulièrement mes récoltes, à l'exception des espèces qui me semblaient trop vulgaires.

Par pure curiosité, j'avais recueilli un peu partout, sur le vaste territoire de Calmpthout, un assez grand nombre de *Cicindela hybrida* ainsi que de *C. maritima*, qui étaient considérées comme deux espèces distinctes, mais que je tenais, quant à moi, pour une seule et même espèce. Le type était beaucoup plus répandu que la variété *maritima* et j'avais eu la chance de trouver quelques passages intermédiaires entre les deux. J'étais bien convaincu que ces

deux formes ne représentaient qu'une seule et même espèce, après les avoir comparées à un assez grand nombre d'individus des deux formes que j'avais recueillis sur le littoral, à Ostende et à Heyst, types et variétés des deux provenances ne présentant aucune différence.

Vous savez combien les espèces de coléoptères sont parfois localisées à Calmpthout d'une manière remarquable. Je venais précisément de faire la découverte du *Bembidium argenteolum* et j'avais remarqué que la mare sur les bords de laquelle je l'avais exclusivement capturé présentait des conditions particulières qui la différenciaient quelque peu des autres mares de cette localité; d'un côté, elle était limitée par une plage unie, d'un beau sable, qui remontait en pente très douce jusqu'aux dunes, situées à une assez grande distance (environ 150 mètres) et qui avaient évidemment fourni les matériaux dont elle était composée, sous l'influence des vents d'ouest qui soufflent presque constamment dans cette partie de notre pays. Le long des bords, cette plage était constamment humectée sur une largeur de quelques mètres et percée par quelques tiges isolées de *Carex* et d'une Graminée à racines très traçantes. Les bords opposés allaient se perdre dans la bruyère, sauf à une des extrémités, où les bords, composés d'un sable blanc très pur, étaient élevés de quelques pieds; là on trouvait quelques excavations faites dans un but évidemment industriel, et je me rappelle que c'est dans l'une d'elles que j'ai fait la découverte du premier exemplaire du *Carabus clathratus* trouvé à Calmpthout.

C'est sur cette plage sablonneuse, à l'époque où la *Cicindela hybrida* et sa variété avaient presque complètement disparu, que j'avais trouvé le *Bembidium argenteolum*, et en le pourchassant, mon attention fut attirée par une *Cicindela* de petite taille, d'une couleur assez foncée, que je pris d'abord, à distance, pour une *C. germanica*; mais je fus bientôt détrompé en l'examinant de plus près. Le dessin caractéristique me fit voir que j'avais affaire à une variété de la *C. maritima*, remarquable par sa petite taille et cette couleur foncée. Je continuai la recherche de cette variété et je recueillis une trentaine d'exemplaires dont je constatai avec surprise le dessin caractéristique constant et uniforme. Rentré chez moi, je piquai tous mes exemplaires et je les plaçai sur deux rangées sous mes autres *maritima*, dans une boîte spéciale que j'avais destinée à mon étude. En les examinant et en les comparant aux autres *maritima*, je fus frappé des différences notables qui existaient entre ces individus et l'autre variété *maritima*. Les nouveaux-venus étaient sensiblement plus petits de taille, plus étroits, par conséquent plus parallèles, ce qui leur donnait un aspect plus svelte et plus élégant. La couleur foncière des élytres était aussi plus foncée et le dessin

caractéristique, franchement accusé, présentait la même constance chez tous mes exemplaires; les ♂ étaient un peu plus petits que les ♀. Assez intrigué en constatant des différences aussi notables et en considérant l'époque tardive d'apparition de la variété que je venais de capturer, je me demandai si ce n'était pas là la véritable *maritima* de Dejean, constituant une espèce distincte de l'*hybrida*, à laquelle seule on pouvait rapporter les variétés que j'avais prises antérieurement.

Je retournai à Calmpthout le dimanche suivant avec Van Volxem et nous recueillîmes tous les deux encore un certain nombre d'exemplaires. Le lendemain, Van Volxem vint chez moi, je lui montrai ma boîte de Cicindèles et je lui exprimai mon opinion; après les avoir examinées attentivement, il déclara qu'il était du même avis que moi, mais je me réservai d'en parler à plus compétent que nous deux en pareille matière. J'allai rendre visite à M. Putzeys le jour même, en lui apportant ma boîte, et je lui fis part également de mes observations. Il fut frappé comme moi des différences notables des deux variétés et me dit que je pourrais bien avoir raison, mais il n'osa pas se prononcer sur-le-champ et me pria de lui laisser ma boîte pour les examiner plus attentivement, ce que je fis de grand cœur en lui disant de la conserver pour sa collection. Mais les choses en restèrent là, et notre illustre collègue, soit oubli, soit par toute autre cause, ne m'en a plus jamais reparlé depuis.

Les années suivantes, je recueillis encore la même variété, exclusivement sur les bords de la même mare et également à la même époque, quand la *C. hybrida* et sa variété ordinaire avaient disparu, ou presque entièrement disparu. Je ne l'ai jamais trouvée sur les bords d'aucune autre mare des environs de Calmpthout.

Il est possible que depuis (il y a environ dix ans) la physionomie de cette mare ait été modifiée, car l'avancement des sables sous l'influence des vents d'ouest devenait d'année en année plus marqué. Je n'ai également trouvé personnellement le *Bembidium argenteolum*, ainsi que ses variétés remarquables, que dans ce même emplacement, qui était un de mes terrains de chasse favoris.

Donc, en examinant le Catalogue en question, j'ai remarqué que les auteurs donnent à la *Cicindela hybrida* une variété *maritima* (auct. ross.) et qu'ils considèrent la *maritima* de Dejean comme espèce, en lui donnant comme synonymie la *ballica* de Motschulsky. En voyant cette indication, qui semble donner raison à mes suppositions anciennes, mes souvenirs se sont réveillés et j'ai examiné à son tour votre *Première Centurie de la province d'Anvers*, pour voir ce que vous en disiez. Vous considérez la *C. hybrida* comme espèce distincte, ainsi que le *C. maritima* de Dejean, à laquelle vous donnez comme variété celle que je considère comme la variété

maritima de l'*hybrida*, et vous indiquez également comme variété, en en faisant un peu ressortir les particularités, celle que je considère comme la véritable *C. maritima* de Dejean.

Il serait intéressant de vérifier le fait et vous seul pouvez trancher la question, car vous avez à votre disposition et les livres et les matériaux nécessaires. Je vous engage vivement à faire cette examen intéressant. Les matériaux dont vous pouvez disposer sont : 1^o la collection Putzeys, dans laquelle vous retrouverez tout au moins un certain nombre des exemplaires recueillis par moi, et peut-être aurez-vous la chance de retrouver ma boîte ; 2^o la collection de notre regretté Van Volxem, dans laquelle vous en retrouverez aussi probablement. Vous pourriez aussi revoir attentivement les descriptions de Dejean et de Motschulsky et remarquer les lieux de provenance des types qu'ils ont décrits.

Comme il est probable que M. Putzeys aura donné quelques exemplaires et en aura parlé à M. de Chaudoir, qui possédait les types de Dejean et dont la collection est passée, depuis, entre les mains de notre collègue Oberthur (¹), vous pourriez, au besoin, lui demander ce type en communication, ce qui serait concluant.

Si votre examen venait donner raison à mes suppositions, il aurait pour résultat de modifier quelque peu l'énumération de nos espèces belges, particulièrement pour la province d'Anvers. Dans ce cas, vous devriez donner à la *C. hybrida* comme variété *maritima*, celle qu'on trouve sur le littoral et en même temps à Calmthout, et conserver comme espèce distincte et *sans variétés* la *C. maritima* de Dejean (*baltica* de Motsch.). Cette dernière deviendrait ainsi une espèce caractéristique de la province balte de votre royaume entomologique baltique.

Agréez, etc.

P.-S. Avez-vous examiné le catalogue en question ? Il me paraît bien travaillé et bien soigné, mais j'y remarque des choses bien extraordinaires en fait de changements de noms, ce que je trouve regrettable, quel que soit le progrès accompli. Je vous conseille de

(¹) M. Weyers se trompe. Ce n'est pas M. Oberthur qui possède les Cicindèles de feu M. de Chaudoir et de l'ancienne collection Dejean. Il n'a acquis que les Carabiques. Les Cicindélides sont au Muséum de Paris. Toutefois, M. Oberthur m'écrit qu'il a dans sa collection trois exemplaires de petite taille de la *Cic. maritima*, avec l'épithète *Campine anversoise*. N'ayant retrouvé que très peu d'exemplaires de cette forme dans la collection Putzeys, où elle est absolument confondue avec la *maritima* des auteurs français, de la taille de l'*hybrida*, j'incline à penser que la petite boîte de notre collègue Weyers aura été envoyée dans le temps par Putzeys à de Chaudoir et que ce dernier en aura disséminé dans les collections.

voir, entre autres choses, ce qu'on a fait du genre *Bruchus* ! c'est renversant. Quand donc aurons-nous fini avec ces exhumations des noms archaïques !

Notre collègue Weyers m'invitant à m'associer à la discussion du point litigieux soulevé par lui, je dirai que je crois qu'il y a lieu de se rallier à ses vues, qui sont probablement déjà celles des entomologistes allemands, d'après ce qu'il a lu concernant la *Cicindela maritima* dans la nouvelle édition du Catalogue des Coléoptères d'Europe.

J'ai sous les yeux quelques exemplaires de cette petite forme, spéciale chez nous à Calmpthout, les uns pris par M. Weyers, d'autres par Camille Van Volxem, d'autres enfin par moi-même, qui l'y ai également recueillie, ainsi qu'assurément d'autres de nos collègues.

Dans sa collection, Putzeys ne l'a pas distinguée par une étiquette de l'autre *maritima*, celle des côtes, ayant la taille de l'*hybrida* et qui n'en est sans doute, comme le pense M. Weyers, qu'une variété, représentant, au point de vue de la forme de la fascie transversale des élytres, l'extrême opposé de la variété *riparia*.

Putzeys m'avait cependant dit un jour que cette forme de petite taille dont sa collection renferme aussi un exemplaire des bords de la Baltique, était bien certainement la véritable *maritima* de Dejean.

Quand je lis la description qu'en a donnée Dejean, dans le *Species des Coléoptères* (I, p. 67) et dans l'*Iconographie des Coléoptères d'Europe* (I, p. 22-23), je suis cependant plus disposé à croire que le savant auteur comprenait à la fois sous cette dénomination des individus des deux formes aujourd'hui distinguées par M. Weyers, et que, depuis Dejean, la plupart des auteurs ont également confondues sous le nom de *maritima*, soit qu'ils en fissent une espèce, soit qu'ils n'y voulussent voir qu'une variété de l'*hybrida*. Mais la figure de l'*Iconographie* de Dejean (pl. IV, fig. 9) est indubitablement faite d'après un exemplaire de la petite forme de Calmpthout et des bords de la Baltique ⁽¹⁾.

Motschulsky (*Insectes de Sibérie*, p. 25) a décrit à son tour la *maritima* de Dejean et, cette fois, exclusivement d'après les petits exemplaires, sans doute les seuls qu'il ait observés dans les contrées qu'il étudiait. Plus loin (p. 37), des exemplaires de Livonie, qui lui avaient été envoyés sous le nom de *maritima*, lui ont offert

(1) Dejean dit : « Elle se trouve dans le nord de la France, dans les dunes, sur le bord de la mer. Je l'ai aussi reçue de Suède, de Laponie et de Sibérie ; et il est possible que cette espèce soit la véritable *hybrida* de Linné, de Paykull et de Gyllenhal, ou, du moins, qu'elle ait été confondue avec elle par ces naturalistes. »

une forme plus allongée, plus petite encore, et quelques autres caractères qui lui ont fait décrire l'espèce sous le nom de *baltica*. Cette *baltica* me semble devoir être différente de notre petite *maritima* de Calmthout, sans en être probablement plus qu'une race locale.

En Allemagne, les auteurs anciens, et particulièrement Schaum, n'ont pas fait la distinction entre la variété *maritima* de l'*hybrida* et la petite forme *maritima* du nord de l'Europe, qui était sans doute celle qui leur était la plus familière, à en juger d'après leurs descriptions (1).

Les auteurs français qui, au contraire, n'avaient chez eux que les grands exemplaires d'*hybrida* à zig-zag prononcé qu'on trouve sur la côte depuis la Bretagne jusqu'à l'Escaut, n'ont pas non plus fait la distinction, alors même qu'ils élevaient leur *maritima* au rang d'espèce équivalente à l'*hybrida*.

Dans sa *Faune gallo-rhénane* (II, p. 8), M. Fauvel révoque en doute la présence de la *C. maritima* à Calmthout, qu'il ne paraît avoir connue que par moi. Par la présente communication, il verra que cet habitat, dont la première découverte est due à M. Weyers, est parfaitement authentique et que non seulement Calmthout nourrit l'*hybrida* et la *maritima* des côtes franco-belges, mais encore une autre *maritima*, celle des bords de la Baltique, qui est bien la *maritima* de Jeanienne et mériterait encore mieux le rang d'espèce, car il ne s'y trouve pas les mêmes transitions graduelles que les individus du littoral présentent vers l'*hybrida*. Au surplus, on doit probablement voir dans ces individus littoraux un ancien trait d'union rompu entre les deux formes de l'*hybrida* et de la *maritima vera*.

Dans son post-scriptum, M. Weyers demande : Quand donc aurons-nous fini avec ces exhumations de noms archaïques ?

Jamais, sans doute, à moins qu'on ne se décide à y opposer une résistance énergique en restant obstinément attaché aux noms consacrés par l'usage de trois quarts de siècle.

M. de Selys, quittant la séance, est remplacé au fauteuil par M. Weinmann, vice-président.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. de Lacerda :

..... « L'*Hypocephalus* que j'ai offert au Musée Royal est-il un

(1) Le tome XXV de la *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (1881) contient (p. 270) une note de M. le Dr Kraatz établissant la spécificité distincte de la *C. maritima*, d'après la forme du pénis, qu'elle a plus court et moins réuminé que la *C. hybrida*. C'est sur l'autorité de cet article que doivent être basés les auteurs de la nouvelle édition du Catalogue des Coléoptères d'Europe.

mâle ou une femelle? Un exemplaire tout semblable, envoyé à l'abbé Armand David, a été déclaré femelle, et mes amis de Paris m'écrivent que les six envoyés à Deyrolle sont mâles et qu'il faut chercher la femelle *inconnue* en Europe. Je viens d'en voir un exemplaire mutilé, qui est pour moi la femelle. Ci-joint la photographie. »

M. de Borre fait circuler deux cartes photographiques envoyées de Bahia et représentant, vue en dessus et en dessous, cette femelle présumée de l'*Hypocephalus armatus*.

Il donne ensuite lecture d'une note envoyée du Mexique par M. le Dr Dugès :

Je suis en ce moment les métamorphoses d'une larve que je crois être celle d'une *Temnochila*. Je l'ai trouvée sous l'écorce d'un Mezquite (*Prosopis dulcis*). Cet arbre est très employé ici à cause de son bois très dur et peu putrescible. Ses gousses sont sucées pour leur pulpe sucrée; on les a même mangées pendant les famines. C'est lui encore qui sert à chauffer les locomotives, etc. Cet arbre utile est attaqué par une foule d'insectes, le *Cyllene erythropus* et le *Chrysobothrys Atabalipa* principalement. La larve de ce dernier vit sous l'écorce, mais elle doit pénétrer dans le corps de l'arbre pour se transformer, car j'ai trouvé souvent l'insecte parfait engagé dans le trou qu'il fait pour sortir. Il y a des pièces de bois ainsi tout à fait perdues par ces insectes, dont je n'ai pu suivre les transformations. Là aussi j'avais trouvé une larve qui m'avait paru appartenir à une petite Cétonide: Malheureusement, la Faculté venait de m'interdire pendant quelque temps l'usage de l'œil gauche, et je n'ai pas étudié cette larve. Or, elle s'est transformée très vite, tellement que je ne crois pas que l'état de nymphe ait duré plus d'une huitaine, et elle m'a donné une *Psiloenemis leucostictica*. J'ai été fort contrarié, parce que cet insecte est très rare ici. Je n'en ai trouvé en dix-huit ans que trois individus, mais tous ont été rencontrés sous l'écorce d'un même Mezquite, ce qui prouve qu'eux aussi attaquent cet arbre et ce qui pourrait aider aux recherches.

Une autre note de M. Dugès, relative à la *Chrysomela undecimlineata* sera ajoutée au travail que cet auteur nous a présenté sur les métamorphoses de ladite espèce.

M. Lameere fait la communication suivante :

Mathieu cite, dans le tome IV de nos Annales, l'*Agapanthia cyanea* Herbst (*cærulea* Schh.) comme appartenant à notre faune : un exemplaire en aurait été pris à Mons par Demoulin, deux autres à Laroche par Parys.

Depuis lors, cette espèce n'a pas, à ma connaissance, été retrouvée en Belgique. Ayant eu l'occasion de visiter dernièrement la collection de M. J. De Lafontaine, j'y ai vu un exemplaire de *Stenostola ferrea* Schrank capturé à Laroche, que notre collègue m'a affirmé lui avoir été donné par Parys sous le nom de *Agapanthia cyanea* Herbst. L'indication de feu Mathieu est donc fort probablement erronée, du moins quant aux exemplaires pris par Parys, qui seraient alors des *Stenostola ferrea* Schrank, hypothèse d'autant plus admissible que cette dernière espèce n'a pas été mentionnée dans le premier catalogue des coléoptères de Belgique.

Il serait bon que le possesseur actuel de la collection Demoulin s'assurât de l'exacte détermination de l'individu pris à Mons. Je ne pense pas cependant que l'*Agapanthia cyanea* Herbst doive être absolument rayée de notre faune, car cette espèce a été prise à Douai, et, au dire de Bach, elle a été observée en divers points de la Prusse rhénane.

M. de Borre dit que la collection de feu Demoulin se trouve actuellement au Musée communal de Mons.

M. Vanden Branden annonce que, d'après un article de la *Deutsche Entomol. Zeitschrift*, 1883, II (juin), le *Julodis Frey-Gessneri* décrit et figuré par M. Meyer-Darcis, dans le tome XXVII de nos Annales, serait identique au *Julodis variolaris* Pallas, var. *undulata* von Heyden.

M. Vanden Branden propose l'acquisition, pour la bibliothèque de la Société, de deux ouvrages que nous ne pourrions obtenir par échange, à savoir *Cistula entomologica*, dont il est paru 2 volumes, et la première partie d'un troisième (valeur 61 fr. 25 c.) et les années 1882, 1883, 1884 du *Wiener Entomologische Zeitung* (valeur 36 francs).

M. de Borre constate qu'il n'est pas parvenu, en effet, à obtenir l'échange de ces publications.

M. Weinmann appuie cet achat, à condition qu'il soit fait ailleurs que chez les rédactions qui n'ont pas consenti à un échange avec nous.

La proposition sera discutée à notre assemblée mensuelle de février.

M. Devaux entretient l'assemblée du désir qu'il aurait de voir étudier les moyens de rendre nos explorations entomologiques plus suivies et plus fécondes en résultats.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Weinmann, de Borre, Jacobs et plusieurs autres membres, la séance est levée à 9 1/2 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

..

SÉRIE III. — N° 42.

Assemblée mensuelle du 2 février 1884

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergé, De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, Determe, Devaux, Du Pré, Fologne, Fondu, Fromont, Jacobs, Kerremans, Lameere, Remy, Vanden Branden, Vander-velde, Van Rossen et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. H. Donckier de Donceel et Weinmann font excuser leur absence.

La séance est ouverte à huit heures, dans le local de la Commission de la Carte géologique, rue de Ruysbroeck, 44.

Le Président fait connaître que M. le Directeur du Musée lui a donné l'espoir que la Société pourra reprendre ses séances dans son ancien local, moyennant la substitution de l'éclairage à l'huile à l'éclairage au gaz.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 janvier est approuvé.

Le Président annonce l'admission par le Conseil d'administration d'un nouveau membre effectif, M. l'abbé Alph. Renard, conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle et président de la Société Belge de Microscopie, présenté par MM. Preudhomme de Borre et Dubois. Également celle, comme membres associés, de M. Léon Candèze fils, étudiant à Glain, près Liège, présenté par MM. le Dr Candèze et Preudhomme de Borre, et de M. Maurice van der Hart, étudiant, à Bruxelles, présenté par MM. Lameere et Preudhomme de Borre.

Le Secrétaire dépose, pour la bibliothèque de la Société, un exemplaire du Tome XXVII (1884) de nos Annales, qui vient de paraître.

Correspondance.

MM. De Le Court et Vernieuwe remercient pour leur admission en qualité de membres effectifs, et M. Kraus pour son admission comme associé.

La Société Royale Linnéenne adresse un programme de conférences.

M. P. Millière, membre honoraire, nous remercie pour l'envoi du Tome XXVII des Annales.

La Direction du Musée Royal d'Histoire naturelle, le Bibliothécaire de l'Université libre de Bruxelles et la Rédaction de la Revue *Science* nous accusent réception de nos Annales et Comptes-rendus.

L'Académie Impériale des Sciences de Vienne nous adresse ses publications.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre écrite à M. Millière par M. le Dr Coulon, de Monaco, un de nos membres effectifs, qui a récemment donné sa démission. Il résulte de cette lettre que cette démission a eu pour motif que M. Coulon ne recevait que très irrégulièrement les Comptes-rendus et n'a jamais reçu le Tome XXVI des Annales. Tout lui avait cependant été envoyé. Dans le courant de l'été dernier, une réclamation qu'il nous adressa fut suivie de l'envoi de tous les numéros qu'il avait déclaré lui manquer; cet envoi n'est pas non plus arrivé. Un troisième aurait peut-être eu le même sort.

On voit, continue M. de Borre, que cette négligence de la poste à faire parvenir à leur destination nos publications, négligence sur laquelle j'ai déjà appelé l'attention de la Société, est de nature à nous causer le plus grand préjudice. Bien d'autres membres étrangers m'ont réclamé des Comptes-rendus et des volumes, sans qu'il m'ait été possible de les satisfaire. Et quant aux réclamations à l'administration des postes, qu'elles émanassent de nous ou des destinataires, elles n'ont jamais eu de résultat. Cette année, j'ai eu recours, pour l'envoi du volume aux membres un peu éloignés, au procédé de la recommandation, préconisé par notre collègue M. Weinmann. Mais il est onéreux pour la Société et je me demande s'il serait aussi toujours bien utile. Les destinataires ne s'avisent souvent de réclamer le volume que bien des mois après l'époque de la publication, alors que le délai pour les réclamations est périmé.

M. Kerremans saisit cette occasion pour signaler aussi la brutalité avec laquelle sont traités à la poste les petits colis, par exemple les boîtes contenant des insectes. Un envoi de coléoptères précieux que lui faisait de Saint-Petersbourg M. Dokhtouroff, lui est arrivé absolument en marmelade, par l'écrasement d'une boîte très bien emballée pourtant.

M. de Borre dit qu'une double boîte ne préserve pas même les insectes expédiés à l'étranger; il en a fait la triste expérience dans ses relations avec l'Écosse.

M. de Selys-Longchamps s'abstient absolument de faire voyager des insectes par la poste.

M. Kerremans demande que tous ceux d'entre nous qui ont à souffrir dans leurs relations postales ne manquent pas de faire ici acter leurs plaintes et que les numéros du Compte-rendu soient, dans ce cas, adressés à M. le Ministre des Travaux publics.

L'incident étant clos, le Secrétaire achève la lecture de la correspondance.

M. Darius Schmill (Société générale, à Constantinople) offre, aux membres de la Société Entomologique Belge, des *Procerus scabrosus* d'une conservation et d'une beauté remarquables. Prix modérés. Envoi franco.

M. de Borre signale la publication, par la librairie Mayolez, rue de l'Impératrice, 13, à Bruxelles, d'une deuxième édition, format in-18, des *Tables dichotomiques pour la détermination des coléoptères de Belgique, d'après Redtenbacher*. Un exemplaire de cette édition a été offert pour la bibliothèque de la Société.

Divers prospectus ont été reçus.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu les conclusions des rapports de MM. Sharp et Preudhomme de Borre, l'assemblée vote l'impression, dans les Annales, du travail de M. le Dr Dugès : *Métamorphoses du Tropisternus lateralis Fabr.*, travail accompagné d'une planche.

M. de Selys-Longchamps donne lecture des rapports de MM. Plateau et Mac Leod sur le travail de M. Preudhomme de Borre : *Tentamen Catalogi Glomeridarum hucusque descriptarum*. L'impression aux Annales en est également votée.

M. L. Fairmaire, membre honoraire, nous adresse les deux travaux suivants :

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES

RECUEILLIS PAR LE BARON BONNAIRE EN ALGÉRIE

par M. L. Fairmaire.

Choleva sulcipennis. — Long., 3 mill.

Oblongo-ovata, convexa, postice paulo attenuata, brunnea, modice nitida, prothorace lateribus et margine postico elytrisque basi picescentibus, subtus piceo-castanea, pedibus rufo-testaceis,

antennis brunneis, basi testaceis; capite levi, planiusculo, antennis gracilibus, apicem versus leviter crassioribus, medium elytrorum attingentibus, articulis elongatis, primis aequalibus, ultimis paulo brevioribus, 8^a minore, ultimo apice acuto, precedente longiore; prothorace transverso, basi elytris haud latiore, sed ante medium ampliato, lateribus rotundatis, antice paulo angustiore, angulis posticis obtusis sed evidentibus, dorso densissime sat tenuiter punctato, postice utrinque foveola minuta impresso; scutello triangulari, acuto, dense strigoso-punctato, plaga basali media parva levi; elytris ad humeros angulatim rotundatis, medio leviter ampliatis, postea attenuatis, sat fortiter declivibus, apice obtusis, striatis, striis 2 primis, suturali praesertim, profundis, ceteris tenuibus, intervallis dense transversim strigosis; pedibus sat gracilibus, coxis et tarsis simplicibus. ♀. — Philippeville.

Distincte des espèces voisines par sa forme un peu plus courte et ses élytres à stries bien marquées, surtout les deux premières, qui sont profondes.

Eretmotes approximans. — Long., vix 2 mill.

Cette nouvelle espèce est extrêmement voisine de l'*E. sociator*; elle est un peu plus petite, plus étroite, les angles ou lobes antérieurs du corselet sont plus tronqués, ce qui les rend plus angulés en dehors, la ponctuation du corselet est un peu plus fine, et les fossettes latérales de la base forment une strie oblongue, élargie à la base, au lieu d'être transversales; les élytres sont aussi plus finement ponctuées; le mésosternum présente de chaque côté une assez grande fossette avec deux stries se dirigeant obliquement en dehors; le prosternum est finement rugueux, presque tronqué à la base, assez fortement déprimé au milieu en travers et séparé de la mentonnière par une suture droite. — Pic des Cèdres, avec des fourmis.

Saprinus Bonnairii. — Long., 1 1/4 mill.

Subquadratus, convexus, nitidissimus, castaneo-rufescens, capite elytrisque fuscatis, his medio plaga magna lutea transversa, communi, suturam versus paulo angustiore signatis, pedibus antennisque testaceis; capite subtiliter densissime punctato, levi, prothorace valde transverso, longitudine duplo latiore, antice leviter angustato, lateribus antice tantum arcuatis, dorso subtilissime punctulato; elytris post humeros ampliatis, subquadratis, subtilissime punctulatis, striis subtilibus, 1^a post medium abbreviata, cum suturali basi arcuatim conjuncta, ceteris medio abbreviatis, elytrorum apice obsolete striatulo; pygidio perpendiculari, vix perspicue punctulato; tibiis anticis paulatim latioribus, extus inermibus. — Batna.

Cet Histeride est fort remarquable par la grande tache fauve qui traverse les élytres; la ligne qui borde le front est largement interrompue au milieu, la ponctuation est très fine, ainsi que les stries. Ressemble au *peuceux*, mais beaucoup plus petit, avec le front uni en avant et une bande jaunâtre distincte sur les élytres.

Limnius interruptus. — Long., vix 2 mill.

Ovato-oblongus, medio parallelus, antice et postice æqualiter angustatus, modice convexus, fusco teneus, antennis tarsisque rufopiceis; prothorace transverso, antice angustato, lateribus a medio tantum arcuatis, margine postico utrinque late sinuato, medio ad scutellum breviter emarginato, dorso laud punctato, utrinque stria arcuata, antice obsolete sinuata signato; scutello subrotundato; elytris punctato-substriatis, striis basi fortius punctatis, intervallis planis, subtilissime alutaceis, tribus externis subtilissime carinatis et indumento griseo tectis, 1^o medio interrupto. — Pic des Cèdres.

Ressemble beaucoup au *L. Perezii* Sharp; en diffère par la taille un peu plus grande, la forme plus allongée, plus parallèle, plus acuminée postérieurement, par les stries du corselet moins droites, plus rapprochées du bord externe, par les élytres à stries ponctuées bien plus marquées avec les intervalles unis, ne présentant pas une ligne médiane ponctuée. Diffère des *L. fuscipes* et *villosopunctatus* Reiche par le corselet non ponctué et du dernier, en outre, par les élytres non villeuses.

Rhizotrogus densaticollis. — Long., 15 à 16 mill.

Oblongus, subparallelus, convexus, fulvo-rufescens, nitidus, prothorace utrinque plus minusve fusco-maculatus; capite interdum fusco-vage tincto, sat planato, antice fere truncato, utrinque rotundato, margine leviter reflexo, dense punctato, sutura clypeali evidente, inter oculos leviter transversim elevato; prothorace elytris haud angustiore, longitudine duplo latiore, antice fere a basi arcuatim angustato, undique anguste marginato, lateribus obsolete crenulatis, ciliatis, dorso sat subtiliter, sat dense punctato, medio postice spatio minuto lævi, margine postico utrinque late leviter sinuato, angulis obtusis; scutello triangulari, lateribus vix arcuatis, utrinque laxè punctato; elytris post medium levissime ampliatis, apice fere truncatis, extus valde rotundatis, sutura (antice angustata) et utrinque costulis 3 (apice oblitteratis) parum elevatis, parum dense punctatis, intervallis densius, parte basali multo minus punctata, callo humerali fere lævi et extus oblonge impresso, margine externo ciliato; pygidio sat dense punctato; pectore longe griseo-fulvo-villoso, segmentis abdominalibus apice transversim aspero-punctatis, punctis setiferis; tibiis antice obtu-

sissime biangulatis et dense sat acuto terminatis, tarsis elongatis, unguibus vix arcuatis, basi dente minuto armatis. — Daya.

Ressemble au *punicus* pour la forme et pour la coloration, en diffère par le corselet à ponctuation fine et serrée au lieu d'une ponctuation très grosse et très peu serrée; l'écusson est moins court, plus pointu, les élytres sont un peu plus ponctuées, et le pygidium est simplement ponctué et non couvert d'aspérités.

J'ajoute ici les descriptions de trois espèces nouvelles du même genre et provenant du nord de l'Afrique.

R. tripolitanus. — Long., 17 mill.

Subovato-oblongus, elytris medio leviter ampliatis, fulvus, parum nitidus, prothorace rufescente, lateribus fulvo, elytris dorso paulo rufescentibus, capite rufo-infusato, corpore subtus paulo obscuriore, pectore pallido-fulvo-villoso, medio densius; capite subquadrato, angulis valde rotundatis, margine antico vix reflexo, medio obsoletissime sinuato, dense rugoso-punctato, sutura clypeali utrinque ad oculos ascendente, fronte medio lineola subtiliter elevata signata; prothorace transverso, elytris haud angustiore, fere a basi antice angustato, lateribus arcuatis, haud serrulatis, margine postico utrinque late sinuato, angulis obtusis, dorso meliocriter sat dense punctato, ad latera parcius et puncto fusco signato, antice paulo densius; scutello ogivali, medio laxo, ad latera dense punctato; elytris apice rotundato-truncatis, angulo suturali vix obtuso, sutura convexa et utrinque costulis 3 minus convexis (exteriore fere obsoleta) parce punctatis, intervallis magis fortiter ac densius punctatis, ad latera minus fortiter; pectore dense sat tenuiter punctato-ruguloso, opaco, abdomine nitido, segmentis medio punctato-asperis; tarsis elongatis, unguibus basi dente minuto acuto armatis, posticis articulo 1° secundo multo brevior. — Tripoli (Pirazzoli), un seul ♂.

Ressemble extrêmement au *barbarus*; coloration analogue, presque mate, mais de forme un peu plus large; le corselet est un peu plus étroit, plus fortement échancré en avant, l'écusson est plus large, les élytres sont un peu plus larges et plus courtes avec les côtes plus marquées et plus lisses; le pygidium est ponctué et un peu rugueux.

R. tuniseus. — Long., 13 à 14 mill.

Oblongus, elytris post medium vix ampliatis, rufescenti-testaceus, vix nitidus, prothorace elytrisque ad latera paulo dilutioribus, aut fulvo-testaceus, dorso leviter infusato, capite obscure rufescente, subtus nitidior, abdomine toto, pedibus antennisque pallidius fulvis; capite rugoso-punctato, sutura clypeali obsoleta,

antice vix reflexo, fere recto, angulis valde rotundatis; prothorace elytris paulo angustiore, antice a medio angustato, lateribus obsolete crenulatis, margine postico utrinque late sinuato, angulis acute rectis, margine antico fere recto, angulis obtusissimis, dorso sat fortiter sat dense punctato; scutello triangulari, punctato; elytris apice fere truncatis, sed extus late rotundatis, sutura et utrinque costulis 3 modice elevatis, fere levibus, intervallis sat dense punctatis, apice obsoletius, alutaceis; pygidio lateribus arcuato, alutaceo, subtiliter parce punctulato, pectore dense tenuiter punctato, longe fulvo-villoso, tarsis sat elongatis, posterioribus articulo 1^o secundo multo brevior, unguibus ante medium dente minuto brevi, erecto, armatis. — Tunis (Pirazzoli).

Voisin du *sordescens* Fairm., de Mogador; même forme et même coloration, mais le corselet est plus étroit, les côtés sont légèrement sinués vers la base et les angles postérieurs sont pointus; le corselet est fortement ponctué, quelquefois avec un espace lisse au milieu et le pygidium est plus finement ponctué.

R. dilutus. — Long., 13 mill.

Oblongus, elytris medio ampliatis, fulvo-rufescens, modice nitidus, prothoracis lateribus dilutioribus, capite paulo obscurato, pectore fulvo-lanoso, abdomine vix nitidior, pedibus antennisque paulo dilutioribus; capite subquadrato, angulis anticis valde rotundatis, margine antico parum reflexo, medio obsolete sinuato, disco sat tenuiter ruguloso-punctato, summo paulo inæquali, sutura clypeali obsoleta; prothorace elytris vix angustiore, longitudine duplo latiore, antice a medio angustato, margine postico medio late obtusato, utrinque vix sinuato, angulis posticis obtuse rectis, margine antico recto, angulis valde obtusatis, dorso sat dense punctato, antice magis, ad latera minus, postice medio spatio vix levior, lateribus haud crenulatis; scutello ogivali, lævi, marginibus anguste sat dense punctulatis; elytris medio sensim ampliatis, apice subtruncatis, extus rotundatis, sutura (basi angustata) et utrinque costulis 3 vel 4 paulo elevatis, apice oblitteratis, vix punctatis, intervallis sat fortiter punctatis, 1^o latiore et magis punctato, callo humerali levior et extus paulo impresso; pygidio latiore, obsolete asperulo-punctato, basi utrinque biimpresso; pectore densissime subtiliter punctato; tarsis elongatis, posterioribus articulo 1^o secundo multo brevior, unguibus basi dense minutissimo armatis. — Tunis.

Ressemble au *lateritius*, mais plus petit, plus court, plus brillant, avec les élytres moins ruguleuses et un peu moins ponctuées; en outre, les tarses, surtout les postérieurs, sont sensiblement plus longs et plus grêles.

Lampra Bonnairii. — Long., 7 mill.

Viridi-metallica, nitida, elytris postice vage, suturam versus cyaneo-tinctis et cyaneo maculosis; sat fortiter punctata, capite inter oculos plagula lævi signato et subtus transversim impresso, antennis nigris, fortiter serratis; prothorace transverso, elytris angustiore, antice vix angustiore, lateribus arcuatis, fortiter dense punctata, fere rugoso, postice utrinque fere transversim oblique fortiter impresso, margine postico medio rotundato et intus sulcato; scutello fere truncato, fere lævi; elytris apice breviter tri-spinosulis, sat fortiter striatis, striis haud punctatis, intervallis fortiter punctatis, punctis basi et ad latera majoribus, densis, confusis, unde intervallis rugatis. — Batna.

Ressemble un peu au *L. festiva*, mais n'a pas de taches noires et les rares taches bleues des élytres sont peu distinctes; le corselet est bien plus court, avec des impressions presque transversales, profondes et les côtés plus arrondis, les élytres sont un peu moins rugueuses et terminées par trois petites épines.

Malthinus impressicollis. — Long., 4 mill.

M. glabello affinis, similiter coloratus, elytris ante apicem obscurioribus, macula sulphurea apicali læviore et nitidiore, lineis punctatis fere striatis et sat fortiter punctatis, prothorace fortiter punctato, impressione transversa antica medio haud interrupta, disco magis nigro, longitudinaliter parum profunde canaliculato, canaliculo basi luteo, capite summo et arcuatim usque ad oculos nigro, medio rufescente, antice flave, antennis brunneis, articulis 3 primis subtus testaceis, articulo 2^o tertio multo longiore; femoribus 4 posticis apice sat longe fuscis, anterioribus supra linea fusca signatis; subtus flavus, pectore medio nigro. — Philippeville.

Voisin du *M. inflatus* Mars., d'Algérie, mais un peu plus grand, à tête noire jusqu'aux yeux, avec le devant jaune et une teinte rousse entre les yeux, plus ou moins large, les antennes brunes, les deux premiers articles roux au-dessous, le 2^o un peu plus long que le 3^o, le corselet noir et fortement ponctué au milieu avec une ligne longitudinale enfoncée plus ou moins roussâtre, les bords antérieur et postérieur étroitement relevés, d'un jaune pâle.

M. pallidipes. — Long., 3 mill.

Pallide fulvus, capite basi sat anguste nigro, inter oculos rufescente, antennis leviter fumatis, articulis 3 primis supra obscurolineatis, prothorace medio nigro, linea fulva diviso, elytris ad suturam et postice leviter infuscatis, macula apicali sulphurea; capite antice dilatato, planato; antennis gracilibus, medium elytrorum superantibus, articulo 1^o leviter arcuato, 2^o tertio paulo longiore, 3^o quarto valde brevior; prothorace sat lato, antice

angustato, lateribus ante medium sat angulatis, modice punctato, sulco longitudinali postice profundiore et latiore, antice obsolescente, angulis posticis sat obtusis; scutello basi breviter nigro, apice obtuse truncato; elytris sat fortiter punctato-lineatis, basi substriatis, punctis apice confusis. — Philippeville.

Ressemble un peu au *M. tunisicus*, mais d'une coloration bien plus claire, avec les antennes bien plus longues, le corselet plus rétréci en avant et en arrière et les pattes d'un fauve clair; la gracilité des antennes et la coloration le rapprocheraient du *gallicolor*, mais les corselets sont fort différents.

M. maculiventris. — Long., 4 mill.

Ater, parum nitidus, elytris macula apicali sulphurea, capite antice et linea interoculari testaceo-rufa, antennis fuscis, articulis 2 primis subtus testaceis, prothorace ad angulos posticos breviter flavido, macula metapleurali et maculis utrinque 3 abdominalibus, coxis et femorum basi flavis; capite antice lato, postice attenuato, subtiliter dense punctulato, inter oculos obsolete biimpresso; antennis gracilibus, elytrorum apicem attingentibus, articulo 2^o tertio paulo brevioribus; prothorace longitudine parum latiore, postice vix attenuato, lateribus vix arcuatis, basi marginato, dorso dense alutaceo, aequali, antice lateribus et basi medio obsolete impresso; scutello obscure rufescente; elytris coriaceis, lineis longitudinaliter parum elevatis, sutura basi depressa; ♀. — Philippeville.

Cet insecte a la tête des *Malthinus*, mais les antennes sont insérées assez près des yeux, sans les toucher; son écusson est d'un roussâtre très obscur, presque brun; cette particularité et la coloration du corselet le rendent facile à reconnaître.

Malthodes crucicollis. — Long., 4 mill.

Fuscus, nitidus, prothorace rufo, cruce fuscula signato, elytris fusco-griseis, macula apicali sulphurea, pectoris abdominisque lateribus flavis; antennis articulo 2^o tertio parum brevioribus; prothorace fere quadrato, lateribus subparallelis, antice utrinque dente brevi signatis, antice et postice transversim impresso; elytris subtiliter coriaceis, vix lineolatis; ♂ antennis corpore haud brevioribus, elytris abdomini fere aequalibus, abdomine flavo, medio nigro, apice stylo angulatum recurvo, apice dilatato, sinuato, et postice paulo producto, basi utrinque spinula elongata; ♀ antennis elytrorum apicem vix attingentibus, elytris abdomine dimidio brevioribus, hoc amplo segmentis lateribus lato, apice angustissime flavis. — Philippeville.

La forme du style semble rapprocher ce *Malthodes* du *dispar*.

Les impressions du corselet sont plus ou moins interrompues au

milieu et la branche longitudinale de la croix est plus ou moins large.

M. atroapterus. — Long., 4 mill.

Fusco-brunneus, sat nitidus, prothorace rufo, disco infuscato, mesosterno et metasterno macula laterali lutea ornatis, segmentis abdominalibus lateribus et apice luteo-marginatis; capite planiusculo, ore testaceo; antennis elytrorum apicem attingentibus, articulo 1^o elongato, clavato, 2^o tertio vix sensim brevior, subæquali, ceteris paulo longioribus; prothorace convexo, valde inæquali, quadrato, antice vix latiore, lateribus fere rectis, angulis anticis extus productis, dorso antice transversim fortiter impresso, antice et basi media tuberculis 2 minutis approximatis et ad latera medio utrinque tuberculo simili signato; elytris coriaceis, lineis vage elevatis signatis, sutura basi depressa, apice vage flavidulo. — Philippeville.

Ressemble un peu au *spretus*, mais distinct de ce dernier et des autres espèces à élytres unicolores par sa tête élargie en avant, comme celle des *Malthinus*, et par son corselet présentant une espèce de dent obtuse aux angles antérieurs, ainsi que de petits reliefs en avant, en arrière et sur les côtés; les élytres, bien qu'entièrement d'un brun foncé, ont une teinte jaunâtre très faible et très étroite à leur extrémité.

Dichillus modestus. — Long., vix 3 mill.

D. laviusculo facie et colore valde affinis, sed minor, antennis minus compactis, articulis intus paulo angulatis, penultimo latiore, ultimo angustiore, piceo, prothorace lateribus magis recto, antice utrinque evidentius obliquato et leviter impresso, scutello minutissimo, angustiore et elytris densius punctulatis, striis tenuioribus, extus et apice obsoletis distinctus. — Batna

D. distinguendus.

Præcedenti simillimus, paulo minus nitidus, densius punctatus, prothorace magis parallelo, scutello similiter minutissimo, elytris striolis 2 basi tantum perspicuis. — Philippeville.

Ces deux espèces se distinguent du *D. laviusculus* par leur taille sensiblement plus faible, leur écusson petit, en triangle plus étroit, et les élytres plus arrondies en arrière, à stries très faibles; chez la première, les antennes sont plus comprimées, plus obscures et paraissent, de côté, atténuées vers l'extrémité.

D. castanescens. — Long., 4 à 4 1/2 mill.

Oblongo-elongatus, convexus, rufo-castaneus, modice nitidus, elytris dorso plus minusve late brunneis; capite subtilissime punctulato, antice leviter impresso, antennis sat validis, fere cylindricis,

articulis, brevibus transversis, ultimo longiore et paulo angustiore; prothorace breviter ovato, postice attenuato, lateribus antice arcuatis, angulis anticis acute rectis, dorso subtilissime vix sensim punctulato, interdum linea media obsolete impressa, basi leviter foveolata; elytris ellipticis, apice acuminatis, fere levibus, lineis obsoletissime elevatis. — Batna, avec des fourmis. (*Cataglyphis viatica*.)

D. myrmecophilus. — Long., 3 à 3 1/2 mill.

Præcelsenti affinis, sed minor, elytris brunneis, capite paulo angustiore, antice medio convexo, haud impresso, prothorace basi medio evidentius foveolato, elytris subtiliter lineato-punctatis, lineis post medium obsoletis, utrinque linea laterali parum elevata, brevi, ab humero incipiente et costula submarginali sat acuta usque ad apicem prolongata. — Philippeville, également avec des fourmis.

Ces deux espèces se distinguent de leurs congénères par le corselet plus ovalaire, les élytres elliptiques, acuminées et presque lisses. Ce ne sont pas, du reste, les premières qu'on signale comme vivant avec les fourmis; le *Dichillus læviusculus*, d'Algérie, a été trouvé dans les mêmes conditions.

Helops (Catomus) testaceipes. — Long., 3 à 5 mill.

Oblongus, modice convexus, brunneo-æneus, nitidus, interdum rufescenti-æneus, glaber, pedibus palpisque fulvo-testaceis, antennis obscurius testaceis; capite dense punctato, antice transversim sat late depresso; antennis medium corporis haud attingentibus, apicem versus leviter crassioribus; prothorace transverso, medio elytris vix angustiore postice attenuato, lateribus fere rectis, postice cum angulis rotundatis, angulis anticis obtuse rotundatis, dorso dense punctato, punctis ovatis, basi anguste marginato; scutello lato, obtuso, lateribus parce punctato; elytris oblongis, sat acute striatis, striis levibus, intervallis planis, sat dense punctatis et transversim leviter plicatulis; subtus dense punctatus. — Batna.

Voisin de l'*H. pygmaeus*, var. *agonus* Muls.; en diffère par la tête largement impressionnée, les antennes plus courtes, moins greles à la base, le corselet moins arrondi sur les côtés et les élytres plus elliptiques, moins acuminées à l'extrémité, mais plus rétrécies à la base, avec les stries lisses, plus fines et les intervalles plus plans, plus ponctués.

Chez les ♂, le corselet est plus petit, un peu plus arrondi sur les côtés, et les élytres paraissent un peu plus convexes.

Nephodes gracilior. — Long., 7 mill.

N. rilligero affinis, similiter coloratus et villosus, sed minor,

angustus, magis convexus, prothorace angustiore, longitudine vix latiore, tenuius punctato, scutello magis triangulari, elytris postice haud ampliatis, post medium attenuatis, apice obtusis, striis vix impressis, tenuius punctatis, apice magis profundis, intervallis planis, alutaceis, antennis rufescentibus, articulis apice fuscis, articulis 3 ultimis magis infuscatis, minus latis. — Batna.

Bien distinct par sa forme convexe, ses élytres non élargies ni arrondies en arrière, à stries faiblement marquées, et par sa villosité moins cotonneuse; se distingue du *corsicus*, qui a aussi les stries des élytres très fines, par les antennes annelées, le corselet bien moins large, l'écusson triangulaire et les élytres plus acuminées.

Scythropus pineti. — Long., 5 à 6 1/2 mill.

Extrêmement voisin du *S. cedri*, en diffère par la taille un peu plus faible, la couleur foncière faiblement bleuâtre ou verdâtre avec les taches brunes moins marquées et moins nombreuses, le corselet un peu plus large, les élytres à stries plus marquées, un peu plus finement ponctuées, et par les yeux notablement moins convexes. — Batna, sur le Pin d'Alep.

S. oxycedri. — Long., 4 1/2 à 5 1/2 mill.

Oblongo-elongatus, sat fortiter convexus, indumento obscure cinereo supra dense vestitus, scutello pallido, elytris fusculo-sat vage maculosis, subtus dilutior, carneus aut griseus, antennis, tibiis tarsisque rufescentibus; capite subtiliter dense punctato; antennis valde gracilibus, scapo marginem anticum prothoracis superante; prothorace transversim subquadrato, lateribus plus minusve arcuatis, dense subtiliter punctato, linea media obsolete elevata; scutello apice rotundato; elytris ad humeros angulatim rotundatis, apice conjunctim obtusis, subtiliter punctato-substriatis, striis extus magis impressis, intervallis planis, punctatis, breviter fusco-pilosis; femoribus plus minusve infuscatis. — Batna, sur le Génévrier oxycède.

Bien distinct par sa forme parallèle, non élargie avant l'extrémité, qui est plus acuminée, par ses antennes plus grêles, par son corselet moins court et par sa coloration sombre, plus uniforme.

S. phœniceus.

La ♀ est plus grande, plus ovale, les élytres sont plus foncées, parfois roussâtres le long de la suture, de sorte que les taches pâles ressortent mieux; la tête est aussi parfois d'un roussâtre carné.

Magdalis russata. — Long., 3 1/2 mill.

Tota testaceo-rufa, rostro apice et antennarum clava fuscatis:

M. rufæ simillima et tantum corpore subtus concolore, prothorace grossius punctato, linea longitudinali evidentius elevata, angulis posticis acutis, elytris basi minus fortiter impressis, magis fortiter punctato-striatis et corpore subtus fortius punctato. — Batna.

Prasocuris oblongiuscula. — Long., 3 1/2 mill.

Oblongo-ovalis, medio subparallela, corulea, nitida, elytris late rufo-marginatis; capite dense punctato, antice valde arcuatim impresso; prothorace transverso, elytris parum angustiore, antice vix attenuato, lateribus rectis, antice tantum ad angulos rotundatis, angulis ipsis valde declivibus, sed apice acutis, dorso dense parum fortiter punctato, basi medio interdum striola brevissima signato; scutello obtuse ogivali, levi; elytris sat fortiter lineato-punctatis, stria suturali postice profundiore, intervallis planis, subtiliter alutaceis. — Batna.

Voisin de *P. aucta*, mais plus grand, plus oblong, plus parallèle, avec le corselet moins fortement ponctué et les élytres à lignes plus fortement ponctuées. Ressemble au *flavocincta*, mais plus allongé, plus bleu, plus convexe, avec l'écusson plus large, plus arrondi.

Baridius soricinus. — Long., 2 1/2 mill.

Oblongo-ovatus, crassus et convexus, subparallelus, niger, squamis albidis crassis dense vestitus, antennis pedibusque testaceo-rufis; capite globoso, denudato, punctulato, rostro crasso, valde arcuato, punctato, linea media elevata, apice rufo; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, antice tantum angustato, margine postico utrinque late sinuato, angulis posticis sat acutis; scutello nigro, depresso; elytris basi utrinque fere oblique truncatis, ad humeros parum rotundatis, dein subparallelis, apice obtuse rotundatis, sutura apice extremo paulo dehiscente, striis squamositatis causa haud perspicuis; pedibus sat brevibus, sat validis, tibiis apice paulo rufescentibus. — Biskra.

Voisin du *B. alboguttatus*, de Biskra, mais beaucoup plus petit, plus court, d'une teinte blanchâtre uniforme, à peine mêlée d'écailles d'un roussâtre extrêmement pâle, avec les antennes rousses, le corselet rétréci tout à fait en avant, ayant les côtés parallèles et l'écusson dénudé, brillant, tronqué avec une impression transversale.

Exochomus apicatus. — Long., 2 mill.

Brevissime ovatus, subhemisphaericus, niger, nitidus, pube tenui grisea dense vestitus, capite antice, prothoracis lateribus late et elytrorum macula apicali transversa flavo-rufis; capite prothoraceque haud distincte punctatis, hoc brevi, lateribus cum angulis posticis rotundatis, angulis anticis latis, obtusis; scutello triangu-

lari-oblongo, punctato; elytris ante medium dilatatis, dense subtiliter punctatis, callo humerali sat distincto, leviores, anguste marginatis; capite subtus, elytrorum margine reflexo abdominisque apice flavo-rufis, femoribus latis, punctatis. — Biskra.

Bien plus petit que le *xanthoderes*, avec les élytres moins largement arrondies en arrière, ayant leur plus grande largeur en avant, à ponctuation distincte; le corselet est plus arrondi aux angles postérieurs et la convexité du corps est moins forte.

E. nigropictus Fairm.

Ayant vu un certain nombre d'exemplaires recueillis à Batna par M. Bonnaire, j'ai pu constater que la coloration est variable, ainsi que la taille (de 3 à 4 mill.). Non seulement les taches noires sont plus ou moins confluentes, mais chez un individu, la tête et le corselet sont roux, avec une étroite bande noire à leur base, et l'*Euxochomus picturatus* n'est qu'une variété, de taille plus petite, avec la coloration noire encore moins développée.

Pharus bardus Muls., var. : **anchorago**. — Long., 2 mill.

Semiglobosus, niger, nitidus, pube tenui ac brevi, grisea, vestitus, elytris rufo-rubris, plaga basali fere triangulari per suturam prolongata et medio utrinque intus angulatim hamata, et per marginem externum usque ad apicem anguste producta, nigra; pedibus antennisque rufis; capite antice fere truncato, dense subtiliter punctulato; prothorace elytris valde angustiore, longitudine triplo latiore, antice paulo angustato, lateribus fere rectis, angulis anticis productis, posticis rotundatis, margine postico medio late obtuso, dorso subtiliter sat dense punctato, ad latera densius ac fortius; elytris hemisphæricis, basi truncatis, anguste marginatis, sat subtiliter dense punctatis; abdomine apice rufo. — Biskra.

DIAGNOSES DE COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE

par M. Léon Fairmaire.

ELLIPTICA n. g.

Voisin des Cicindèles, en diffère par les élytres elliptiques, à épaules effacées, à bords latéraux tranchants, à ailes inférieures nulles; le labre est grand; assez court, avec le bord antérieur à 5 dents petites, ne recouvrant pas l'extrémité des mandibules; les antennes sont assez grêles, le 3^e article un peu plus long que le 4^e; le corselet est plus ovalaire, les pattes sont longues et grêles, le 5^e segment abdominal est fortement échancré.

E. flavovestita. — Long., 13 mill.

Oblonga, supra fere planata, subtus convexa, subtus corulea,

nitida, pectore viridi et cupreo mixto, capite prothoraceque fuscis, cupreo et aeneo mixtis, subtiliter rugulosis, pilis ochreo-flavis alpressis dense vestitis, prothorace postice paulo coarctato, elytris ovato-ellipticis, basi truncatis, apice obtuse acuminatis, ochreo-flavis, opacis, tenuiter dense nigro-punctatis. — Makdischu.

Graphipterus discicollis. — Long., 14 1/2 mill.

Breviter ovatus, planiusculus, niger, nitidus, capite vittis 2 flavo-pubescentibus, prothorace pilis brevibus depressis ochreo-flavis, extus anguste albidis, dense vestito, medio late denudato, punctato, sulcato, postice angustato, elytris fere rotundis, apice oblique sinuato-truncatis, pilis fere squamiformibus, adpressis cinereo-fulvis dense vestitis, extus angustissime pallido-cinctis; antennis compressis, medio paulo latioribus, prothorace subcordato. — Makdischu.

G. castanopterus. — Long., 13 mill.

Ovatus, planiusculus, fuscus, modice nitidus, elytris pilis rufescenti-castaneis adpressis dense vestitis, margine externo anguste pallido, prothorace lateribus pilis pallidis vestito, capite dense fortiter punctato, medio elevato, prothorace capite latiore, cordato, dense punctato, angulis posticis obtuse rotundatis, elytris dense punctatis, tenuiter striatis, intervallis convexiusculis; subtus nitidissimus, abdomine striolato. — Makdischu.

Piezia stenotrachela. — Long., 14 à 15 mill.

Oblonga, postice ampliata, nigra, parum nitida, elytris basi et post medium, prope suturam, vittula postice utrinque macula angulata et vittulis marginalibus cinereo-villosis; capite prothoraceque rugoso-punctatis, hoc angusto, elytris apice sinuato-truncatis, punctatis, costulatis, intervallis primis foveopunctatis; antennis ♀ apicem versus latis. — Makdischu.

Polyhirma grisescens. — Long., 26 mill.

Elongata, nigra, parum nitida, capite medio, prothorace vitta media et elytris vitta brevi post-scutellari et apice late griseo-cinereo-villosis; capite medio subcarinato, prothorace cordato, medio late depresso, elytris postice ampliatis, aequaliter carinatis, intervallis cancellatis, ante apicem obsolete bisinuatis, valde obtusis. — Makdischu.

P. griseostriata. — Long., 27 mill.

Elongata, nigra, parum nitida, capite prothoraceque griseo-villosis, hoc cordato, medio longitudinaliter impresso; elytris postice parum ampliatis, apice parum obtusis, costis alternatim magis elevatis, intervallis grosse punctatis, costis punctulatis, 1^a, 3^a, 5^aque

basi griseo-cinereo vittatis, elytris apice griseo-cinereo-villosis et utrinque ante apicem macula subovata ornatis. — Makdischu.

Sternocera cariosicollis. — Long., 27 à 38 mill.

Oblonga, valde convexa, nitida, capite prothoraceque obscure aeneis, hoc dense ac grosse foveato, foveis griseo-pilosis, illo valde rugoso, medio antice carinato, clypeo emarginato, elytris castaneis, dense fortiter punctatis, intervallis transversim rugosulis et lineis vage elevatis apice emarginatis et extus unispinosis; subtus cum pedibus fusco-ænea, rugosula, tarsis pallide castaneis. — Makdischu.

S. foveopubens. — Long., 31 à 37 mill.

Oblonga, convexa, brunneo aut castaneo-ænescens, nitida, prothorace viridi-æneo aut cupreo, lateribus plaga oblonga flavidulotomentosa impressis, dorso dense ac grosse foveato, capite rugoso, antice carinato, elytris grosse ac dense punctatis, rugosulis, utrinque lineis 4 vage elevatis, apice sat obtuse trispinosis, utrinque basi impressionibus 2, impressione subhumerali oblonga et ante medium impressionibus 2 fere convexis flavido-tomentosis, depressis; subtus variolosa, abdominis lateribus late silaceo-pubescentibus. — Makdischu.

Steraspis villosiventris. — Long., 30 mill.

S. semigranosæ valde affinis, sed paulo major, similiter colorata et sculpturata, prothorace lateribus minus longè impresso, elytris lateribus latius impressis, postice costula submarginali nulla, subtus aureo-cupreola, prosterno medio et metasterno antice cœruleis, abdomine densius punctato, dense pubescente, segmentis apice chalybeis, 5^o angulatim emarginato. — Makdischu.

Chrysaspis brunneipennis. — Long., 34 mill.

Oblonga, sat lata, supra violascenti-brunnea, nitida, capite basi et medio anguste aureo, inter oculos cyaneo et concavo, prothorace fortiter punctato, lateribus impresso et aureo, medio fere lævi, aureo-striato, margine postico anguste aureo, elytris punctis sat grossis, cupreis, dense impressis, lineis longitudinalibus paulo elevatis, margine externo anguste viridi; subtus cum pedibus aurata, punctulata, lateribus subtiliter dense punctulatis, impressis, pubescentibus. — Makdischu.

STROBILODERA n. g.

Voisin des *Sphenoptera*; s'en distingue par le prosternum plus large et surtout par l'écusson très large, coupé droit au bord posté-

rieur : en outre, le thorax, la tête et l'abdomen présentent des plaques lisses analogues à celles des *Polybothris*, mais plus petites ; ses hanches postérieures ne sont pas sinuées en dehors et les tibias antérieurs sont assez fortement arqués. — Makdischu.

S. plagifera. — Long., 18 mill.

Oblonga, antice conico-truncata, elytris a basi postice angustatis, fusco-metallica, prothorace cupreo-tincto, dorso punctato, plagulis 2 atroceruleis, nitidis, lateribus rectis, anguste albido-marginatis, elytris fortiter crenato-striatis, extus tomentoso-marginatis, capite aureo-cupreo, plagulis 2 atroceruleis, subtus nitide aeneo-aurea, dense punctata, abdomine utrinque plagulis atroceruleis ornato. — Makdischu.

Agelia tricolor. — Long., 16 à 17 mill.

Elongata, cyanea, nitida, capite, prothoracis vitta marginali basi interrupta cupreis, metallicis, prosterni medio et metasterno (margine laterali excepto) aureo-cupreis, abdominis segmentis 3 ultimis rubris, violaceo-micantibus ; capite rugoso, prothorace trapeziformi, lateribus fere rectis, angulis posticis sat acutis, dorso grosse punctato ; elytris flavis, vittis 2 transversis, mediana ad suturam, antice dilatata, altera anteapicali nigris, apice cupreo-metallicis et denticulatis. — Makdischu.

A. obtusicollis. — Long., 33 mill.

Oblongo-elongata, sat convexa, cyanescenti-atra, parum nitida, elytris utrinque maculis 2 flavis magnis, 1^a fere basali, intus angustata, 2^a post mediam sita ; capite grosse rugoso, inter oculos sulcato ; prothorace lateribus antice obsolete sinuatis, postice paulo contractis, angulis obtusiusculis, dorso grosse punctato, rugosulo, ad latera carioso et utrinque foveato ; elytris dense punctatis, angulo suturali breviter spinoso ; subtus dense griseo-villosa. — Makdischu.

Anachalcos Revoili. — Long., 25 mill.

Ovato-subquadratus, obscure aeneo-cupreus, nitidus, subtus cum pedibus fusco-aenescens, minus nitidus, tibiis dense rufo-ciliatis ; capite et prothorace lateribus minus nitidis, sat dense punctulatis, hoc amplo, elytris haud angustiore, angulis anticis magnis, posticis rotundatis, elytris subtiliter punctulatis et striis subtilibus virescentibus signatis.

Distinct du *cupreus* par sa forme bien moins convexe, sa coloration brillante, sa ponctuation fine, peu serrée, et l'ampleur du corselet. — Makdischu.

Elaphinis atomosparsa. — Long., 9 à 11 mill.

Brevis, crassa, opaca, castanea, fusco-marmorata et punctis albidis numerosis sparsuta, subtus brunneo-castanea, nitida, lateri-

bus et pedibus albido-pilosis; capite dense punctato, apice emarginato, prothorace postice medio sinuato et utrinque arcuatim obliquato, elytris tenuiter striatis, intervallis alternatim paulo elevatis, sutura elevata, apice acuta. — Makdischu.

Lycus Bourgeoisii. — Long., 11 à 15 mill.

Ochreateus, capite, antennis, pedibus (femorum basi excepta), prothoracis vitta media, scutello et macula elytrorum apicali nigris; ♂ prothorace transversim subquadrato, antice medio producto, elytris breviter ovatis, basi angustis et supra angulatis, apice abrupte rotundatis, sat acute costatis; ♀ oblonga, postice leviter ampliata; *L. intermedio* (Bourgeois) valde affinis, sed elytris basi acute angulatis, ad scutellum vix nigricantibus, costis magis elevatis, colore ochraceo et macula apicali ad suturam vix emarginata distinctus. — Makdischu.

Homala integricollis. — Long., 12 à 13 mill.

H. polita valde affinis, sed prothorace antice angustato, minus brevi, margine postico anguste marginato, medio obsolete obtusato, basi haud arcuatim depresso, elytris ad suturam depressiusculis, basi ante humeros haud sinuatis, apice acute acuminatis distincta. — Makdischu.

H. agona. — Long., 15 mill.

H. polita sat affinis, sed major, minus nitida, prothorace postice latiore, angulis posticis valde rotundatis, margine postico medio vix impresso, elytris ad humeros magis rotundatis, ad suturam depressis et transversim irregulariter striolatis, apice acutis. — Guélidi.

Phrynocolus transversus. — Long., 13 mill.

Oblongo-ovatus, crassus, indumento terreo subvelutino et in elytris transversim elevato vestitus, prothorace lateribus angulatim rotundato, dorso quinquecarinato, carina media antice longe abbreviata; elytris ovatis, margine externo et costa discoidali elevatis undulatis et ante apicem abrupte truncatis, intervallis transversim plicatulis. — Guélidi.

Psammodes acuticosta. — Long., 13 à 15 mill.

Breviter ovatus, crassus, niger, nitidus, cinereo-squamosulus, prothorace sat parvo, fere globoso, fortiter dense punctato punctis squamiferis, angulis anticis sat productis, elytris parum convexis, denudato-vittatis, carina externa valida, ante apicem abbreviata, parte epipleurali nuda, subtus glabra, pedibus dense lutoso-indutis. — Makdischu.

SEPIDIOSTENUS n. g.

Sepidiis affine, sed corpore lineari, postice attenuato, fere glabro, capite obliquo, antice haud verticali, antennis ab oculis magis distantibus, gracilioribus, articulo ultimo haud minore, palpis maxillaribus articulo ultimo graciliore, prothorace lateribus haud angulato, scutello latissimo, brevi, elytris compressis, dorso acute dentatis, apice acuminatis et pedibus gracilibus valde distinctum.

S. erinaceus. — Long., 19 mill.

Elongatus, angustus, fuscus, indumento terreo, lateribus et subtus pallide luto-dense vestitus; capite planato, antennis basin prothoracis haud attingentibus, prothorace antice paulatim elevato-bilobo, lobis oblique truncatis, elytris utrinque undulato-bicostatis et acute dentatis, postice attenuatis, apice ipso paulo divaricatis. — Makdischu.

Sepidium longehirtum. — Long., 14 mill.

Elongatum, convexum, indumento cinereo dense vestitum, pilis fuscis longis sat dense hirsutum, elytris utrinque fasciculis brevibus fuscis densis subseriatis, prothorace antice lobis 2 divergentibus, obtusis, medio fusco-vittato et densius breviter piloso, angulis lateralibus sat parvis, conicis, elytris convexis, ante apicem utrinque caudatis, antennis apice fuscis, articulo ultimo minore. — Makdischu.

S. aper. — Long., 16 mill.

Precedenti affinis sed minus angustus et indumento fulvo-terreo vestitus, parce et minus longe fusco-villoso, antennarum articulo ultimo nigro, parum separato, prothorace antice lobo fere parallelo, apice parum profunde bilobato, linea media fusco-velutina elevata, angulis obtuse conicis, elytris convexis, seriato foveolatis, sutura et costula discoidali paulo elevatis, costa externa paulo undulata, intervallo 1^o parce fusco-velutino, maculoso. — Guéliidi.

Pycnocerus cœruleatus. — Long., 30 mill.

P. Passeiini similis, prothorace magis amplo, elytris paulo latiore; elytris paulo brevioribus, striis minus fortiter crenatis, plaga interoculari minus profunde limitata, magis inaequali, prosterno apice arcuato, metasterno lateribus fortius plicatulo et medio fortius bituberculato, metapleuris parce subtiliter punctatis et striolatis. — Zanzibar.

Micrantereus seriepunctatus. — Long., 14 mill.

Ovatus, niger, sat nitidus, capite arcuatim impresso, prothorace transverso, lateribus rotundato, angulis anticis acutiusculis, ely-

tris punctis grossis parum regulariter seriatis, intervallis subtiliter punctulatis, sutura et utrinque costulis 2 parum elevatis, abdomine subtiliter strigosulo; ♂ tibiis omnibus arcuatis, 2 anterioribus intus angulatis, intermediis basi compresso-dilatatis. — Makdischu.

M. externecostatus. — Long., 12 à 13 mill.

Ovatus, niger, nitidus, prothorace transverso, lateribus rotundato, elytris parce punctatis, utrinque costulis 2 vix elevatis, margine externo acute carinato, paulo reflexo, spatio epipleurali vix punctulato; ♂ oblongo-ovatus, tibiis 2 anticis extus arcuatis, intus pilosis et obtuse angulatis, tarsis dilatatis, intermediis intus sinuato-concavis, extus arcuatim angulatis, posticis elongatis, arcuatis. — Makdischu.

M. marginipennis. — Long., 9 mill.

Ovatus, niger, nitidus, capite antice parum impresso, prothorace brevi, antice valde angustato, scutello brevior, elytris laxè punctulatis, ad latera densius punctatis, margine interno acute carinato, reflexo, spatio epipleurali vix punctulato, basi concavo, tibiis omnibus rectis, simplicibus ♀. — Makdischu.

M. quadricristatus. — Long., 12 mill.

♂ Oblongus, valde compressus, parum convexus, niger, sat nitidus, capite antice arcuatim impresso, prothorace brevi, lateribus angulatim rotundato, elytris fortiter sat dense punctatis, sutura parum elevata, utrinque costa discoidali et carina marginali acutis, et inter has linea obsolete elevata; tibiis anticis rectis, intus impressis et pilosis, femoribus intermediis subtus apice dente magno armatis, tibiis basi abrupte angustatis, posticis arcuatis, intus crenulatis; ovata, minus fortiter punctata, pedibus simplicibus. — Makdischu.

Systates angulithorax. — Long., 6 à 8 mill.

Oblongus, valde convexus, lateribus compressus, niger, nitidus, capite albido-villoso, prothorace (lateribus postice angulato) vitta media elytrisque plaga suturali, plus minusve lata, et vittulis lateralibus saepe interruptis albido-villosis, elytris basi valde convexis, punctato-lineatis, punctis postice obsoletis, femoribus anticis valde clavatis; antennis gracilibus, scapo apice paulo crassiore. — Makdischu.

S. fusco-æneus. — Long., 10 mill.

Fusco-æneus, nitidus, glaber, antennis minus gracilibus, scapo leviter undulato, capite rostroque punctato, hoc pluricostato, prothorace angusto, rugoso-punctato, elytris ovatis, grosse punctato, lineatis, substriatis, intervallis convexiusculis, pedibus punctatis, femoribus medio nitidis. — Makdischu.

Closteromerus argyrothorax. — Long., 11 mill.

Niger, prothorace lateribus late argenteo-sericeo, densissime punctato, elytris metallico-viridibus, dense sat fortiter punctato-rugosis, apice truncatis, pectore brunneo, dense subtiliter albido-sericante, abdomine rufo, pedibus rufis, femoribus 2 posticis apice late cum tibiis tarsisque fuscis, antennis fuscis, articulis 5 ultimis dilatatis. — Makdischu.

XANTHOSPILA n. g. (*Callichromides*).

Femora postica paulatim crassiora, elytra superantia, subtus haud sinuata; antennæ corpore breviores, basi haud dentatæ, articulo 3^o quarto quintoque conjunctis æquali; prothorax densissime punctatus, opacus, utrinque tuberculo parvo munitus; scutellum triangulare, acuminatum; elytra apice abrupte rotundata; prosternum arcuatum, apice truncatum; tibiæ posticæ compressæ, sat latæ; femora 4 antica subclavata.

X. flavoplagiata. — Long., 24 mill.

Elongata, sat convexa, capite prothoraceque rufo-castaneis, elytris cyanescenti-atris, utrinque maculis 3 magnis flavis, ornatis, antennis pedibusque rufo-testaceis, femoribus intermediis et pedibus posterioribus atrocæruleis, capite summo dense punctato, scutello velutino, abdomine castaneo, cum pectore griseo-sericeo. — Makdischu.

SPODOTÆNIA n. g.

Ce nouveau genre se rapproche des *Niphona*, mais la saillie mésosternale est oblique, large, à peine tronquée en avant, les élytres sont arrondies à l'extrémité, les fémurs sont plus épais, les antennes sont plus longues que le corps, le 1^{er} article est plus gros, la partie inférieure des yeux est plus grande et le corselet est cylindrique.

S. basicornis. — Long., 10 à 19 mill.

Oblonga, subparallela, convexa, elytris postice leviter attenuatis, fusca, umbrino-velutino dense sericans, capite basi dense albido-pubescente, antennis cinereo-pubescentibus, articulo 1^o fusco, subtus densissime barbato, prothorace lateribus albido-pubescente, elytris marmoratis, medio vitta lata paulo obliqua albicante et postice lineola angusta obliqua albicante signatis. — Makdischu.

Tetraglenes Pauli. — Long., 10 à 20 mill.

Filiformis, convexa, postice acuminata, fusca, opaca, antennis glabris, articulo 1^o crasso, elytris striato-punctatis; a *T. phantoma*

capite longiore angustiore, antennis haud villosis, articulo 1^o crassiore, elytris magis parallelis, apice simul acuminatis, sat fortiter punctato-substriatis distincta. — Zanzibar.

Le Secrétaire analyse une note en langue anglaise qui vient de nous être adressée par notre collègue M. Sharp. C'est une liste des espèces de *Lucanides* propres à la Nouvelle-Zélande, rectifiant les erreurs où, d'après lui, sont tombés plusieurs auteurs quant à la place de ces genres et espèces.

Appelée à décider si cette note sera publiée sous la forme d'une traduction française ou textuellement en anglais, l'Assemblée se prononce pour la publication en langue anglaise.

NOTES ON THE NOMENCLATURE OF NEW ZEALAND LUCANIDÆ.

I understand that in continuation of the valuable series of Catalogues of Coleoptera published by this Society, one of the members has undertaken the *Lucanidæ*, and in order to facilitate his task, I give herewith the results of some researches into the nomenclature of the New Zealand species of the family about which a good deal of confusion prevails. The importance of correct nomenclature is well shown by the history of a slight error occurring in the list of New Zealand Coleoptera published by professor Hutton, some years ago; in this list, an *Oxyomus*, that should have been the first species of the family *Scarabæidæ*, was, by a slight error, made to appear as the last of the *Lucanidæ*, and has since been treated by writers on New Zealand entomology as a real *Lucanid*, so that Wallace in his valuable work on the *Geographical Distribution of Animals* (vol. I, p. 457), has been misled into stating that in New Zealand "the *Lucanidæ* are represented by two peculiar genera *Dendroblox* and *Oxyomus*". It is scarcely necessary to add that *Oxyomus* is (or was; for it is, like nearly all generic names, a term of constantly shifting value) a very widely distributed genus outside of New Zealand, but does not really occur in New Zealand at all, and is moreover not a genus of *Lucanidæ* at all.

In the Manual of New Zealand Coleoptera recently issued by the Colonial Museum and Geological Survey Department of New Zealand, twelve species of *Lucanidæ* are enumerated, and five of these are assigned to the genus "*Dorcus* Mac Leay", three of these supposed species of *Dorcus* being described as new. I think it probable, however, that these species of *Dorcus* may belong to the genus *Lissotes*.

Broun appears to have been unacquainted with the work done in

the last twenty years on the genera of *Lucanidae*, and does not appear himself to have made any examination of the generic characters of the New Zealand *Lucanidae*, while the description he gives of the genus *Dorcus* is "epitomized from the descriptions of *Lucanus* and *Dorcus*" given by Lacordaire in the *Genera of Coleoptera*, and thus he did not recognize that the two species he assigns to *Dorcus* should be, — indeed have long since been, — assigned to the genus *Lissoles*, of which he also gives a description (p. 254). For similar reasons, it is probable that Broun's two supposed new species assigned by him to *Ceratognathus* may not belong to that genus, and in the following list I have assigned the *Dorci* to *Lissoles*, the *Ceratognathi* to *Mitophyllus*.

The list of New Zealand *Lucanidae* comprises altogether twenty species names, but it is probable these names do not represent as many species; five of them are seen due to the *Manual of New Zealand Coleoptera*, and as the author of that work had no knowledge of the existence of descriptions of six of the species in the list, it is probable that some of his names will prove to be synonyms. Broun has also re-established certain species as valid that had previously been recognized as synonyms, but I need not refer to in detail, as his error will be corrected by a reference to my list. It will be evident from the above remarks that New Zealand is accumulating a plentiful store of doubts and difficulties with which to occupy the time of her future naturalists.

GENUS DENDROBLAX.

Dendroblax Earlei White, Munich Cat. N. Zealand.

GENUS LISSOTES.

Dorcus abditus Broun (an n. sp.), Man. N. Z. N. Zealand.
Col., p. 673.

Dorcus Novæ Zealandiæ Hope, Mun. Cat. —
Syn. *Dorcus punctulatus* White, Broun.

Dorcus planus (an n. sp.), Man. N. Z. Col., —
p. 252.

Dorcus reticulatus West., Mun. Cat. —
Syn. *Dorcus squamidorsis* Wh., Br.

Dorcus Stewarti Broun (an n. sp.), Man. N. —
Z. Col., p. 673.

Lissoles capito Deyr., Trans. Ent. Soc. Lond., Ins. Chatham.
1873, p. 339, pl. V, fig. 4, 5, ♂♀.

Lissoles Desmaresti Deyr., Ann. Soc. Ent. N. Zealand.
Fr., 1881, p. 239.

Lissotes Helmsi Shp., Ent. Mo. Mag., XVIII, N. Zealand.
p. 49.

Lissotes Menalcas West., Mun. Cat. N. Holl. (N. Zelandia in
Mus. Brit. an recte?).

GENUS FIGULUS.

Figulus fissicollis Fairm., Mun. Cat. Tongatabu (an recte?).
Syn. *Figulus modestus* Parry, Mun. Cat. N. Zealand (an
recte? D. S.); Ins. Fiji.

GENUS CERATOGNATHUS.

Ceratognathus alboguttatus Bates, Mun. N. Zealand.
Cat. (Moreton Bay ex errore).

Ceratognathus dispar Shp., Trans. Ent. Soc. —
Lond., 1882, p. 82.

Ceratognathus helotoides Thoms., Mun. Cat. —

Ceratognathus sexpustulatus Bates, Mun. —
Cat.

GENUS MITOPHYLLUS.

Ceratognathus foveolatus Broun, Man. N. Zealand.
Z. Col., p. 253, an. huj. gen.?, an n. sp.?

Mitophyllus irroratus Parry, Mun. Cat. —

Mitophyllus marmoratus Wat., Ent. Mo. —
Mag., XI, p. 8.

Mitophyllus parryanus West., Mun. Cat. —

Ceratognathus zealandicus Broun, Man. N. —
Z. Col., p. 253, an. huj. gen.?, an n. sp.?

M. Lameere demande la parole et lit la note suivante :

A la suite de la communication que j'ai faite à l'une de nos dernières séances sur l'identité de l'*Erimispa Barleri* Chap. et du *Pytheus pulcherrimus* Pasc. (Ann. Soc. Ent. Belg., 1883, Bull., p. clxi), plusieurs entomologistes, et entre autres notre éminent collègue M. le Dr Kraatz, en présence des différences que montrent les figures des deux insectes dans l'Atlas du Genera des Coléoptères, ont cru que je pouvais m'être trompé, et qu'en réalité les genres étaient différents, quoique offrant un remarquable exemple de mimétisme. J'ai voulu éclaircir la question, et j'ai demandé à M. Pascoe la communication de l'exemplaire type qui lui a servi à décrire le *Pytheus pulcherrimus*. Il a eu l'extrême obligeance de me le confier, ce dont je le remercie très sincèrement.

Ayant à la fois sous les yeux les types du *Pytheus pulcherrimus*

et de l'*Erionispa Badeni*, il est aisé de constater que ces deux insectes sont bien identiques; la taille du *Pytheus* de M. Pascoe est seulement un peu moindre que celle de l'*Erionispa*, mais c'est là une particularité dont l'on n'a point à tenir compte lorsqu'il s'agit de Coléoptères subpentamères.

M. Pascoe avait déjà depuis longtemps entrevu cette rectification en comparant son *Pytheus* à la description si exacte que Chapuis avait donnée du genre *Erionispa*, mais ne possédant pas ce dernier type, la figure défectueuse de l'insecte dans l'Atlas du Genera l'avait encore laissé à cet égard dans l'incertitude.

Pour dissiper tous les doutes, je crois qu'il ne sera pas inopportun de relever les principales incorrections de dessin que présentent les deux figures, malgré le soin apporté à l'impérissable ouvrage de Lacordaire et Chapuis.

La figure 4 de la planche 91 nous montre un *Pytheus pulcherrimus* à angles antérieurs du corselet aigus, ce qui n'est point, ces angles étant parfaitement arrondis; l'extrémité des élytres, au lieu de porter un fascicule de poils, comme on peut le voir dans la fig. 4^b, qui est bonne, a été prolongée en une énorme épine par l'imagination de l'artiste qui a exécuté la planche. Enfin, le dernier article des antennes est trop aminci et trop allongé, mais il est encore plus inexact dans la figure 1 de la planche 129 (*Erionispa Badeni*), d'après laquelle il ne serait pas aigu du tout à son sommet. Ici, le fascicule de poils de l'extrémité des élytres a été omis, mais, en revanche, les fémurs intermédiaires sont munis en dessous d'une dent très prononcée: c'est un effet d'optique produit par le renflement des cuisses qui aura trompé le dessinateur. Restent les tarses postérieurs, dont le premier article devrait être deux fois aussi long, comme dans la figure 4 de la planche 91, où ces tarses sont fidèlement représentés. Certes, pour quiconque se sera contenté d'examiner les deux figures du Genera, il aura semblé paradoxal de réunir sous un même nom deux insectes en apparence si différents: mais déjà la mise en parallèle des descriptions génériques de Lacordaire et de Chapuis (Gen. des Col., VIII, p. 529; XI, p. 301) et des diagnoses du *Pytheus pulcherrimus* par M. Pascoe (Trans. ent. Soc., sér. 2, V, p. 28), et de l'*Erionispa Badeni* par Chapuis (Gen. des Col., XI, p. 302) faisait pencher fortement la balance en faveur de la réunion des deux espèces: aujourd'hui, la comparaison des types doit bannir toute hésitation à adopter cette manière de voir.

Je ne puis même, tant ils sont semblables, trouver une différence sexuelle entre les deux types: Lacordaire croyait qu'à cause de leur affinité avec les *Brachytria* Newm., les *Pytheus* ♂ devaient, comme dans ce dernier genre, avoir les antennes à peu près de la longueur du corps et les deux premiers articles des tarses dilatés.

Il rapportait par conséquent au sexe ♀ les exemplaires qu'il avait vus. Or, en examinant attentivement un insecte de la collection Van Volxem, qui répond parfaitement à la description du *Pythæus pulcherrimus* Pasc., je constate qu'il présente quelques caractères qui le différencient légèrement des individus typiques : cet exemplaire doit être un mâle, les deux autres sont des femelles. Les différences portent sur les pattes et sur les antennes : les premières sont plus robustes chez le *Pythæus* de Van Volxem, leurs fémurs et leurs tibias étant moins allongés et moins grêles. Quant aux antennes, outre qu'elles sont un peu plus longues que chez les types, elles offrent une particularité remarquable. Leur avant-dernier article présente au sommet et extérieurement une petite gibbosité sphéroïdale aplatie, brillante et ponctuée ; deux appendices semblables se voient, l'un à la moitié, l'autre au quart apical de la tranche externe du dernier article, qui semble à première vue être appendiculé. L'on pourrait croire d'abord à une anomalie individuelle, mais un *Pythæus* de ma collection, que M. Pascoe a bien voulu déterminer, et qui est le *P. latebrosus* Newm., présente exactement les mêmes particularités.

Cette espèce, brièvement caractérisée par Newman (Entom., 1842, p. 95), diffère du *P. pulcherrimus* par le dessous du corps et les pattes, qui sont noirs ; le prothorax est moins arrondi latéralement ; ses bandes noires longitudinales peuvent envahir tout le pronotum, et celles qui s'étendent de la base des élytres à leur extrémité, au lieu d'être d'un beau vert, sont noires et peuvent empiéter plus ou moins sur le disque.

Le *P. jugosus* Newm. (Entom., 1842, p. 14) m'est inconnu, mais je suis persuadé que le ♂ a les antennes conformées comme celles de ses congénères, et que c'est ce caractère qui différencie principalement les sexes dans le genre *Pythæus*.

Sous ce rapport, ces insectes s'éloignent des *Brachytria* Newm., qui ont des caractères sexuels tout autres ; ils ont cependant assez d'analogie avec ceux-ci pour que les *Pythæus latebrosus* et *pulcherrimus* aient été primitivement décrits sous le nom de *Brachytria*. Dans le genre *Pempsamacra* Newm., qui appartient aussi aux *Pythæinæ*, les ♂ ont les antennes un peu plus longues que celles des ♀, et leur dernier article est muni d'un faible appendice que Newman a pris pour un douzième article ; les *Pythæus* présentent avec ceux-ci une évidente parenté, et dans leur groupe ils précéderont immédiatement les *Pempsamacra*, les *Brachytria* devant dorénavant être placés en tête des *Pythæinæ*.

L'analogie que nous voyons entre les *Pythæus* et des Coléoptères, appartenant aussi manifestement aux Longicornes que les *Brachytria* et les *Pempsamacra*, peut fournir un argument pour

déclarer que le genre n'appartient pas aux Phytophages. Les *Pytheus* ne sont d'abord pas des Hispides, comme l'avait cru Chapuis, car ils n'ont ni la bouche cachée et portée en arrière si caractéristique des *Cryptostomes*, ni les antennes aussi rapprochées à leur base que chez ceux-ci. De plus, en parcourant la riche collection d'Hispides de Chapuis, je n'ai pu y trouver d'espèce revêtue comme les *Pytheus* de longs poils mous : le *Trichispa sericea* Guér. de Madagascar présente seul une courte et légère pubescence.

Chapuis n'a pas été d'ailleurs le premier à introduire un Longicorne dans cette tribu : on sait, en effet, qu'Olivier avait placé le *Ctenole. de emmaculata* à côté des *Hispa*. En sens inverse, Perty, en créant le genre *Homalopterus*, en avait fait un genre de Longicornes, et M. J. Thomson, trompé par le facies, avait rapproché l'*Embyon grisellitosum*, ce curieux Eumolpide du Brésil, des Lamiides du genre *Brachychilus*.

Ces mépris consacrent l'impossibilité d'exprimer synthétiquement par des mots les différences que présentent les Longicornes et les Phytophages. Si nous examinons le facies, le genre *Pytheus* pourra facilement être considéré comme Longicorne, mais le facies seul ne peut servir à trancher la question : ses trois facteurs principaux, allongement du corps, des antennes et des pattes chez les Longicornes, peuvent se retrouver parmi les Phytophages, au point d'être même réunis dans le *Rhagiosoma madagascariense* Chap. par exemple. D'après Le Conte et M. le Dr Horn (Classification of the Col. of North America, p. 269), il y aurait chez les Longicornes une tendance dans les épimères du métathorax à s'avancer latéralement vers les segments de l'abdomen, tandis que chez les Phytophages, le premier segment de celui-ci serait prolongé en avant sur les côtés pour rencontrer le métathorax ; malheureusement, c'est là un caractère encore moins péremptoire que les autres. L'inspection des parties de la bouche ne peut mener à aucun résultat, mais, dans le cas qui nous occupe, je pense que le rapprochement du facies avec l'échancrure des yeux et le mode d'insertion des antennes, ce que l'on peut voir dans la figure 4^e de la planche 91 du Genera des Coléoptères est de nature à faire admettre incontestablement que le genre *Pytheus* appartient aux Longicornes.

Lacordaire, dans les généralités qui précèdent sa monographie des Phytophages, a pleinement discuté les caractères qui différencient les Subpentamères dont les larves vivent aux dépens du bois, et ceux qui ne se nourrissent que du tissu cellulaire des végétaux. En même temps, il démontre que ces deux catégories de Coléoptères doivent former des groupes distincts.

Aussi n'est-ce pas sans une certaine surprise que l'on aura vu Le Conte et M. le Dr Horn, dans leur ouvrage déjà cité sur les Coléoptères de l'Amérique du Nord, en vertu de la salutaire réaction qui s'est produite de nos jours contre la division par Erichson de l'ordre en petites familles juxtaposées, faire un seul bloc des *Spondylidar*, des *Cerambycidae*, des *Chrysomelidae* et des *Bruchidae* sous le nom de *Phytophaga*. M. Matthews, dans une analyse de la classification des auteurs américains (*Ann. Nat. Hist.*, 1883), s'est déjà chargé de réfuter cette innovation et a rendu aux *Longicornia* le rang que méritent principalement leurs mœurs et leurs caractères sous leurs premiers états.

Apparus nécessairement sur le globe après les Phytophages, les Longicornes semblent cependant avoir eu avec eux une origine commune et paraissent ne pas en dériver : l'on trouvera sans doute les formes ancestrales des uns et des autres parmi les *Anthribidae*, cette famille synthétique, comme disait Le Conte, dont quelques espèces présentent avec certains Lamiides de curieux exemples de mimétisme. Mais, selon une comparaison de Lacordaire, de même que quelques lettres peuvent former un nombre illimité de mots et donner naissance à deux langues sœurs ayant chacune leur cachet particulier, de même aussi la variation de quelques caractères dans un sens a pu produire une multitude de Longicornes, à côté d'un nombre non moins grand de Phytophages dans un autre, les espèces des deux séries présentant cependant un facies tout différent. Et, si dans une langue nous voyons des mots trahir leur communauté d'origine avec ceux d'une autre langue voisine, nous constatons aussi que par une convergence de caractères, des Longicornes empruntent le facies de Phytophages, ou réciproquement, et l'on comprendra comment un entomologiste de la valeur de Chapuis ait pu introduire un Longicorne tel que le *Pytheus pulcherrimus* parmi les Hispides.

M. le Dr Fromont, qui s'est depuis près d'un an engagé comme médecin à bord des steamers d'Anvers à l'Amérique méridionale, se trouvant en ce moment à Bruxelles de retour de son deuxième voyage, où il a eu occasion de visiter Buenos-Ayres, Montevideo, Rio-Janeiro, Bahia et New-York, entretient l'assemblée de diverses observations intéressantes.

A Bahia, où il a eu occasion de recevoir la cordiale hospitalité et de faire la connaissance de notre aimable et savant collègue M. de Lacerda, la chasse aux insectes par les procédés divers employés en Europe, n'aboutit qu'à procurer de grandes quantités de fourmis, surtout à l'époque des grandes chaleurs du mois de novembre. Bahia et ses environs ne fournissent d'ailleurs en aucune

saison que peu d'insectes à M. de Lacerda: c'est de l'intérieur, à plus de cinquante lieues de la côte, qu'il reçoit tout ce qu'il possède d'intéressant dans sa collection.

M. Fromont ajoute qu'à Rio-Janeiro, son expérience de chasseur européen ne l'a pas beaucoup mieux servi, et ce n'est que dans le climat de La Plata que l'on retrouve des conditions qui se rapprochent de celles de l'Europe et donnent lieu à l'emploi des mêmes procédés de chasse.

Naturellement, les assertions de M. Fromont ne s'appliquent qu'aux lieux voisins des ports qu'il a seuls pu visiter.

Il fait voir plusieurs exemplaires d'une belle espèce d'Arachnide de forme étrange (genre *Gonyleptes*), qu'il a prise à Montevideo.

Les voyageurs nous parlent souvent de véritables essaims de lépidoptères qui se font prendre sur les vaisseaux en mer, à une certaine distance de la côte de l'Amérique méridionale. D'après eux, ces lépidoptères seraient entraînés en mer par le vent d'ouest, celui qui arrive de la plaine des Pampas et qu'on nomme le *pampero*. D'après M. Fromont, cette explication n'est pas juste, au moins dans tous les cas, et son expérience personnelle lui permet d'en donner une autre. Sous 20° de latitude méridionale, en face de Santa Marta Grande (Brésil), le steamer, se trouvant à près de 80 lieues de la côte et le vent soufflant d'une direction tout opposée, un très grand nombre de lépidoptères (Phalènes, Noctuelles, Bombycides, Sphinx) se montrèrent à bord et purent être aisément capturés. Descendant à fond de cale, M. Fromont y constata que de nombreux débris de chrysalides et des chrysalides prêtes à éclore se trouvaient au milieu des régimes de bananes et d'autres fruits dont le navire portait un approvisionnement considérable. Comme tous les navires quittant les ports de l'Amérique méridionale en emportent des provisions de ce genre, M. Fromont pense que, dans la plupart des cas, si pas dans tous les cas, les lépidoptères qui se prennent en mer sur les navires sont le résultat de semblables éclosions et n'ont pas été apportés par le vent.

M. de Selys-Longchamps fait remarquer à M. Fromont qu'il y a cependant des exemples authentiques de Lépidoptères Diurnes et d'Odonates arrivés de la terre sur les navires par la voie du vent et que son fils lui a apporté des exemplaires d'Odonates ainsi capturés par lui dans l'Amérique du Sud.

M. Fromont admet cette possibilité et déclare qu'il a aussi observé personnellement de grandes quantités d'Odonates traversant au vol le vaste golfe que forme l'embouchure de la Plata et venant visiter les bâtiments qui y naviguent.

Un autre approvisionnement des navires donne lieu à des éclosions de coléoptères: c'est la viande séchée, *carne seca*, qui s'achète

à Buenos-Ayres et qui souvent renferme des larves fort dégoûtantes de Silphides et de Calosomes. Il en a vu sortir en nombre le *Calo oma bonerienne* Dejean, dont l'odeur est des plus fétides et repoussantes. On voit éclore de la même substance la *Silpha erythrura* Blanchard, grande espèce, assez voisine par sa forme de notre *Silpha (Necrodes) littoralis*.

M. le Dr Fromont ayant terminé ces intéressantes communications, l'Assemblée s'occupe à discuter la proposition d'achat de volumes de la *Cistula entomologica* et du *Wiener Entomologische Zeitschrift*, déposée à la séance précédente par M. Van den Branden.

Cette proposition est combattue par MM. Fologne, De Lafontaine et Fondu, qui trouvent que la Société, ayant des collections incomplètes de divers périodiques, ne devrait pas acquérir des portions d'autres périodiques. Si l'utilité de ceux-ci était démontrée, il faudrait plutôt s'y abonner.

D'autres membres combattent le principe d'un abonnement et appuient la proposition d'achat.

Après une longue discussion, à laquelle prennent part un grand nombre de membres, la proposition de M. Van den Branden est mise aux voix et adoptée.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion du dimanche 8 mars.

M. Devaux propose de faire cette excursion à la **lisière méridionale de la forêt de Soignes**, se trouvant dans le périmètre de la feuille de Nivelles de la Carte, ainsi qu'il a été proposé à l'assemblée générale du 26 décembre. La localité explorée serait donc la lisière méridionale du bois, entre la chaussée de Tervueren à Waterloo et le hameau de Gailmarde.

Cette proposition est adoptée et M. Devaux désigné comme conducteur de l'excursion. Départ de Bruxelles (Quartier-Léopold) à 8 h. 55 m. du matin, pour Groenendael, d'où l'on gagnera à pied par la chaussée la localité à explorer.

M. Lameere demande à interpeller le Conseil relativement au tarif de l'imprimeur pour les tirés à part des auteurs.

M. de Borre répond en donnant lecture de la lettre qu'il a écrite le 15 janvier à notre imprimeur, qui ne lui a pas encore répondu à ce sujet. Une nouvelle démarche sera faite pour que ce tarif soit promptement établi et publié.

M. de Borre entretient l'assemblée d'un autre détail relatif à notre publication. Pour prévenir les souillures des comptes-rendus, depuis deux ans ceux-ci sont expédiés enveloppés d'une couverture en papier grisâtre. Ces couvertures coûtent en réalité peu de chose;

mais on pourrait se demander si leur aspect n'est pas de nature à déprécier aux yeux des employés des postes les imprimés qu'elles contiennent et contribuerait par là peut-être aux pertes d'exemplaires dont il a été question au commencement de la séance. La Société Royale Linnéenne, la Société de Microscopie et d'autres donnent à leurs bulletins mensuels des couvertures imprimées, où sont même insérées des annonces. Il n'entrerait pas sans doute dans les vues de la Société d'entreprendre cette publication d'annonces, mais ne trouverions-nous pas quelque éditeur disposé à nous fournir des couvertures imprimées, où des annonces, à tant la ligne, pourraient être à l'usage des entomologistes? Avec des annonces de librairie, profitables à l'éditeur, on achèverait de remplir cette couverture. J'ai eu occasion d'en causer, il y a quelque temps, avec M. Weissenbruch, notre imprimeur, et il m'a dit être assez disposé à essayer de cette couverture pour ses annonces, mais sans engagement de continuer si l'essai n'était pas favorable. Dans ce cas, je pense qu'il ne serait pas difficile de trouver un autre éditeur; nous voyons, par exemple, la librairie de l'Office de publicité imprimer deux fois par mois un bulletin des publications nouvelles plus considérable que ne le serait notre couverture; et notre compte-rendu, distribué chaque mois à plus de trois cents exemplaires, tant dans le pays qu'à l'étranger, est un instrument de publicité nullement à dédaigner.

L'assemblée émet un avis favorable et autorise le Secrétaire à employer des couvertures imprimées pour préserver les numéros de nos comptes-rendus.

La séance est levée à 9 1/4 heures.

ERRATA DU N° 41.

Page	xv, ligne 35,	au lieu de :	« de Trentin »,	lisez :	« du Trentin ».
—	xvi, — 17,	—	« André de Beaune »,	lisez :	« André, de Beaune ».
—	xxi, — 29,	—	« ZEUCOGASTER »,	lisez :	« LEUCOGASTER ».
—	xxxix, — 41,	—	« <i>Lobedera</i> »,	lisez :	« <i>Labedera</i> ».
	43,		« Pack »,	lisez :	« Packard ».

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 43.

Assemblée mensuelle du 1^{er} mars 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergé, Capronnier, De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, De Raeck, Devaux, H. Donckier de Donceel, Engels, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lallemand, Lameere, Remy, Vanden Branden, Vandervelde, Van Rossen et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. Duvivier, Roelofs et Weinmann font excuser leur absence.

La séance est ouverte à huit heures dans l'ancienne salle des séances.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 2 février est approuvé.

Le Conseil d'administration a reçu la démission de M. V.-L. Seoane, membre effectif.

Il vient d'admettre deux nouveaux membres effectifs : M. Aristide L'Arbalestrier, directeur de l'hôpital militaire, à Bruxelles, présenté par MM. Preudhomme de Borre et H. Donckier de Donceel; et M. Léon Arnold, de Schaerbeek, présenté par MM. Egerickx et H. Donckier de Donceel. Également un membre associé, M. S. Putzeys, étudiant, à Ixelles, présenté par MM. H. Donckier de Donceel et Preudhomme de Borre.

Correspondance.

M. Renard remercie pour son admission comme membre effectif.

M. le Directeur du Musée royal d'Histoire naturelle nous informe que le Gouvernement autorise la reprise de nos séances dans notre

ancien local, sous condition que l'éclairage s'y fasse désormais par des lampes à l'huile de colza.

M. P. Weissenbruch nous communique pour les tirés à part le tarif suivant :

La feuille à 25 exemplaires	.	.	.	.	.	fr.	8.24
— 50	—	.	.	.	.	.	9.50
— 100	—	.	.	.	.	.	12.52
— 125	—	.	.	.	.	.	13.44
— 150	—	.	.	.	.	.	14.52
— 200	—	.	.	.	.	.	18.00

L'assemblée trouve que ce tarif est trop peu détaillé et ne répond pas au désir exprimé à l'assemblée générale du 26 décembre.

M. le baron Osten-Sacken, membre honoraire, se plaint de la manière suivante :

" ... Moi aussi, j'ai subi les irrégularités de la poste pendant l'année 1883 : les n^{os} 32, 33, 34, 36 et 37 du Bulletin ne me sont pas parvenus. Je suis parfaitement sûr de ne pas les avoir égarés, puisque j'ai des cartons à part pour chacune des nombreuses publications périodiques que je reçois... Il est singulier que ces irrégularités se soient produites cette année-ci seulement; elles n'ont pas eu lieu pendant les années qui précèdent. Ces réclamations ont dû vous causer bien des ennuis; mais il me paraît évident que les irrégularités auxquelles elles sont dues ont lieu dans les bureaux de poste en Belgique. Toutes les autres publications périodiques que je reçois (anglaises, américaines, françaises, allemandes) me sont remises très régulièrement. "

Dans une carte adressée à M. Fologne, trésorier, M. A. de Carvalho Monteiro, de Lisbonne, se plaint de n'avoir pas reçu le tome XXVI des Annales (paru en mai 1883) et une quantité de numéros de nos comptes-rendus.

M. le Dr Dugès n'a pas reçu le tome XXVI.

M. l'abbé Belon, de Lyon, se plaint de n'avoir pas reçu le compte-rendu de janvier 1884, ce qui prouve que les infidélités du service postal menacent de continuer cette année.

M. le Ministre de l'Intérieur nous transmet des publications qu'il a reçues pour nous de la République Argentine.

M. L. Ganglbauer, aide-naturaliste au Musée de Vienne, chargé de la partie coléoptérologique de la Revue bibliographique que publie la Station zoologique de Naples, désirerait que nos collègues lui voulussent bien adresser des tirés à part de leurs notices publiées en 1883 sur les coléoptères.

M. A. Fauvel désirerait obtenir, par voie d'échange, la petite *Cicindela maritima* de Calmpthout, un mâle de préférence.

La Société hollandaise des Sciences, à Harlem, l'Institut Royal Lombard des Sciences et des Lettres et les éditeurs de la revue *Science*, à Cambridge, nous remercient pour l'envoi de nos publications.

Le Musée de Buenos-Ayres nous adresse une livraison de la Description physique de la République Argentine, par le Dr Burmeister.

La Société de Microscopie de Hanovre nous adresse, pour la seconde fois, son rapport annuel. Dans la prochaine séance, la Société se prononcera sur l'échange de publications avec cette Société.

M. E. André, de Beaune, soumet à la Société un nouveau système de cuvette pour recevoir le préservatif dans les caisses des collections d'insectes. Ces cuvettes coûtent 2 fr. 50 c. la douzaine.

M. Dobiasch, à Gospie (Croatie méridionale), envoie un catalogue de coléoptères à vendre.

M. Gleerup, libraire à Lund (Suède), adresse un catalogue de livres d'occasion.

Divers prospectus.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu un rapport supplémentaire verbal de M. Lameere, l'assemblée vote l'impression aux Annales des deux notes de M. le Dr Dugès : *Métamorphoses de la Leptinotarsa undecimnotata* Stål et *Métamorphoses du Mallodon angustatum Thomson*, avec les figures nécessaires, formant une planche et demie. La seconde planche sera complétée par les figures de la note de M. Dugès présentée à notre séance de janvier.

M. de Selys-Longchamps présente un mémoire ayant pour titre : *Révision des Diptères paléarctiques*. Sont nommés rapporteurs : MM. Capronnier et Preudhomme de Borre.

M. le Dr Heylaerts adresse la série suivante de notes :

LES PSYCHIDES DE LA HOLLANDE ET DE LA BELGIQUE.

Si je fais ici l'énumération des *Psychides* trouvées dans les Pays-Bas, je crois ne pas faire un travail inutile, car ni le Catalogue de M. Donckier de Donceel, ni la Faune des Lépidoptères de la Hollande, de M. Snellen, n'en donnent une idée précise. Je m'abstiendrai maintenant de la description, et je me bornerai à donner l'*Habitat* des espèces.

a. **Acanthopsyche** Heyl., groupe **Pachytelia** Westw.

1. *Unicolor* Hfn.

BELGIQUE : Campine anversoise, Hainaut (Mons) et encore bien ailleurs, par exemple Namur, Liège, Luxembourg, etc.

HOLLANDE : Gueldre, Arnhem (environs), Limbourg (Venlo) et Brabant septentrional (Bréda, bruyère de Galder).

2. *Villosella* O.

BELGIQUE : Anvers (environs de Hoogstraeten, Minderhout, etc.; trouvée par moi-même.

HOLLANDE : Gueldre (environs d'Arnhem) et Brabant septentrional (Bréda, bruyère de Galder); quelquefois en quantité.

b. **Oreopsyche** Speyer.

3. *Atra* L. = *Plumifera* O.

BELGIQUE : Anvers (environs de Hoogstraeten, Minderhout, etc.; trouvée par moi-même sur le *Thymus angustifolius*.

HOLLANDE : Gueldre (environs d'Arnhem), Utrecht (Zeist) et Brabant septentrional (Bréda, bruyère de Galder).

P.-S. Je ne crois pas que *O. Albida* Esp. soit en Belgique. Si réellement elle y a été trouvée, ce ne sera qu'accidentellement. Je veux attendre des données plus précises.

c. **Psyche** Schrank, groupe **Gymna** Rbr.

4. *Hirsutella* Hübn. = *Calrella* O.

BELGIQUE et HOLLANDE, provinces orientales, assez commune dans les bois.

Psyche Schrank, groupe **Stenophanes** Heyl.

5. *Graslinella* Bdv.

BELGIQUE : Anvers (environs de Hoogstraeten et de Calmpthout (c'est la *Viciella* trouvée par MM. Fologne, Mors et Weyers; vide Ann. Soc. ent. Belge, V, p. 48).

HOLLANDE : Brabant septentrional (Bréda, bruyère de Galder); localisée, mais pas rare.

Canephoridæ. Gen. **Epichnopteryx** Hübn.

6. *Pulla* Esp.

BELGIQUE et HOLLANDE, provinces orientales, peu rare.

7. *Tarnierella* Bruand.

BELGIQUE : Pas encore trouvée.

HOLLANDE : Gueldre (Nimègue), Brabant septentrional (Bréda).

8. *Reticella* Newman.

BELGIQUE : pas encore trouvée.

HOLLANDE : Brabant septentrional (Bréda).

Gen. **Fumea** Hübn.9. *Nitidella* O. (certainement pas = *intermediella* Brd.).

BELGIQUE et HOLLANDE; très commune, surtout dans les provinces orientales.

10. *Betulina* Z.

BELGIQUE : Trouvée par moi à Louvain, Bruxelles, Mons, Namur, Liège, Hoogstraeten et Calmpthout.

HOLLANDE : Gueldre (environs d'Arnhem, Nimègue, etc.), Brabant septentrional (Bréda, peu rare), Utrecht, Limbourg, etc.

11. *Sepium* Speyer.

BELGIQUE : Bruxelles, et certainement ailleurs dans les bois.

HOLLANDE : Gueldre (environs d'Arnhem, Nimègue, etc.), Brabant septentrional (Bréda); pas rare dans nos bois. Aussi bien ailleurs.

REMARQUE. — Si je n'énumère pas *Chalia opacella* H.-S., c'est que je n'en ai vu que des exemplaires de la collection Breyer, sans étiquette. Je crois bien qu'un jour ou l'autre cette espèce sera retrouvée en Belgique, et trouvée en Hollande dans les provinces de Gueldre, du Limbourg ou du Brabant septentrional. Mais jusque-là les données sont trop peu précises pour l'admettre dans la faune des Pays-Bas. Pour les *O. Albida* Esp. et *Ps. Viciella* Schiff., je ne crois pas à leur découverte dans la Belgique.

Donc, dans le catalogue de M. Donckier de Donceel, *Viciella* Schiff., *Opacella* H.-S. et *Albida* Esp. seront rayées; par contre, *Villosella* O., *Atra* L. = *plumifera* O., *Graslinella* Bdv. et *Betulina* Z. y seront insérées.

Dans les listes de M. Snellen manque encore la *Reticella* Newm., qui, publiée déjà par moi, Tijdschr. v. Ent. der Ned. ent. Ver., t. XXI, list. suppl., n° 7), n'a pas été mentionnée, par un oubli inconcevable de l'auteur.

NOTES SYNONYMIQUES RELATIVES A DES PSYCHIDES.

1. *Oiketicus* (?) *Buchholzi* Plötz (Stettiner ent. Zeit., t. 41, 1880, p. 88) est = *Casphalia flavicollis* Walk. L'auteur lui-même en convient. La description de Walker (Lists of the spec. of Lep. Ins. in the Coll. of the Brit. Mus., part XXXV, suppl. 5, p. 1925) est assez bonne.
2. *Oiketicus tabacillus* Weyenbergh (Tijdschr. voor Ent. der Ned. ent. Ver., t. XXVII, 1^{re} afl., p. 20, pl. 2, fig. 12-13) me paraît tellement pareille, par rapport au fourreau (le mâle n'est pas décrit), à l'*Oiketicus Geyeri* Berg, que je n'hésite pas à proclamer la synonymie des deux espèces.

L'*Oik. Geyeri* a été publié par le professeur Berg, p. 98, t. IV, n° 11 des Anal. de la Soc. Cientif. de Buenos-Ayres.


DESCRIPTION D'UN GENRE NOUVEAU ET D'UNE ESPÈCE NOUVELLE
APPARTENANT AUX COSSINA H.-S.

GEN. ROMANOFFIA m.

Mas. Capite lato; oculis magnis rotundis; ocellis nullis; palpis falcatis, frontem non superantibus, breviter pilosis, articulo secundo longissimo, tertio tamen brevi atque conico; antennis longissimis breviter bipectinatis; lingua spirali valida.

Thorace lato hirsuto; abdomine angulum analem superante. Pedibus validis, tibiis anterioribus brevibus spina magna recurvata adhærente; tibiis posterioribus quadricalcaratis.

Alis anterioribus latioribus, margine anteriori apiceque rotundato, margine exteriori medio paulo excavato, margine interno fere recto; costis 10; cellula discoidali magna divisa: parte superiori partem inferiorem triente magnitudine superante; costa costali (10) libera; cellula appendiculata permagna: e margine hujus exteriori 6, 7 + 8 (longe petiolatis); 9 e margine anteriori cellulæ discoidalis; 5, e discocellularis parte inferiori, cellulæ appendiculatæ marginem inferiorem perficiente; 4 ex angulo posteriori, 2 et 3 e margine posteriori cellulæ discoidalis; 1 et 1^a marginem anteriorem versus convergentibus.



Alis posterioribus elongatis, margine anteriori exteriorique subrotundato, margine interno subobliquo. Costis 8: 8 tota libera, 7 e margine superiori et 6 ex angulo anteriori cellulæ discoidalis divisæ; 4 + 5, longe petiolatis, ex ejusdem angulo posteriori cum 3 li-

bera e 2 e margine posteriori; 1^a prope alae marginem internum, 1^b et 1^c remotis et marginem externum versus divergentibus. Frenulo longiori.

Imperialis nov. spec.

Mas. Flavo-griseus; capite flavo piloso; antennis læte fuscis ad apicem pectinatis, 64-articulatis, scapo valido, ciliis medioeriter longis a quarto exteriori ad apicem decrescentibus; oculis magnis rotundis; palpis articulo primo longe flavo hirsuto, secundo longo, breviter nigro-brunneo piloso, tertio parvo conico obscuriori.

Thorace supra flavo-griseo (collare concolor) subtus flavo, scapulis latis pilosis; abdomine supra breviter piloso nigro-griseo flavo marginato, subtus flavo, apice breviter acuteque flavo griseo barbato. — Pedibus læte brunneo-griseis, trochanteribus flavo-aurantiacis.

Alis anterioribus flavo-griseis, cellulis intrusis appendiculatisque subpellucidis; venis productis.

Alis posterioribus flavo-griseis. — Fimbriis concoloribus. — Expansio alarum 36 mill.

HABITAT : America meridionalis, Chirequi.

♂ dans le Musée du Dr Staudinger.

Le genre, fondé sur un seul ♂, est tellement unique par rapport à la nervulation, que je n'hésite pas à le publier dès maintenant.

Comme l'espèce sera figurée, je n'ai rien à ajouter à la diagnose, qui, je l'espère, est claire et précise.

J'ai l'insigne honneur de la dédier à Son Altesse Impériale le Grand-duc NICOLAS MICHAËLOWITCH, l'illustre prince entomologiste, qui par ses travaux entomologiques, l'appui donné à notre chère science, et sa grande libéralité envers les adeptes de ses études favorites, même étrangers à sa patrie, est digne des plus grands éloges.

S. A. I. a bien voulu me faire parvenir un tiré à part de son intéressant travail sur une nouvelle espèce de *Colias*, *C. Olga* Romanoff : j'espère que S. A. I. voudra bien agréer de ma part, en signe de reconnaissance, la dédicace d'un genre et d'une espèce aussi remarquables et uniques que la **Romanoffia imperialis** m.

GEN. LABEDERA WALKER.

Staudingeri m.

Mas. Niger dense hirtus; capite parvo omnino longe nigro piloso; antennis flavis ad apicem bipectinatis, 50-articulatis, ciliis a quarto exteriori ad apicem decrescentibus; palpis fere porrectis, articulo

3^e minuto rotundo (nec *conico* sicut dixit Walker), longe nigro-pilosis; oculis parvis rotundis; thorace lato ac valido, supra sub-tusque longe nigro-piloso, collare ac scapulis aurantiaco-pilosis; abdomine supra et sub-tus longe nigro-hirto, aurantiaco-barbato. Pedibus brevibus, validis tamen, omnino longe, tarsis breviter, aurantiaco-hirtis. (Calcaria pilorum causa non vidi.)

Alis anterioribus elongatis pellucidis, costa tamen cellulisque 1^a, 7, 8, 9, 10 et 11 dense squamulis nigris obteectis, venis nigris; margine anteriori recto apice rotundato, margine interno brevi, margine exteriori perobliquo. — Costis 11; cellula discoidali brevissima atque divisa.

Alis posterioribus brevibus subpellucidis, nigro-pilosis, venis nigris. Costis 8; margine anteriori rotundata, exteriori paululo excavato, interno obliquo angulo anali producto. — Fimbriis omnino nigris.

Nervulatio. Alæ ant. : v. *dorsalis* basin versus furcata, 2 e margine inf. cell. discoid., 3 + 4 + 5 longe petiolatis e margine post. ejusdem, 6 ab eodem puncto, angulo ant. cellulæ mediæ, cum 7 + 8 + 9 + 10 longe petiolatis, 11 libera.

Alæ post. : 2 e margine cell. mediæ, 3 + 4 longe petiolatis e margine posteriori ejusdem, 5, *reliquis debitor* e medio discocellularis, 6 + 7 longe petiolatis ex angulo anteriori cellulæ discoidalis, 8 libera.

Expansio alarum 23 mill.

HABITAT : America meridionalis, Bogota. (10. II, 71, alter, 30, IV, 71.)

2 ♂♂ dans le Musée du Dr Staudinger.

Je dédie cette *species nova* à M. le Dr O. Staudinger, le savant lépidoptérologiste, le travailleur infatigable, qui nous stimule par son exemple, et qui m'a mis à même d'étudier les plus grandes raretés en fait de lépidoptères, pour que ma monographie soit aussi complète que possible.

Ayant tout à fait l'aspect d'une PSYCHIDE, *Labedera* (?) *Staudingeri* m. n'en est pas moins une GÉOMÉTRIDE, appartenant aux *Dendrometrina* H.-S. a. La petite tête, les yeux ronds, la nervulation (surtout 5 plus mince que les autres nervures), le manque des ocelles, etc. (vide diagnos.) en sont la preuve irrécusable.

J'ai mis un ? après le nom générique *Labedera* Walk., quoique je sois assez persuadé que notre espèce lui appartient. N'ayant pas vu la *Labedera hirtipes* Walk. *en nature*, la description de cette espèce de l'auteur en question (et aussi du genre) est assez précise. (Vide : Lists of the spec. of Lep. Ins. Brit. Mus, part IV, p. 965.)

Si en réalité j'ai bien vu, ce dont je ne doute pas, le genre

Labeledera Walk. appartient aux *Geométrides* et doit être placé tout près des genres *Biston* Leach. (*Nyssia* Dup.) et *Amphidasis* Tr. — Je trouve cette opinion corroborée par une femelle, qui provient également de *Colombie* (Muso, Saellen écrit Muro, III, 71), et qui pourrait bien être celle de l'espèce nouvelle.

En voici la description d'après nature :

D'une longueur d'environ 28 mill. et fortement bâtie. L'insecte est noir de velours, couvert de poils soyeux et lisses. La tête est noire et petite, les yeux sont ronds et les palpes sont formés comme ceux du mâle décrit ci-dessus. Les antennes manquent, accidentellement, spiritrompe invisible ou cachée par les palpes. Le *thorax* est large, le collier est *entièrement* et les *ptérygodes* sont *seulement extérieurement* d'un jaune orangé. L'*abdomen*, très long et large, est coupé transversalement, sur le bas de chaque segment, d'une strie d'un jaune orangéâtre; l'oviducte est large, jaune et bordé de noir.

Les pattes sont noires et couvertes de poils noirs, assez longs sur les *trochanters* et aux *cuisses*, plus courts sur les *tibias* et les *tarses*; les *onglets* sont très forts et rapprochés. La face interne des *hanches* et des *cuisses* est d'un noir grisâtre.

Les *tibias* postérieurs ont seulement *une* paire d'éperons, et il n'y a pas une épine aux antérieurs.

Les ailes sont seulement des tronçons; longueur des antérieures, 5 mill.; des postérieures, 4.5 mill. Elles sont arrondies avec la frange jaunâtre aux antérieures, blanc jaunâtre aux postérieures.

Les poils jaunes assez longs des *ptérygodes* en couvrent la base et un point jaune est placé *au milieu de chaque aile*, un peu plus près du bord externe.

En dessus la couleur est noire, en dessous jaune bordée de noir.

Sans en être bien sûr, je crois que cette femelle est une *Labeledera* Walk. La faune tropicale nous a tellement habitué aux différences des mâles et femelles d'une seule et même espèce, que l'éducation sur place prouvera peut-être plus tard que mon *hypothèse* est un *axiome*.

LE FOURREAU, LA CHRYSALIDE DU ♂ ET LA FEMELLE DE L'ANIMULA DICHROA H.-S.

Le Dr Herrich-Schäffer dit de cette *Psychide* (Samml. neuer oder wenig bekannter aussereur. Schmett., p. 8) : " Ich zweifle nicht daran, dass die *Animulinen* wahre Sackträger sind. " Le maître a eu raison, et je suis à même de décrire le fourreau et la femelle.

Le fourreau du ♂ a une longueur de 5 cent. et, au milieu, une largeur de 1.5 cent.; aux extrémités, à peine 5 mill. Ces dernières sont nues, tandis que le milieu est couvert de feuilles sèches et petites. La soie en est grise.

La chrysalide du ♂ est d'un noir de jais et est d'une coupe propre aux *Psychides*. D'après les restes de la chenille trouvés dans le fourreau, je crois que celle-ci est noire. Les pattes écailleuses sont très fortes et d'un noir de poix.

Les écussons dorsaux et la tête ont été brisés pendant la métamorphose, je n'en sais donc rien. L'un et l'autre se trouvent dans ma collection, et proviennent du général baron von Nolcken, qui a fait l'éducation de l'*A. dichroa* H.-S. à Santa Fé de Bogota (Colombie).

Le lieutenant Stork avait reçu de la famille de son épouse, originaire de Curaçao, un lot d'insectes provenant de Venezuela. En les examinant, j'y remarquai un fourreau de la ♀ de notre espèce. A grand-peine, j'obtins la permission de l'ouvrir pour décrire la ♀, etc., mais il ne voulut pas me céder la petite chose, qu'il a fini par perdre lui-même plus tard. M. le Dr Staudinger m'ayant envoyé à l'étude deux femelles de *Psychide* sans nom, je reconnus immédiatement *Dichroa* ♀, que je vais décrire maintenant.

Le fourreau (Stork) est plus large, mais de même modèle que celui du ♂, toutefois le tuyau anal manque. (Les restes de la chrysalide étaient d'un noir brunâtre.) La femelle elle-même est jaune brunâtre et mesure 20 à 30 mill. en longueur et 5 à 7 mill. en largeur. La tête est très petite et courbée en bas; pour seul dessin, elle a deux taches oculaires brunâtres; les trois premiers segments ont des écussons dorsaux jaune brunâtre, les parties génitales sont brunâtres, et le dernier segment abdominal porte une touffe épaisse de poils soyeux blanchâtres. Les antennes, à peine visibles, sont très rudimentaires et jaunâtres; les pattes, assez prononcées, mais sans ongles, sont, comme les *stigmata*, d'un brun de poix. Les deux femelles du Dr Staudinger ont une étiquette sur laquelle est écrit : R. n° 12 c. l. 11. V. 71. (a et b).

FOURREAU INÉDIT ET CHENILLE DE PSYCHIDE DE L'AFRIQUE MÉRIDIONALE. EUMETA ? ZELLERI m.

Aussi bien pour fixer l'attention des lépidoptéristes que pour honorer la mémoire du regretté professeur Zeller, je décris ici un fourreau avec sa chenille, dont il me fit cadeau, et qui provient de Priel, Caffrerie, station de missionnaires. L'étiquette originale est : " Cap. Priel. Dohrn., 1853 ".

Le fourreau a une longueur de 35 mill. et une largeur de 7.5 mill. au milieu.

La partie antérieure molle est, ce qui ne se trouve presque jamais, couverte entièrement de morceaux de tiges de graminées, d'un mill. environ, et attachés *perpendiculairement* sur la soie, comme les piquants d'un hérisson : le reste du fourreau est aussi couvert de tiges d'une graminée quelconque, variant en longueur de 15 à 27 mill., placées *longitudinalement*, mais en divergeant. La chenille, pas tout à fait adulte, mesure 17 mill., et est jaune brunâtre. La tête, d'un jaune d'os, a une fourche d'un noir de jais, dont les jambes s'unissent avec un V noir, qui repose sur une strie horizontale de la même couleur, séparant la lèvre supérieure de la face proprement dite. Des deux côtés sont placées une strie oblique, qui relie l'occiput avec le dessous de chaque jambe de la fourche, et une plaque en forme d'un X. Il y a cinq ocelles des deux côtés. Les trois écussons dorsaux sont d'un jaune d'os brillant et coupés longitudinalement par sept stries noires, rouge de sang au milieu du second écusson. Celle du milieu (dorsale) est la plus large : celle, la dernière, au-dessus des pattes est la plus mince. Le clapet anal est également d'un jaune d'os. Les pattes écailleuses et tout le dessous du corps sont de la même couleur, comme aussi les pattes membraneuses. Les antennes et les mandibules sont brunes.

Naturellement, on ne saurait dire à quel genre appartiennent chenille et fourreau. Si, par hasard, l'insecte parfait était découvert, je désirerais lui voir donner le nom de celui qui a guidé mes pas sur le chemin entomologique, et que je regretterai pendant toute ma vie.

Deux fourreaux et chenilles. Une dans la collection Zeller (maintenant Walsingham), l'autre dans la mienne.

Danais Chrysippus L. var. Vigelii m.

M. le Dr Vigelius, médecin militaire de 1^{re} classe, de l'armée néerlandaise, détaché aux Indes orientales pendant la guerre d'Atjeh, a utilisé les quelques moments libres que lui laissèrent ses occupations multiples, en chassant les insectes et en ramassant et en pêchant une quantité d'objets d'histoire naturelle. Entre autres, il me fit cadeau d'une exquise petite collection d'insectes, trouvés pour la plupart dans l'île Poeloe Bras, près de la côte d'Atjeh. Parmi les raretés trouvées par lui, se trouve une variété remarquable de *Dan. Chrysippus* L. en six exemplaires.

Elle est assez petite, le plus grand spécimen mesurant seulement 5.5 cent. d'envergure, le plus petit seulement 5 cent. La couleur est un beau lilas très doux, qui va en s'obscurcissant vers la

partie apicale de l'aile antérieure. La cellule 1 est blanche, 2 et 3 sont blanchâtres.

La bordure noire des ailes postérieures blanches n'est pas lavée d'orange comme pour la var. *Alcippus* Godt., dont elle se rapproche.

Je lui donne le nom du collègue généreux qui, pendant une guerre terrible et au milieu de dangers de toutes sortes, n'a pas oublié les promesses faites avant son départ.

J'en ai cédé un exemplaire à MM. le Dr O. Staudinger et Snellen. Les autres sont dans ma collection.

QUATRE ESPÈCES NOUVELLES DE PSYCHIDES DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Sous ce titre, M. le professeur Weyenberg, mon compatriote, publie dans le Tijdschrift der Nederlandsch. ent. Vereeniging, tome XXVII, p. 9-24, la description de *Psyche Cassia*, *Ps. Burmeisteri*, *Psyche Bergii* et *Oiketiscus tabacillus*, accompagnée de dessins qui remplissent la planche 2.

Je n'aurais parlé de ce travail que dans ma Monographie, du moins, s'il avait été le résultat d'observations sérieuses, mais, comme il me semble que c'est précisément le contraire, une critique fondée et juste pourra trouver sa place ici. En commençant, M. Weyenberg dit qu'il y a déjà bien longtemps qu'il a connu les espèces qu'il décrit, mais que la grande quantité de parasites (surtout Pteromalines (?? Heyl.) ont toujours contrecarré ses observations, de sorte que de *Ps. Burmeisteri* il ne connaît pas encore le ♂ (p. 16), et pour connaître le ♂ de *Ps. Bergii*, il a eu besoin de dix années d'études et d'observations continuelles (p. 17). Du quatrième il ne connaît pas encore le ♂. Le professeur Carlos Berg a été plus heureux (voyez plus haut, Obs. Syn.), et le professeur Burmeister le décrit également, Descr. phys. de la République Argentine, V, p. 402, travail que M. Weyenberg ne connaît probablement pas. Tout ceci prouve, clair comme le jour, que l'auteur ne sait absolument rien par rapport à l'éducation des *Psychides*. Pour abréger autant que possible, je ne veux que relever quelques hérésies. De *Ps. cassia* il veut nous faire croire que le cycle vital de la chenille n'est que de DEUX mois (p. 11); de *Ps. Bergii* il dit que les antennes sont unipectinées à leur extrémité supérieure (p. 17) et (*ib.*) que les pattes sont " *wenig GEDOORD* " (n'ont que peu d'épines), etc., etc., car le texte fourmille d'inexactitudes.

Les dessins sont aussi plus que médiocres pour la plupart. Fig. 3 ne ressemble pas mal à une oie, qui, enfermée dans un panier, allonge le cou. Fig. 4 doit représenter un fourreau quadrangulaire,

mais représente toute autre chose, Fig. 5 : la nervulation est, surtout pour l'aile postérieure, un chaos de lignes incompréhensible. Fig. 7 est probablement la figure d'une chenille morte et desséchée dans le fourreau avant la métamorphose. Des fig. 8 et 9 je crois que ce sont les portraits de fourreaux anciens, qui avaient été exposés aux intempéries de quelques années. Fig. 10, nervulation, les ailes antérieures n'ont ni plus ni moins que deux nervures costales. Fig. 11 représente la fameuse antenne *unidentée* à sa partie supérieure. On peut se convaincre déjà, d'après cette figure, que les barbules d'un des côtés ont été rompues par accident. Mais je termine ici ma critique, en faisant observer à M. le professeur Weyenberg que la seule utilité de son travail consiste en ce qu'il nous fait savoir que la République Argentine héberge, avec les *Oik. Kirbii* Lansd.-Guild. et *Geyeri* Berg, connus depuis longtemps, trois autres espèces de *Psychides*. Pour le reste, de telles publications inexactes font un tort réel à la science entomologique.

PSYCHIDE NOUVELLE DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Manatha Edwardsii m.

Mas. Nigro-griseus, dense hirtus; capite parvo nigro-brunneo piloso; antennis brevibus, longitudine marginis anterioris dimidii, ciliis longis brunneo-griseis, 32-articulatis; pseudopalpis brevibus brunneo-griseis; thorace longe nigro-brunneo piloso; abdomine haud valido, angulum analem superante, pilis brunneo-griseis appressis, oblecto, partibus genitalibus flavis brunneo-marginatis.

Pedibus brunneis, tarsis flavo-brunneis.

Alis concoloribus nigro-griseis, venis nigris, fimbriisque nigro-brunneis nitidis, dense pilis squamulisque oblectis.

Alis anterioribus sub-elongatis basi multo angustiori, apice subrotundato, margine anteriori tertio basali paululo truncato tertio apicali rotundato, margine interiori fere recto, margine exteriori paululo obliquo rotundatoque. Costis 12; 1^a cum 1^b ut apud *Oiketicos*; 2 et 3 ex margine inferioris, 4, 5, 6, 7 et 8 + 9 (longe petiolatis) ex margine exteriori-, 10 et 11 e margine superioris cellulæ mediæ; 12 libera. — Cellula intrusa nulla.

Alis posterioribus rotundatis sublatisque, apicibus angulisque analibus nullis; costis 7; cellulæ mediæ parte anteriori multo breviori, parte posteriori longiori, cellula intrusa nulla.

Expansio alarum 22 mill.

Femina erucaque mihi ignotæ; sine involucre.

HABITAT : Unio Americana septentr., Texas.

♂ in Museo Oberthür.

Le spécimen décrit avait une étiquette sur laquelle : *Thyridopteryx ephemeraformis* Steph. Texas, 22, X.

Thyridopteryx ephemeraformis Steph. ne ressemble en aucun point à l'espèce décrite par moi, et l'*Oiketicus* (?) Heyl.) *Abbotti* Grote (« *Sable brown with a vitreous bar at the extremity of the cell of primaries,* » et : « *the narrow external edging of the wings is pale* ») n'y ressemble nullement. Encore l'espèce décrite par Grote mesure 33 mill. d'envergure.

Je nomme la nouvelle espèce en l'honneur de M. Henry Edwards, entomologiste distingué et savant des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, le seul des lépidoptérogistes américains qui ait su ou voulu me donner des renseignements sur quelques *Psychides* des Etats-Unis, particulièrement celles qui ont été décrites par lui-même.

Partisan incorrigible de la doctrine, enseignée et propagée par des entomologistes éminents (Zeller, Dohrn, Herrich-Schäffer, Boisduval, Snellen van Vollenhoven et *tutti quanti*), qui prescrit de ne créer des genres nouveaux qu'à la dernière nécessité, je combattrai toujours à outrance la « triste maladie » si parfaitement nommée par Boisduval, la *gènesomanie*, qui est endémique en.... enfin suffit. C'est pourquoi j'ai adopté le genre *Manatha* Moore pour *Edwardsii* m., quoiqu'elle ne s'y adapte qu'en partie. Aussi je veux donner une plus grande éten lue au genre créé par M. Moore en traitant les deux espèces qui y appartiennent dans ma Monographie.

M. Bolivar adresse les observations suivantes sur les Orthoptères d'Europe et du bassin de la Méditerranée :

La littérature orthoptérogique s'est augmentée rapidement dans ces derniers temps; et, en ce qui concerne les Orthoptères d'Europe, le *Prodromus der europäischen Orthopteren* de M. Brunner von Wattenwyl, les *Orthoptères de Serbie* du Dr Pancic et les *Orthoptères de la France* du capitaine A. Finot sont les dernières publications générales et qu'on ne peut citer qu'avec le plus grand éloge; ces deux dernières sont des catalogues synoptiques qui nous font connaître plus en détail la faune des régions respectives, et j'insisterai davantage sur celle de M. le capitaine A. Finot, destinée à être du plus grand secours aux naturalistes français.

Quant au premier de ces ouvrages, que le nom seul de l'auteur suffit à faire juger, je me bornerai à exprimer mes regrets de ce que M. C. Brunner n'ait pas compris aussi dans le cadre de son ouvrage les Orthoptères du littoral méditerranéen en Afrique et en Asie; la faune méditerranéenne y aurait gagné notablement et nous

serait à présent aussi bien connue que celle de l'Europe géographique. Je profiterai de cette occasion pour protester contre une idée que mon excellent ami M. Krauss de Tubingue m'a attribuée dans ses *Synonymische Bemerkungen mit Bezug auf Bolivar's Catalogus Orth. eur.* Mon catalogue n'était pas absolument un catalogue scientifique, n'ayant pas d'autre but que de servir pour les échanges, et j'ai cru qu'en imitation de ce qu'on a fait à diverses reprises pour les coléoptères, je devais élargir ses limites en acceptant certaines espèces plus ou moins en relation avec la faune méditerranéenne et qui, pour ce motif, viennent plus facilement en possession des collectionneurs.

M. C. Brunner même, en se proposant de s'occuper exclusivement des Orthoptères d'Europe, a été forcé de citer jusqu'à 49 espèces qui n'appartiennent pas à cette faune. Et puisque je suis revenu à l'ouvrage magistral de mon savant ami et maître, je me permettrai de dire quels sont les seuls points où je ne partage pas ses opinions : ce sont toujours les éternelles questions de priorité dans les noms des genres et des espèces, et je vais les soumettre à l'examen de cette honorable société.

1^o Pour moi, l'auteur d'une espèce est toujours celui qui, le premier, l'a fait connaître en publiant une description suffisante. Par cette raison, la *Pyrgomorpha Serbica* ne doit pas être attribuée au Dr Pancic, et l'*Ephippigera agarchea* ne m'appartient pas non plus ; quoique le Dr Pancic et moi ayons donné leur nom à ces espèces, elles appartiennent sans contredit à M. Brunner, qui les a fait connaître le premier par une publication.

De même le genre *Mogisoplastus* est de Serville et non de Saussure, quoique ce dernier en ait corrigé l'orthographe : (*Mogoplastes* Serville).

2^o L'auteur qui se croit obligé de former de nouveaux genres aux dépens d'un autre, peut agir librement dans les dénominations des nouveaux genres, si toutefois il réserve pour l'un d'eux l'ancien nom.

Donc, feu M. le professeur Stål, en divisant le genre *Truxalis*, a pu nommer les divers genres de noms nouveaux, puisqu'il conservait le nom de *Truxalis* pour l'une des divisions (celle qui a pour type le *brevicornis* L.). Le nom *Acrida* qu'il a appliqué aux espèces européennes est donc indiscutable ; peut-être aurait-il mieux fait de conserver le nom *Truxalis* pour cette division, mais comme il ne l'a pas fait, nous ne pouvons altérer ces noms sous peine d'augmenter inutilement la synonymie ; du reste, ce nom n'était pas nouveau et avait été déjà employé par Linné pour un sous-genre qui comprenait exactement les espèces que nous appelons aujourd'hui, d'après Stål : *Acrida tunita*, *Acrida nasuta*.

De même pour *Tropidopola*, qui, à mon avis, doit subsister, le nom *Opomala* ayant été appliqué à d'autres espèces qui ne sont pas à côté de la *cylindrica*, et aussi pour *Arcyptera* et *Polyphaga*, qui ont la priorité sur *Sthethophyma* et *Heterogamia*.

Quant au nom de *Phyllodromia*, il ne devrait pas subsister, puisque le nom de *Blatta* est préférable; mais eu égard aux différences de nervulation des ailes de l'espèce *germanica*, je propose de faire un genre pour cette espèce, qui pourrait s'appeler *Blatta germanica*, et de grouper toutes les autres espèces sous le nom de *Phyllodromia*.

La faune européenne s'est augmentée considérablement depuis la publication de l'ouvrage classique de Fischer, *Orth. eur.*; et dans le *Prodromus* de M. Brunner, elle ne comporte pas moins de 412 espèces; à ce nombre, il faudrait ajouter l'*Anonconotus Ghiliani* Cam. (*Descrizione di un n. g. e di una n. sp. di ortottero piemontese*, per L. Camerano. Torino, 1878) et aussi deux espèces de *Pezotettix* récemment décrites par H. Krauss (*P. baldensis* et *P. Cobellii*).

Du reste, l'*Aulaxius Kraussi* du *Prodromus* ne se rapporte pas à mon espèce, et je propose de le nommer *A. hispanicus*; le vrai *A. Kraussi* Bol. est une espèce qui vient se placer à côté du *A. spinibrachius* Fisch. et dont je ne connais que la ♀; les plantules libres du premier article des tarses postérieurs sont (une fois desséchées) à peine plus courtes que l'article, ce qui se trouve de même chez le *spinibrachius*, et l'oviscapte est aussi un peu recourbé en bas. Les différences avec l'*A. spinibrachius* sont: pronotum plus court, tronqué en arrière et non sinueux latéralement; la bande jaune latérale des côtés rabattus est réduite à une seule tache postérieure.

En comparant les divers individus d'Espagne de ma collection réunis sous le nom de *Arcyptera fusca*, je me suis immédiatement aperçu que j'avais compris sous ce nom deux espèces très diverses, dont l'une était la vraie *A. fusca* Pall., tout à fait semblable aux exemplaires d'Allemagne et de Russie, et l'autre une espèce nouvelle; c'est cette espèce qui est la plus commune en Espagne; elle se trouve à l'Escorial et à San Ildefonso et est abondante; la vraie *A. fusca* ne se trouve qu'en Catalogne, et le seul exemplaire que je possède m'a été envoyé par M. Martorell y Peña. Voici les différences principales avec l'*A. fusca* Pall. :

***Arcyptera Tornosi* mihi, spec. nova.**

Arcyptera variegata Bol. *Sinops*, p. 138, ex part.

Long. du corps ♂, 22-25 mill.; du pronotum, 5 mill.; des élytres, 20 mill.

Long. du corps ♀, 28-31 mill.; du pronotum, 6.5 mill.; des élytres, 12-14 mill.

Les élytres sont moins développées que chez l'A. *fusca* et plus étroites chez le ♂; les aires scapulaire et externo-médiane sont plus régulières, la veine médiastine est simplement courbée mais non flexueuse, et les radiales sont presque droites: les élytres de la femelle sont raccourcies, amples, lancéolées et pointues; les genoux des pattes postérieures sont jaunes chez la ♀, et de même les lobes géniculaires.

C'est la première espèce que je décris depuis la mort de M. Lucas de Tornos, directeur du Musée d'histoire naturelle de Madrid, et je me fais un devoir de la dédier à la mémoire de celui qui a été mon maître vénéré ainsi que celui de tous les naturalistes espagnols depuis une quarantaine d'années pendant lesquelles il a occupé la chaire d'histoire naturelle des invertébrés à l'Université de Madrid.

Je profiterai de cette occasion pour faire connaître quatre autres espèces nouvelles, dont deux sont espagnoles, ce qui porte à 204 le nombre des espèces que j'ai enregistrées jusqu'à présent dans la Péninsule, dont la faune orthoptérologique est sans doute la plus riche de toute l'Europe; encore y a-t-il bien des régions à peu près inexplorées.

Aphlebia bætica mihi.

Nigra; vertice rufo; antennis testaceis, apice fuscis; pronoto antice rotundato, postice rectè truncato, angulis posticis rotundatis, plaga discoidali subrotundata nigra; elytris abbreviatis segmentum 3 abdominis non attingentibus, postice rotundatis, pallidis, vena parum conspicuis, interstitiis fusco-punctatis; margine postico segmentorum abdominis eburneo.

Long. corporis, 6 mill.; pronoti, 1.8 mill. Lat. pron., 2.6 mill. Long. elytrorum, 2 mill.

HABITAT: Lanjaron dans la Sierra Nevada, Chicote!

Elle ressemble à A. *brevipennis* Fisch., mais les élytres sont pâles et beaucoup plus petites, cornées et arrondies postérieurement; la tache discoidale du pronotum est presque arrondie, ce qui fait qu'elle est très éloignée des angles postérieurs du même anneau; l'écusson est d'un roux noirâtre, les cerques sont noirs et les pattes rougeâtres.

Deux seuls exemplaires ♂, dont l'un, encore immature, a toutes les parties qui sont noires dans le type, de couleur rougeâtre.

Pachytylus Mlokoziejewitzcki mihi.

P. *nigrofasciato habitu similis, differt, pronoto postice rotundato, carina media multo minus elevata; lobis deflexis subtus*

obliquè et obtusissimè rotundatis; alis hyalinis fascia arcuata media fusca antice interrupta marginem externam non attingente, disco interno dilute flavo. ♂ ♀.

Long. corporis ♂, 18 mill.; pronoti, 3.5 mill.; elytrorum, 19 mill.

Long. corporis ♀, 28 mill.; pronoti, 4.5 mill.; elytrorum, 27 mill.

HABITAT : Tiflis. Envoyé par M. Louis Mlokoziejewitzek, à qui j'ai l'honneur de le dédier. Quoiqu'il ressemble extrêmement au *P. nigrofasciatus* de Geer, il s'en distingue facilement par sa forme plus grêle, par son pronotum arrondi postérieurement, dont le lobe postérieur est notablement plus court que l'antérieur, et dont la crête médiane est moins élevée; la forme des lobes latéraux est aussi différente : le bord extérieur (inférieur), qui, dans le *nigrofasciatus*, est subanguleux au milieu, est ici oblique et légèrement arrondi; les ailes postérieures sont bien plus étroites et la bande obscure est placée au milieu et elle passe plus loin du bord postérieur.

Ephippigera balearica mihi.

E. Perezii valde affinis tamen statuta majore, colore viridiviridolivaceo; pronoto ferè lævi, nitido, parte postica parum distinctè fossulata, elevata; elytris corneis, convexissimis, punctatis, tantum prope marginem externum fossulatum; vena radiati rufa, campo marginali angusto, inflexo, fusco; tibiis anticis supra versus apicem spinis duabus, secunda minuta; abdomine rufo? segmentorum margine postica olivacea; lamina subgenitali medio plicata, sinuata, utrinque lobulo rotundato transversa; oviscapto subincurvo. ♀.

Long. corporis, 33 mill.; pron., 10.5 mill.; lat. pron. 8.5 mill.; long. femor. post., 22 mill.; oviscapiti. 21 mill.

HABITAT : Mallorca; envoyé par M. Moragues.

Très rapprochée de l'*E. Perezii* mihi, mais plus grande, d'un vert olivâtre avec le pronotum brillant; les élytres sont convexes et la réticulation est si serrée, qu'elles semblent plutôt pointillées, excepté près de la veine radiale, où ces aréoles se voient plus clairement; les jambes antérieures ont, dans la moitié apicale, deux épines dorsales et une apicale; la plaque subgénitale est plissée au milieu et elle forme de chaque côté un lobe transverse arrondi.

Lissoblemmus praticola mihi.

Corpore nigro omnino villosa; capite globoso; fronte latitudine sua longiori, pronoto retrorsum angustato, lateribus griseo villosa atque pilis nigris sparsis; elytris apicem abdominis subattingentibus apice pallide flavis; tibiis posticis intus extusque spinis sex.

Long. corp., 14 mill.; pronoti, 3 mill.; elytr., 6.2 mill.; fem. post., 8 mill.; tibiae post., 4.5 mill.

HABITAT : Tanger.

Il diffère du *L. Mazarredoi* mihi par sa grandeur presque double et par la couleur uniforme de la tête, qui est bien plus grande et convexe; le pronotum, plus élargi antérieurement, est villex; le front est plus long que large (dans le *Mazarredoi*, il est transverse), les jambes postérieures ont six épines au lieu de cinq.

J'ai découvert l'espèce algérienne sur le plateau du Mourdjadjo, près d'Oran (580 mètres). Quant au *L. praticola*, nous l'avons trouvé dans l'excursion que j'ai faite au Maroc l'année dernière avec mes élèves d'entomologie, dans des prairies peu élevées situées sur le chemin de Tanger à Tétuan, près du Tondak.

Le genre LISOBLEMMUS diffère du genre LOXOBLEMMUS par la veine médiastine des élytres, qui est simple; celles du champ latéral sont parallèles; les veines obliques du tympan au nombre de quatre; les jambes antérieures n'ont pas de tympan en dedans, et celles de derrière sont de moitié plus courtes que le fémur correspondant.

Bien que nous l'ayons cherchée avec le plus grand soin, de même que pour le *L. Mazarredoi*, nous ne sommes pas parvenus à trouver la femelle de ce curieux grillonien, qui est venu augmenter d'un nouveau genre la faune méditerranéenne; mais je suis porté à croire que chez elle, le front doit être presque convexe et à peine en biseau.

M. Sharp adresse le travail suivant, dont la Société décide la publication en anglais, mais en chargeant le Secrétaire d'en faire une traduction qui, après avoir été soumise à l'auteur, pourra être insérée dans un numéro subséquent des Comptes-rendus.

SOME OBSERVATIONS ON HYPOCEPHALUS ARMATUS

by D. Sharp.

This extraordinary insect has for long attracted the attention of the few naturalists who have been fortunated enough to see it, but it has hitherto been very rare in collections, and is therefore not so well known as we may hope it soon will be now that its locality is exactly known. Some months since I received an example from M. Antonio de Lacerda of Bahia, which so much excited in me the desire to know more of it, that I wrote to M. de Lacerda and asked him if he could supply me with a mutilated example for dissection. He replied in the most obliging manner,

sending me such as I wished, and as the result of his kindness I have been able to make the following notes.

In the position examples are found in after death, and in which they are represented in the figures that have been published, the head is extremely deflexed so that its anterior parts are placed beneath the thorax, and the front of the mandibles is directed beneath the insect to the posterior part of the body. In this position the peculiar posterior angles of the vertex rest upon the anterior edge of the pronotum just at its front angles, and the head has a peculiar rigidity and immobility being deprived of all capacity of rotation or nutation. This position is not, however, that in which the insect is found when alive and active, but is in fact a position of contraction such as is assumed by many insects when they wish to protect themselves by inactivity during life, and which they usually assume at death. And actually the head of this insect possesses an extreme capacity of movement, for it will be found on thoroughly softening an example, and then overcoming the resistance of the powerful muscles by which the contraction is during life effected and maintained, the head is raised to a quite horizontal position, and the posterior part of the vertex becomes immersed in the thorax, as far as the peculiar curved depression; the front wall of the depression is then exactly applied to the front margin of the thorax to which it is exactly adapted; the head has thus a power of movement of nutation extending to about half the circumference of a circle. When the head is thus replaced in its natural position, a most extraordinary peculiarity is discerned by inspection of the undersurface, where there exists, at the back of the head and front of the prosternum, a large membranous space, the posterior boundary of which is the peculiarly emarginate anterior edge of the prosternum; and it is also to be noted that this emargination is hispid, the middle (or hind portion) of the notch being very densely so, and the posterior portion of the membrane is also setose.

The prothorax is also capable of great mobility at its junction with the after body, and when it is extended completely covers the declivous space seen, in dried specimens, at the base of the wing-cases, leaving only the tip of the scutellum exposed.

When the insect is placed in the position described, the plane of the thorax is on the same horizon as that of the wing-cases, and the head is slightly higher, its mandibles are advanced in front and are directed only slightly downwards, while the large and powerful genal processes are directed vertically downwards. In this position the imbecile and apparently purposeless appearance of *Hypocephalus* as ordinarily seen has entirely disappeared,

and is replaced by a bellicose facies which could scarcely be surpassed.

The individual dissected had doubtless been picked up dead, it was not aged, that is to say the sculpture and the angles of the legs were not worn or scratched; the points of the mandibles and the genal processes were, however, somewhat worn down, and there existed on one side of the membranous cephalothoracic space a large wound, which had evidently been inflicted during life, for the wound in the membrane and in the muscular tissue surrounding it was infiltrated with the black granular substance which many entomologists must have noticed as occurring about wounds on insects, and which is no doubt similar to the exudations of serum and blood that take place in the wounds of vertebrate animals.

The muscular power of *Hypocephalus armatus* is no doubt prodigious; the enormous thorax of this individual was occupied by muscles of huge size, the pair of muscles by which the head is inflexed being specially enormous.

The dissection of this individual has convinced me that the peculiarities of this wonderful insect, as they are seen in the male, are directed to fitting the males for carrying on combats with one another of an exterminatory nature, and of a peculiar character, the point armed at in the attack being the large membranous cephalothoracic space I have above described.

This is the only vulnerable part of the body in the male, and it is to be borne in mind that it is completely protected when the head is closely contracted. I suppose that two of these males when fighting strive to seize and overturn one another; when one is reversed it will seek to inflex and contract its head, and if it can succeed in doing so and retain the contracted position by aid of the enormous muscles it possesses, it is probable that all the efforts of its adversary to complete its victory by wounding and destroying the overturned individual will be fruitless. On the other hand, no doubt the successful individual will seek to prevent its more feeble adversary from contracting its head, and if it can do this, or if it can pull it open when contracted, it will be able to inflict fatal wounds with its mandibles or genal processes, on the large, exposed, soft cephalothoracic space. I suppose the individual sent me by M. de Lacerta for dissection had been killed in this manner, or rather that it had died some time after receiving the wound I have mentioned.

Perhaps it may be permitted to record some other points observed while making this dissection and speak briefly as to the position the insect should occupy in classification.

The ligula consists of two elongate slender processes covered with hair, converging behind so as to form a V; they are similar to what exists in the genus *Dorysthenes*, but more elongate.

The prothoracic stigmata are transverse, and of rather large size, similar in position and in most respects to those of *Dorysthenes*.

The elytra are completely soldered together, and are so exactly adapted to the base of the mesonotum and to the scutellum that it is difficult to detach them. There is no trace of wings.

The metanotum is reduced to a very delicate homogeneous membrane, without structure or divisions, and similar in size and other respects to the dorsal abdominal segments. These latter are seven in number, and are merely delicate membranes, except the last one, which is between corneous and membranous in consistence.

The stigmata are small and are placed at the outermargin of the dorsal plates, the metathoracic stigma is scarcely larger than the others.

The ventral plates are very hard, but they are capable of much motion, and there is a membrane of considerable size attached to each, so as to allow the hind-body to be considerably elongated. The ventral plates are five in number. There is a small supplementary internal, apical segment, which can be extruded. The oedeagus is elongate and simple, of the ordinary tubular character found in the *Prionidæ*.

It is also worth noting, that the individual dissected had when sent some but a single antenna, which moreover become detached during the journey from Brazil to Scotland, but which I found in the box of transmission; it is very remarkable in as much as from the third joint there has preceded a supplementary antenna; this curious anomaly is articulated to the third joint — which is considerably enlarged — by a true pocket joint, and although there now exists only a single joint of the unnatural organ there have evidently been others present in addition.

In comparing the organisation of *Hypocephalus* with a Longicorn such as *Dorysthenes rostratus*, or *D. montanus*, one cannot but be impressed with the general similarity of their organisation. A similarity which is in point of fact so great, that it is certain that *Hypocephalus* must be placed near to *Dorysthenes*, and the only question that can exist is whether it is sufficiently different to be treated as a distinct family allied to the Longicorns by means of *Dorysthenes*, or merely as an abnormal member of the family *Cerambycidæ*. The latter course appears to me certainly the correct one.

The chief peculiarities of *Hypocephalus* are 1, the antennæ, 2 the peculiar cephalothoracic space, 3 the enormous and peculiar hind legs, and 4, the five-jointed tarsi.

As regards 1, the antennæ, it is to be remarked that there prevails in the Longicornus extreme variety in these organs; and the structure of the antennæ of such a *Prionid* as *Polyarthron barbatum* is far more different from that of the average *Prionidae*, than the simple structure of antenna of *Hypocephalus* is from the also very simple structure of the same part seen in *Dorysthenes montanus* ♀.

2. The cephalothoracic space is certainly only a peculiar development and extension of the membrane connecting the head and thorax in the Coleoptera generally, and though of great interest from its unknown function, can give its possessor no claim to great isolation. What the function of this space may be it would be useless to speculate on. It is probable that the membrane covering it is an organ of sensation in its posterior portion, and it is quite possible it may prove to have a sexual origin. The whole anterior margin of the prosternum is thickened and divided into a number of pits, and the large middle notch is very setose, and if it should prove that this space has a sexual sensitiveness, it would explain how it is that the males sture (as I suppose) to wound one another in this space.

3. The peculiar hind legs are quite insufficient to justify the isolation of this insect as a distinct family of Coleoptera. (I use here the ordinary language of classificis in order not to bring additional ideas into this particular discussion.) If it were so, we must make *Sagra* a family, or the *Atenchides*, or numerous other Coleoptera. Moreover the character is to a great extent merely sexual.

4. The five jointed tarsi. These are undoubtedly the greater peculiarity of *Hypocephalus* as a Longicorn; nevertheless it must be observed that in the tetramerous Coleoptera of various divisions there exist anomalous members with five jointed tarsi. Cf. *Dryophthorus* in *Curettonidae*, *Polyophitus* in *Phytophaga*, and *Parandra* and *Dorysthenes* in *Longicornus*. And in view of the point under discussion, the latter example seems to be conclusive. There exists in *Dorysthenes* at the apex of the third joint of the tarsus, not merely an exposed basal knot, but a true articulated, though minute, joint intervening between the third and the fifth joints, and it is only in the greater development of this joint that *Hypocephalus* differs, as regards the tarsal structure from *Dorysthenes*.

It is quite clear to me therefore that *Hypocephalus* should be placed as a separate member of the *Prionidae* on account of its

greatly developed hind-legs in the male, of the short antenna, and the conspicuously five-jointed tarsi.

I regret that I can not make any suggestion as to the function of the extraordinary hind legs. It is clear they do not serve for ordinary locomotion, and they are pretty certainly in walking merely dragged along the ground, the peculiar apical prolongation of the tibia preventing the pubescent apex from touching the ground, while the tarsus is turned upwards and applied to the back of the tibia in the peculiar groove provided for the purpose, so that it is out of the way and not likely to catch in surrounding objects. Whether the legs take a part in the process of copulation, or whether they assist the males in their combats — either as weapons of offence or defence. — I am quite unable to conjecture.

I expect the males of this insect are for a brief season abundant in numbers in the locality they inhabit, but probably they are chiefly nocturnal in their activities; and probably their life in the perfect state is a very short one.

If I am correct in my suppositions about this insect, those of us who are evolutionists, will have to admit that the organisation of this extraordinary creature has been evolved in correlation with its sexual combats, through a long series of ages, and there has thus resulted a most extraordinary perfection of the structures directly and indirectly connected with this object. This is so abhorrent to our moral sense that we may well feel gratified that we can also point to the fact that these structures are unique, and that out of hundreds of thousands of insects now known to us there is nothing to indicate that any other has passed through a similar evolutionary record.

M. le D^r Jacobs donne lecture des notes suivantes :

PREMIER SUPPLÉMENT

AUX TENTHRÉDINES, CÉPHIDES ET SIRICIDES

DES ENVIRONS DE BRUXELLES

par le D^r J.-C. Jacobs.

Phyllotoma Aceris Kaltenbach.

Juin, Juillet. — La larve sur l'*Acer campestre* L.

Pris en abondance par M. Mac Lachlan sur différentes espèces d'*Acer* exotiques, dans le jardin de la campagne de M. Van Volxem, à Vilvorde.

D'après les observations de notre collègue, la larve ronge la partie inférieure de la feuille, ce qui laisse des taches

sur la partie supérieure ; elle se loge dans un étui aplati formé de l'épiderme de la feuille pour le côté supérieur et de soie pour le côté inférieur. Elle fait sa métamorphose en terre.

Nematus polyspilus ♂ Foerster.

24 août : Bois de Linthout. — Collect. Wesmael ; 1 ♂.

Nematus punctifrons ♂ Th.

Boitsfort. — Collect. Cam. Van Volxem, 1 ♂.

Tenthredo livida ♂ Lin. var.

Angles du pronotum blanc sale (Klug) : Quatrième segment abdominal livide, deux petites taches blanches à la base et sur le bord du premier segment et deux plus petites sur les métapleures. Pattes intermédiaires rouge fauve, rayées de noir en dessus. *


Mai : Linthout. — Collect. Wesmael, 1 ♂.

ANOMALIES DANS LA NERVULATION DES AILES CHEZ DEUX HYMÉNOPTÈRES

par le Dr J.-C. Jacobs.

Dans la collection des Tenthredines du Musée, j'ai trouvé deux anomalies dans la nervulation des ailes, que je crois utile de signaler.

La première est une cinquième cellule cubitale dans l'aile droite, chez un *Taxonus glabratus* ♀ Lin.




a, b, c, d. Les quatre cellules cubitales ordinaires.
e. Cinquième cellule cubitale anormale.

La seconde, observée chez une *Tenthredo mandibularis* ♂, se présente aux deux ailes, mais avec certaines différences, et consiste dans une nervulation supplémentaire des cellules radiales droite et gauche, mais uniquement de la deuxième cellule radiale.


Dans l'aile droite, la cellule radiale du bout de l'aile est divisée en trois compartiments ; un est petit.

Dans l'aile gauche, outre la division en trois, il existe dans la

dernière cellule de l'extrémité de l'aile des vestiges de deux autres divisions, marquées par des nervures incomplètes.



- a, b.* Première et seconde cellules radiales normales.
1, 2. Deux cellules radiales anormales.
3, 4. Nervures incomplètes anormales.



- a.* Cellule radiale normale.
b, c, d. Cellules anormales divisant la seconde cellule radiale.

M. le Dr de Horvath adresse le travail suivant :

NOTE

SUR LES HÉMIPTÈRES DU HAUT-BALCAN ET DE LA DOBROUDJA.

Le coléoptériste hongrois M. Ed. Merkl a bien voulu me communiquer les Hémiptères recueillis pendant ses chasses faites en Orient. Il y avait aussi une petite collection dont une partie a été ramassée en 1879 dans le Haut-Balcan (Khodja-Balcan), en Bulgarie, l'autre partie en 1882, près de Tchernavoda et Kustendje, dans la Dobroudja, province récemment acquise de la Roumanie.

La faune entomologique de ces pays est encore assez peu connue pour que la plus modeste notice en soit bienvenue. Cela justifiera peut-être que je donne ici la liste de ces Hémiptères.

Sehirus luctuosus Muls. Balcan.

Tritomegas sexmaculatus Ramb. Dobroudja.

— *biguttatus* L. Balcan.

Brachypelta aterrima Forst. Balcan, Dobroudja.

Odontolarsus grammicus L. Balcan.

Psacasta exanthematica Scop. Balcan.

- Eurygaster maura* L. et var. *picta* Fabr. Balcan.
 — *hottentotta* Fabr. Fieb. Balcan.
Trigonosoma ceruginosum Cyrill. Balcan.
Podops rectidens Horv. J'ai décrit cette espèce d'après deux exemplaires, l'un reçu par M. Merkl de la Dobroudja, l'autre provenant de la Grèce. Depuis lors, j'en ai vu aussi un troisième individu de l'Attique.
Sciocoris microphthalmus Flor. Balcan.
Elia acuminata L. Balcan.
Eysarcoris melanocephalus Fabr. Balcan.
 — *inconspicuus* H.-Sch. Balcan.
Rubiconia intermedia Wolff. Balcan.
Staria lunata Hahn. Dobroudja.
Peribalus vernalis Wolff. Balcan, Dobroudja.
Carpocoris fuscispinus Boh. (*baccarum* Dall.). Balcan. Dobroudja.
Carpocoris nigricornis Fabr. Balcan, Dobroudja.
 — *melanocerus* Muls. Une femelle capturée dans le Khodja-Balcan. Espèce connue seulement des régions subalpines de la France, Suisse, Piémont, Autriche et du Caucase.
 — *lynæ* Fabr. et var. *pusio* Kolen., Balcan.
 — *lunatus* Fabr. Dobroudja.
Dolycoris baccarum L. (*verbasci* De Geer). Balcan.
Palomena prasina L. Il y a aussi, parmi les exemplaires pris dans le Balcan, une femelle de la var. *rhododactyla* Horv. (Termész. Füzet., 1883, p. 23.) Cette variété diffère du type par sa taille plus grande et plus large, le dessus du corps plus fortement ponctué, l'écusson bordé de flave au sommet, le ventre à ponctuation ferrugineuse et les deux derniers articles des antennes et les tarses d'un rouge vif.
Piezodorus incarnatus Germ. var. *alliaceus* Germ. Balcan.
Rhaphigaster grisea Fabr. Balcan, Dobroudja.
Tropicoris rufipes L. Balcan.
Strachia ornata L. var. *pectoralis* Fieb. et var. *dissimilis* Fieb. Balcan.
 — *picta* H.-Sch. et var. *cruentata* Put. Balcan.
 — *decorata* H.-Sch. Balcan, Dobroudja.
 — *oleracea* L. Balcan.
Picromerus bidens L. Balcan.
Arma custos Fabr. Balcan.
Jalla dumosa L. Balcan.
Zicrona coerulea L. Balcan.

- Acanthosoma hæmorrhoidale* L. Balcan.
Centrocoris variegatus Kolen. Balcan. Espèce distincte du
C. spiniger Fabr.
Ceraleptus gracilicornis H.-Sch. Balcan, Dobroudja.
Dasycoris denticulatus Scop. Balcan.
Syromastes marginatus L. Balcan.
Verlusia rhombea L. Balcan.
Gonocerus venator Fabr. Dobroudja.
Camptopus lateralis Germ. Balcan, Dobroudja.
Stenocephalus agilis Scop. Balcan.
— *albipes* Fabr. (*neglectus* H.-Sch.) Balcan,
Dobroudja.
Therapha Hyoscyami L. Balcan.
Corizus crassicornis L. Balcan.
— *capitatus* Fabr. Balcan.
— *conspersus* Fieb. Balcan.
— *parumpunctatus* Schill. Balcan.
Lygæus equestris L. Balcan, Dobroudja.
— *militaris* Fabr. Balcan.
— *saxatilis* Scop. Balcan.
Peritrechus gracilicornis Put. Balcan.
Microtoma carbonaria Rossi. Dobroudja.
Pachymerus phæniceus Rossi. Balcan.
— *Bardanae* Preysl. Dobroudja.
Beosus luscus Fabr. Balcan.
Aradus truncatus Fieb. Balcan. Espèce très rare, observée
jusqu'à présent seulement dans quelques localités en
France, Allemagne et Hongrie.
Monanthia Cardui L. Balcan.
Nabis lativentris Boh. Dobroudja.
Prostemma æneicolle Stein. Balcan.
— *sanguineum* Rossi. Balcan.
Coranus tuberculifer Reut. Cette espèce, de l'Asie Mineure,
décrite par M. Reuter, a une distribution géogra-
phique assez étendue, puisque je la possède aussi
du Khodja-Balcan, de la Hongrie et de la Crimée.
Reduvius annulatus L. Balcan.
— *iracundus* Poda. Balcan.
Opsicætus personatus L. Balcan.
Lycocoris campestris Fabr. Balcan.
Phytocoris Ulmi L. Fall. Balcan.
Deræocoris laniarius L. var. *danicus* Fabr. et var. *tricolor*
Fabr. Balcan.
Agalliastes pullus Reut. Balcan.

M. Léon Fairmaire adresse les deux notes suivantes :

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES NOUVEAUX DU MAROC

par M. L. Fairmaire.

Elaphocera sulcatula. — Long., 9 1/2 mill.

Ovata, postice parum ampliata, crassa, dorso parum convexa, fusco-brunnea, sat nitida, pilis pallido-fulvis ciliata, pectore dense vestito, prothorace pilis sparsuto, sed margine postico medio dense villosa; capite subquadrato, angulis anticis rotundatis, margine antico medio sinuato, ruguloso-punctato, inter oculos asperato; antennis concoloribus, clava obscure picea, arcuata, 7-foliata, folio 1^o breviora, funiculi articulo 3^o elongato, leviter arcuato, inermi, palpis maxillaribus piceis, articulo ultimo piceo; prothorace elytris haud angustiora longitudine duplo latiora, lateribus fortiter rotundato, antice angustiora, margine postico utrinque obsolete sinuato et depresso, angulis rotundatis, dorso parum dense sat fortiter punctato, antice densius, lateribus longe ciliato, disco stria longitudinali sat tenui, medio interrupta signato; scutello ogivali, parce punctato; elytris medio ampliatis, apice fortiter rotundatis, dorso profunde striatis, striis vix punctulatis, alternatim approximatis, extus obsoletis, intervallis alutaceis, parum dense punctatis, spatio externo irregulariter punctato, picescente, angulo suturali obtuse rotundato; pygidio parum fortiter sat dense punctato, propygidio fortius laxa punctato; subtus subtiliter dense punctulata, subopaca, abdomine fortiter punctato; tibiis anticis extus tridentatis, dente 1^o obtuso, ceteris validis; unguibus piceis.

Bien distincte de toutes les espèces décrites par ses élytres profondément striées sur la partie dorsale; le bord antérieur du chaperon est assez fortement sinué, la 1^{re} lamelle de la massue antennaire est très courte et la 2^e est un peu moins longue que les autres.

Ancylochira corpulenta. — Long., 17 mill.

Oblonga, convexa, atro-cyanescens, capite vitta intraoculari, summo intus angulata, inter antennas macula triangulari antice triloba, mandibularum basi, prothorace vitta antica et vitta utrinque laterali sat lata cum precedenti conjuncta, basi maculis 2 transversis, elytris macula basali, ante medium vitta transversa ad humeros et marginem externum prolongata, vitta post medium transversa, marginem attingentes maculaque magna anteapicali flavis, subtus flava, prosterno vitta pleurali stria media et utrinque lineis 2 nigro-cyaneis, suturis pectoralibus nigro-cyaneo marginatis, segmentis abdominalibus anguste nigro-cyaneo apice

marginatis, linea medio et maculis lateralibus et segmenti ultimi apice nigro-cyaneis; capite dense punctato, aequali, prothorace dense sat fortiter punctato; scutello truncato, polito; elytris punctato-striatis, punctis sat subtilibus, intervallis rarius punctulatis, apice sinuato-truncato, angulo externo sat acuto, suturali minus acuto; prosterno sat laxo punctato, medio stria longitudinali impresso. — Maroc.

Ressemble beaucoup à l'*A. octoguttata*, var. *magica*; en diffère par la forme plus robuste, plus convexe, un peu plus atténuée en arrière, la bande intra-oculaire plus prolongée et coudée au sommet, une tache triangulaire entre les antennes, le corselet ayant au milieu de la base un point enfoncé avec une courte strie, l'écusson plus tronqué, et surtout par le prosternum à ponctuation moins forte, beaucoup moins serrée, la partie médiane plus triangulaire, n'ayant au milieu qu'une strie longitudinale; le métasternum est moins ponctué, la saillie intercoxale plus aiguë; les fémurs postérieurs, outre la bande jaune interne, ont en dessus une bande jaune.

Cebrio Favieri. — Long., 14 mill.

Oblongus, convexus, testaceo-rufus, sat nitidus, fulvo-pubescent, capite, metasterno et prosterni medio fusco-nigris, antennis supra obscuris, prothorace basi transversim fusco, scutello fusco, medio rufo, tibiis basi late infuscatis; capite magno, fortiter sat dense punctato, antice late arcuatim impresso, margine antico fere recto, sat acuto; antennis validiusculis, medium corporis vix attingentibus, articulis 2^o, 3^oque parvis æqualibus, sequentibus oblongo-triangularibus, sat fortiter intus angulatis, ultimo distincte appendiculato, acuto; prothorace elytris parum angustiore, longitudine fere duplo latiore, antice vix angustato, lateribus parum arcuatis, margine antico arcuato, angulis rotundatis, basi utrinque valde declivi impresso, angulis gracilibus, oblique productis, dorso fortiter dense punctato, costula media laevi, antice abbreviata; scutello truncato, paulo concavo, punctato; elytris a medio attenuatis, fortiter sat dense punctatis, striatis, intervallis convexiusculis; subtus rugulosus, fulvo-villosus, tibiis extus rugosis, fere crenulatis.

Assez voisin du *crassus* par sa grosse tête, mais très différent, outre la taille et la coloration, par l'impression antérieure de la tête en forme de fer à cheval, les articles des antennes triangulaires, moins larges, le corselet à bord antérieur moins arrondi, à angles postérieurs plus grêles et plus détachés par une faible sinuosité des bords latéraux, l'écusson presque carré, tronqué, et les élytres plus rétrécies en arrière avec les stries plus fortes.

Phlœophilus flavopictus. — Long., 3 1/2 mill.

Oblongus, convexus, brunneus, nitidus, breviter fulvo-sericans,

capite antice, antennarum basi, prothoracis lateribus et margine angustissimo basali fulvo-testaceis, elytris maculis et fasciis fulvo-testaceis ornatis; dense punctatus, prothorace paulo densius ac minus fortiter punctato, lateribus rotundato, postice utrinque foveolato; subtus fuscus, pedibus testaceis. — Maroc.

Ressemble au *P. Edwardsi*, mais plus grand, plus convexe, d'un brun foncé, avec les élytres ayant de chaque côté une petite tache ronde près de l'écusson, une plus grande à l'épaule, avant le milieu une fascie qui est angulée, en rejoignant celle de l'autre côté sur la suture, 2 taches en dehors sur le bord, contiguës, et après le milieu une grande fascie un peu arquée et dentée, d'un roux testacé; les côtés du corselet sont roux et la pubescence est bien plus courte; le corps est plus convexe, l'écusson est bien moins court, presque pentagonal; le corselet est plus arrondi aux angles postérieurs.

Rhagonycha croceipennis. — Long., 8 mill.

Subparallela, nigra, parum nitida, subtilissime cinereo-pubescent, elytris testaceo-flavis; capite alutaceo-sericeo, infra antennas utrinque sat fortiter impresso; antennis corpore paulo brevioribus, fusco-fuliginosis, articulo 1^o nigro, 2^o tertio vix dimidio brevior; prothorace elytris sensim angustiore, subquadrato, longitudine vix latiore, antice vix perspicue attenuato, dorso sat convexo, antice ad latera sat fortiter oblonge impresso, disco medio longitudinaliter breviter impresso, margine postico sat elevato, medio arcuato, angulis posticis obtusis; scutello triangulari, apice truncato; elytris elongatis, medio vix sensim ampliatis, apice fere truncatis, angulo externo rotundato, subtiliter densissime ruguloso-punctulatis, sutura angusta et utrinque lineis 2 vel 3 subtiliter elevatis; subtus subtiliter dense cinereo-pubescent; abdominis segmento 6^o apice late sinuato.

Cette espèce paraît voisine de *R. nigricollis*, mais elle est notablement plus grande, les pattes et les antennes sont entièrement noires et le 2^e article de ces dernières est presque de moitié plus court que le 3^e; le corselet est aussi large en avant qu'en arrière, avec les angles antérieurs arrondis et une fossette oblongue presque au milieu du dos, non près de l'écusson où le bord postérieur est fortement relevé; les antennes aussi sont plus longues.

Arthrodeis opaculus. — Long., 7 1/2 à 10 mill.

Ovatus, postice attenuatus, valde convexus, ater, modice nitidus, elytris fere opacis; capite subtiliter punctulato, medio interdum puncto grosso impresso, inter oculos carina transversim elevata signato; antennis brevibus, medium prothoracis vix attingentibus, articulo 9^o latiore, 10^o majore, 11^{um} amplexante, 3^o duobus

sequentibus conjunctis fere æquali; prothorace elytris haud angustiore, antice angustato, lateribus a basi antice arcuatis, margine postico fere recto, ante angulos leviter sinuato, his rectis, margine antico profunde emarginato et dense breviter fulvo-ciliato, dorso subtilissime parum dense punctulato; elytris basi truncatis, ante medium postice attenuatis, apice obtusis et valde declivibus, dense subtiliter sat dense punctato-asperulis, postice fortius; subtus cum pedibus nitidus prosterno lateribus sat profunde striolato, inter coxas fere levi, lato, truncato, mesosterno medio toto, metasterno et abdominis segmento 1^o basi breviter striolatis; elytrorum margine reflexo paulo nitido; tibiis anticis extus valde bidentatis. — Larache.

Ressemble beaucoup à l'*occidentalis*, mais plus oblong, moins brillant, avec le corselet à côtés plus largement arrondis et les élytres à ponctuation plus serrée, râpeuse, plus forte en arrière; les côtés du prosternum, la base du metasternum et du 1^{er} segment de l'abdomen sont un peu plus fortement striolés. Voisin également de l'*Perodioides*, mais moins gibbeux, plus atténué en arrière, à ponctuation plus râpeuse; la carène transversale du chaperon est plus relevée et moins arquée.

Micrositus decurtatus. — Long., 8 à 9 mill.

Ovatus, convexus, postice vix ampliatus, niger, parum nitidus; capite prothoraceque densissime sat tenuiter punctatis, illo antice emarginato, ad oculos plicatulo, hoc elytris vix sensim angustiore, longitudine duplo latiore, antice angustato, lateribus a medio antice rotundatis, basi ante angulos leviter sinuato et tenuiter marginato, angulis obtusis; elytris brevibus, substriato-punctatis, intervallis planis, postice tantum leviter convexis, subtiliter coriaceis; subtus paulo nitidior, sat subtiliter dense punctatus, abdomen subtiliter strigosulo. — Maroc.

Voisin du *M. tumidus* d'Algérie, mais notablement plus petit, un peu moins court et un peu plus atténué en avant; la ponctuation du corselet et de la tête est un peu plus fine et un peu plus serrée, cette dernière ne présente qu'une trace à peine distincte de l'impression transversale; les derniers articles des antennes sont plus larges, tout à fait transversaux, les côtés du corselet tombent moins carrément sur la base, l'écusson est densément ponctué, les élytres ne sont pas granuleuses, leur bord externe est légèrement rentrant aux épaules, leur base est largement, mais faiblement sinuée, les stries sont à peine marquées, mais densément ponctuées et les intervalles ne sont un peu relevés que tout à fait en arrière; enfin les tibias antérieurs ne sont pas dentés au milieu de leur bord externe.

Cathormiocerus tenuiscapus. — — Long., 3 mill.

Sat breviter ovatus, convexus, fuscus, squamulis brunneis et cinereis dense vestitus, ad prothoracis latera densius cinereus; capite rostroque rugose punctatis, hoc medio sulcato; antennis piccis, scapo vix arcuato, basi tenui, apicem versus incrassato, marginem prothoracis paulo superante, funiculi articulis 2 primis longioribus, 1^o obconico, apice crasso, 2^o basi gracili, sequentibus brevibus, obconicis, setulosis, clava ovata, apice acuminata, cinereo-pubescente; prothorace elytris medio fere dimidio angustiore, antice angustato, lateribus valde rotundatis, dense sat fortiter punctato, fere rugoso; elytris breviter ovalis, basi truncatis, apice obtusis, ad humeros rotundatis, sat tenuiter punctato-striatis, striis 2 primis basi suturam versus arcuatis, intervallis planis, sutura postice paulo elevata; femoribus clavatis. — Maroc.

DIAGNOSES DE COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE

(Suite)

par M. Léon Fairmaire.

Hectarthrum modestum. — Long., 8 mill.

Elongatum, nigrum, nitidum, capite summo profunde arcuatim sulcato et medio longitudinaliter profunde bisulcato, clypeo longitudinaliter quadruplicato, antennis validis, medium corporis attingentibus, articulo ultimo longiore, breviter et obtuse cultriformi, prothorace basi angustato, utrinque striapostice abbreviata signato, elytris ad suturam profunde sulcatis, utrinque striis 2 approximatis, ante apicem abbreviatis. — Guélidi.

Scarabæus lævifrons. — Long., 11 à 12 mill.

Niger, valde nitidus; capite antice dense strigoso-punctato et sexdentato, summo medio levi, utrinque depresso, fortiter punctato et fulvo-villoso, prothorace lateribus fortiter rotundato, crenulato, dorso punctis grossis valde distantibus impresso, elytris paulo minus nitidis, vage senescentibus, tenuiter punctato-substriatis, stria suturali profundiore, intervallis levibus, tibiis anterioribus fortiter 4-dentatis, tibiis omnibus villosis. — Makdischu.

S. planifrons. — Long., 12 mill.

Niger, valde nitidus, capite antice strigoso-punctato, sexdentato, dentibus 2 medianis paulo longioribus, summo levi, ad oculos parce punctato, prothorace lateribus fere angulatim rotundato et basi paulo crenulato, dorso laxo punctato, elytris levibus obsoletissime striatis, tibiis vix villosis, anterioribus quadridentatis — Makdischu.

Très voisin du *parumpunctatus*, d'Égypte et de Syrie, mais

beaucoup plus petit, avec le corselet non impressionné, à points assez fins très écartés, à côtés à peine crénelés à la base et les élytres à stries à peine marquées, mais distinctes.

Epirinus tuberifrons. — Long., 11 mill.

Breviterovatus, valde convexus, parum nitidus, subtus cum pedibus nitidior, capite lato, antice medio leviter emarginato et obtuse bidentato, dense tenuiter coriaceo-ruguloso, fronte tuberculo medio signata, prothorace elytris fere latiore, subtiliter dense coriaceo-rugosulo, elytris lævibus, striis vix impressis, paulo nitidioribus. — Makdischu.

Onthophagus aurifrons. — Long., 12 mill.

Ovatus sat convexus, fusco-niger, nitidus, capite medio aureo, elytris utrinque maculis 2 flavis, 1^a marginali ante medium, 2^a prope suturam ante apicem, capite dense asperato, antice lobato-producto et recurvo, vertice late laminato, lamina fissa et apice bifida, ramis antice reclinatis et intus breviter unispinosus, elytris indistincte striatis, basi ante humeros transversim impressis. — Makdischu.

O. ditissimus. — Long., 10 1/2 mill.

Præcedenti forma et capitis structura simillimus, sed totus metallico-cupreus, nitidus, elytris maculis marginali media et ante-apicali flavo-aureis signatis, capite cupreo-aurato, antice et ad laminæ apicem nigricante, densius asperato et sat dense pubescente-hirto, elytris basi haud impressis. — Makdischu.

Les taches des élytres sont à peine distinctes, les côtés du corselet sont plus droits, avec les angles antérieurs plus arrondis, et les élytres sont plus courtes. Ces deux espèces sont voisines des *O. Dregei* et *Wittei* Har.

Homaloplia irideomicans. — Long., 6 mill.

Ovata, convexa, fusco-nigra, nitida, elytris leviter irideo-micantibus, rufo-ciliata, capite dense punctato, margine antico reflexo, medio sinuato, prothorace brevi, antice a basi angustato, subtiliter punctato, elytris apice abrupte rotundatis, leviter striatis, striis irregulariter punctulatis, intervallis convexiusculis parce punctatis; subtus, pedibus exceptis, minus nitida, magis fusca, setulis rufis sparsuta. — Makdischu.

Schizonycha variolicollis. — Long., 13 mill.

Oblonga, subcylindrica, rufo-picea, nitida, capite fortiter laxè punctato, antice arcuato et carina arcuata signato, prothorace elytris haud angustiore, lateribus crenulato, punctis grossis (antice densioribus) laxè impresso, basi utrinque transversim elevato et lævi, elytris sat grosse aspero-punctatis, pygidio fere lævi, anten-

nis piceis, tarsis posterioribus articulo 1^o secundo paulo brevior, unguibus æqualiter fassis. — Makdischu.

Voisin de *S. crenata*, mais beaucoup plus petit, à tête non rugueuse, n'ayant que de gros points épars, non carénée au sommet, avec l'écusson plus ponctué et le pygidium presque lisse.

Clinteria Revoili. — Long., 17 mill.

Ovata, nigro-velutina, opaca, prothorace macula magna laterali rubra, puncto nigro signata, elytris macula marginali media, intus angustata, nivea; capite dense subtiliter punctato, utrinque longitudinaliter impresso, antice emarginato, prothorace antice a medio valde angustato, elytris leviter attenuatis, punctis arcuatis seriatim signatis, pygidio et ano rufis. — Makdischu.

Ressemble extrêmement à la *Glycyphana tricolor*, des Indes orientales, mais la base du corselet recouvre l'écusson, et la bande rouge qui entoure le corselet est réduite à une simple tache latérale.

Agrypnus gutturosus. — Long., 43 mill.

Oblongo-elongatus, convexus, fusco-niger, modice nitidus, subtilus nitidior, capite punctato, late impresso, prothorace valde convexo, sat dense punctato, linea longitudinali tenui lævi, carina laterali antice abbreviata, scutello lato, dense punctato, elytris apice acutis, punctato-substriatis, striis apice elevatis, intervallis paulo convexusculis, subtiliter dense punctulatis, subtilus dense punctatus, prosterno medio inflato. — Makdischu.

Forme anormale dans ce genre, rappelant plutôt quelques *Adelocera* de Madagascar; insecte remarquable par la convexité du corselet et le renflement du prosternum.

Arthrodeis laxepunctatus. — Long., 18 mill.

Sat breviter ovatus, fere gibboso-convexus, niger, vix nitidulus, capite fere lævi, antice et ad latera plicatulo-punctato, prothorace lato, laxè sat tenuiter punctato, elytris post medium attenuatis, parce punctatis, postice densius et fere rugosulis, subtilus lævis, tibiis anticis bidentatis. — Makdischu.

A. nitdiventris. — Long., 10 mill.

Ovatus, postice parum angustior, valde convexus, niger, nitidus, capite sat dense punctato, antice fere rugoso, prothorace fere a basi attenuato, angulis anticis acutis, disco laxè punctulato, vitta longitudinali lævi, elytris post medium angustatis, parum dense punctatis, postice densius aspero-punctatis, subtilus lævis, segmentis 2 primis abdominalibus basi crenatis. — Makdischu.

A. ruguliventris. — Long., 9 1/2 mill.

Præcedenti affinis, sed capite dense ruguloso-punctato, protho-

race subtilius punctulato, elytris sat dense asperulis, postice fortius, et metasterno abdomineque dense subtiliter asperatis, subopacis distinctus. — Makdischu.

Chez ces trois espèces, le chaperon n'a pas de carène transversale.

Platynotus platessa. — Long., 12 mill.

Late ovatus, parum convexus, niger, nitidus, capite antice sat fortiter emarginato, antennis articulis 3-6 elongatis, 7° brevior, ceteris transversis, prothorace lato, basi bisinuato, angulis posticis paulo retroversis, dorso ante basin et lateribus impresso, elytris grosse substriato-punctatis, intervallis sat convexis, epipleuris latissimis, prosterno angulatim producto, tarsis sat angustis. — Makdischu.

Hoplonyx impuncticollis. — Long., 16 mill.

Oblongus, convexus, ater, valde opacus, pedibus paulo nitidioribus, punctatis, capite inter oculos subtiliter punctato et obsolete striato; prothorace lato, ante angulos anticos tantum angustato, impunctato, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, scutello triangulari, elytris punctato-striatis, striis parum profundis, intervallis convexiusculis, subtus lævis. — Guéliidi.

Diffère du *carbonarius* par le corps plus aplani en dessus, la tête à peine ponctuée, le corselet plus large, à côtés droits, à surface imponctuée et l'écusson triangulaire.

Cantharis validicornis. — Long., 22 mill.

Oblonga, convexa, fusco-nigra, subopaca, capite prothoraceque densissime subtiliter punctato-rugosulis, illo prothorace latiore, antennis validis, medium corporis haud attingentibus apicem versus compressis, prothorace lateribus parallelis, antice tantum arcuatis, stria media longitudinali tenuiter impressa, elytris subtilius densissime punctulatis. — Guéliidi.

Espèce remarquable par ses antennes courtes et épaisses.

Anoplostetha Pauli. — Long., 23 mill.

Fusca, pube densissima cervina vestita, capite pallidiore, fere albicante, prothorace utrinque macula magna, elytris utrinque maculis 3 magnis, pectore abdomineque maculis magnis lateralibus lacteis, angustissime fusco-marginatis. — Makdischu.

A. lactator affinis, sed prothorace macula unica laterali, elytris basi haud granatis, maculisque lacteis distincta.

Sagra longefemorata. — Long., 16 mill.

♂. Elongata, modice convexa, obscure cyanea, modice nitida, antennis pedibusque 4 anticis magis cyaneis et nitidioribus, prothorace latitudine longiore, antice utrinque valde angulato, late-

ribus fere parallelis, elytris ad humeros leviter impressis, subtiliter punctato-lineatis, lineis apice et extus evanescentibus; femoribus posticis longissimis, basi intus plaga dense fulvo-villosa, subtus ante apicem dente valido armatis, femoribus intermediis subtus dente lato obtuso munitis. — Zanzibar.

Voisine de la *tristis*, mais à corselet avec les côtés presque parallèles et les élytres non rugueuses à la base.

Plagioder a apicata. — Long., 7 1/2 mill.

Ovata, valde convexa, nigro-fusca, nitida, capite, prothoracis lateribus, elytrorum macula apicali minuta et corpore subtus obscure rufis, capite parum dense punctato, inter antennis impressiusculo, his brevibus, apice crassatis, basi obscure rufis, prothorace elytris angustiore, parum dense punctato, scutello lævi, elytris breviter ovatis, basi truncatis, parum dense punctatis, subtus fere lævis, pedibus punctatis. — Guélidi.

MOMBASA n. g.

Ce nouveau genre appartient au groupe des Galérucites par son repli épipleural prolongé au delà du milieu, ses cavités cotyloïdes fermées et ses crochets tarsiens fendus; les troisième et quatrième articles des antennes sont égaux, la tête est presque aussi large que le corselet, ce qui rapprocherait ce genre des *Baphonida*; il diffère de tous ceux du même groupe par le corselet, armé au milieu de chaque côté d'une forte dent assez pointue; les élytres sont assez courtes, les pattes assez robustes, et le premier article des tarses postérieurs est presque aussi grand que les deux suivants réunis.

M. armicollis. — Long., 9 1/5 mill.

Oblonga, convexa, virescenti-cyanescens, modice nitida, fulvo-sericans, capite summo et antice, prothoracis basi et apice, elytrorum sutura apiceque rufo-castanescens, subtus picea, pedibus fuscis, antennis sat validis, fuscis, medium corporis longe superantibus, corpore supra dense subtiliter punctato.

M. de Borre fait la communication suivante :

Ayant récemment revu et reclassé, suivant le dernier travail de notre savant collègue, M. Ch. Oberthur (*Études entomologiques*, IV), les Papilionides du Musée Royal de Belgique, j'y ai constaté la présence d'exemplaires-types des descriptions de six des espèces malaises créées par le Dr Boisduval, dans le tome I du *Species général des Lépidoptères* (Suites à Buffon, Roret). Ce sont les :

Papilio Priapus (p. 190), *P. Lampsacus* (p. 190), *P. Ascalaphus*

(p. 200), *P. Androcles* (p. 249), *P. Deucalion* (p. 375) et *P. Encelades* (p. 376).

À l'époque où Boisduval les décrivit (1836), ces exemplaires faisaient partie de la collection Payen, et c'est en passant par la collection Robyns qu'ils sont arrivés dans celle du Musée Royal.

Naturellement, ces exemplaires ne sont plus d'une fraîcheur irréprochable; c'est le sort inévitable des Lépidoptères qui ont voyagé de collection en collection.

J'avais songé un instant à vous donner la liste des Papilionides du Musée Royal (216 espèces et variétés), mais notre Société étant actuellement largement pourvue de matériaux de publication, j'ai préféré ajourner ce travail à l'époque où des accroissements de la collection auront nécessité une nouvelle revision (1).

Je me bornerai donc à vous énumérer les espèces les plus rares ou les plus intéressantes qui s'y trouvent, indépendamment des types mentionnés plus haut :

Le *Teinopalpus imperialis* Hope, les *Papilio Semperi* Felder, *Astorion* Westw. ♀ (= *Chara* Westw.), *Areturus* Westw., *Mariar* Semp., *Neptunus* Guérin-Mén., *Antonio* Hew., *Bromius* Doubl., *Cyrnus* Bdv., *Payeni* Bdv. ♂ et ♀ (2), *Ctesias* Feld., *Marchandi* Bdv., *Phryneus* Lucas, *Theramenes* Feld., *Polyzelus* Feld., *Erlaces* Gray, *Triopas* God., *Madyes* Doubl. (plusieurs exemplaires envoyés du Pérou par feu le baron Popelaire de Terloo), *Zugreus* Doubl., *Paradoxa* Zinken, *Caunus* Westw.

Plusieurs espèces qui ont été décrites vers 1865, par Felder, dans le Voyage de la Novara, existaient inédites depuis de longues années dans la collection du Musée : *Ctesias* Feld. = *Lacordairei* Belval in sched.; *Polyzelus* Feld. = *Candezei* Belval in sched.

M. Lethierry envoie la note suivante :

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX POUR LA FAUNE BELGE.

HÉTÉROPTÈRES :

***Plinthisus bidentulus* H.-Schæffer. — Tilff (Maréchal).**

C'est la forme macroptère du *Plinthisus brevipennis* Latr., commun en Belgique et dans le nord de la France.

(1) Si ce travail était fait synoptiquement avec une revision des belles collections particulières de nos collègues, MM. Capronnier, Lamarche et Lallemant, il n'en aurait que plus d'intérêt pour la science.

(2) J'avais d'abord cru que l'un de ces exemplaires était aussi un type de Boisduval. Mais il était étiqueté : « Coll. Du Bus » et rien n'indique qu'il ait appartenu à la collection Payen, où se trouvait le type décrit. Une erreur d'étiquetage n'est cependant pas impossible. L'autre sexe avait jusqu'alors figuré à tort dans la collection sous le nom de *Pap. Evan* Doubleday.

Rhynocoris iracundus Scopoli. — Comblain-au-Pont (H. Donckier).

N'a pas encore été rencontré dans le département du Nord. Capture très intéressante.

HOMOPTÈRES :

Cixius pinicola Dufour. — Rouge-Cloître (Delecolle); bois d'Hollebeke, près d'Ypres, sur les pins. (Lethierry.)

Stiroma affinis Fieber. — Tilff (Maréchal).

Cette espèce est commune dans le département du Nord, dans les marais et les bois humides.

Thamnotettix abietina Fallen. — Hockai. (H. Donckier.)

N'a pas encore été rencontrée dans le département du Nord.

Aphalara picta Zetterstedt. — Hermeton. (Naturalistes Dinantais.)

Déjà citée comme ayant été prise à Rodenhof (Luxembourg) par M. Van Volxem.

M. de Bormans a adressé au Secrétaire la lettre suivante :

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les remarques suivantes que m'a suggérées la lecture du dernier volume des *Annales de la Société entomologique de Belgique* :

1^{re} Page 185. Duvivier, Énumération des Staphylinides, etc.

Genre *Cylindrogaster* Fauvel (1870); fait double emploi avec le genre *Cylindrogaster* Stål, Oefv. K. Vet. Akad. Förh., p. 350 (1855), Orthoptères, famille des Forficulaires.

2^o Page 47. Fairmaire. Essai sur les Coléoptères de l'Archipel de la Nouvelle-Bretagne.

Genre *Sphingnotus* (créé à quelle époque?); fait double emploi avec le genre *Sphingnotus* Fieber, Synopsis der Europäischen Orthopteren (1853), Orthoptères, famille des Acridiodées.

M. de Borre fait ensuite la communication suivante :

Dans ma note sur les Glomérider de Belgique (Compte-rendu de janvier 1884), en signalant la capture d'un exemplaire du *Glomeris oratogottata* dans la province de Liège, j'ai dit que cette espèce de Koch n'avait encore été signalée qu'aux environs de Berlin. Depuis, j'ai trouvé qu'elle avait aussi été indiquée dans le canton des Grisons par M. le Dr Am Stein (*Jahresb. d. Gesellsch. Graubündens*, 1855, p. 132). Elle existe encore probablement dans plus d'une autre contrée, mais quand il s'agit d'animaux aussi peu col-

lectionnés des amateurs que les Myriapodes, les données nécessaires pour établir leur distribution géographique sont toujours d'une rareté désolante.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion du mois d'avril.

L'assemblée décide d'abord que la date en sera reportée au 3^e dimanche d'avril (20), le 2^e dimanche étant le jour de Pâques.


Sur la proposition de M. de Borre, qui guidera l'excursion, la localité choisie est **l'extrémité septentrionale de la forêt de la Houssière**. Départ de Bruxelles (Midi) pour Hennuyères par le train de 6 h. 52 m. du matin.

M. le Dr Jacobs demande la parole pour entretenir l'assemblée de la discussion qui vient d'avoir lieu à la Chambre des représentants, relativement aux allocations du budget de l'intérieur concernant les lettres, sciences et beaux-arts. Il semblerait résulter de cette discussion que le gouvernement manifesterait l'intention de réduire et même de supprimer plus tard tout subside accordé aux sociétés scientifiques. M. Jacobs donne lecture, d'après les *Annales parlementaires*, du discours que M. le représentant Bergé, de l'arrondissement de Bruxelles, a prononcé pour la défense des intérêts des sociétés scientifiques. Il espère que ces paroles seront comprises et que l'opinion publique s'opposera à la réalisation de mesures aussi désastreuses pour la science.

M. de Selys-Longchamps pense qu'il ne sera pas difficile de faire comprendre au gouvernement le rôle considérable et nécessaire que jouent dans la science les sociétés, les services qu'elles rendent au pays et la haute réputation qu'elles lui font à l'étranger. Il appuie la proposition de M. Jacobs, d'adresser une lettre de remerciements à M. le représentant Bergé, au nom de notre Société.

L'assemblée acclame cette proposition.

La séance est levée à neuf heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 44.

Assemblée mensuelle du 5 avril 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Arnold, Bergé, De Glain, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, De Raeck, H. Donckier de Donceel, Du Pré, Duvier, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lameere, L'Arbalestrier, Remy, Richard, Roelofs, Vandervelde, Van Rossen, Van Segvelt, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

M. Van Nerom a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 1^{er} mars est approuvé, sous réserve de deux rectifications demandées par M. le Dr Heylaerts (voir plus loin une communication de ce membre).

Correspondance.

M. L'Arbalestrier remercie pour son admission comme membre effectif et M. S. Putzeys, pour son admission comme associé.

M. le Ministre de l'Intérieur nous annonce l'allocation d'un subside de mille francs pour nous aider à continuer nos publications. Mais la dépêche ajoute : « Je regrette de devoir vous faire connaître, Messieurs, qu'en présence de la situation du crédit des Lettres et des Sciences, il ne sera plus possible de renouveler cette allocation; mon département devra se borner, à l'avenir, à souscrire à trente exemplaires de vos Annales. »

Cette décision réduirait de mille francs à quatre cent cinquante francs l'intervention annuelle du Département de l'Intérieur dans nos publications.

M. de Selys-Longchamps prend la parole pour donner de nouveau

L'espoir que cette décision pourra être rapportée avant que la Législature vote les budgets de 1885.

M. le Représentant Bergé répond en ces termes à la lettre de remerciements qui lui avait été adressée par la Société :

« Messieurs, j'ai été très sensible à votre lettre de remerciements relative aux paroles que j'ai prononcées à la Chambre des Représentants en faveur des sociétés scientifiques du pays. Mais, si on veut aboutir à une bonne solution, il faut faire des efforts énergiques contre la mesure que le Gouvernement veut mettre à exécution.... Je suis entièrement à votre disposition, très heureux d'avoir à défendre une cause comme la vôtre. »

Le Secrétaire a encore reçu les réclamations suivantes, relatives aux publications égarées par la Poste et à propos desquelles il est informé que le Département des Travaux publics fait une enquête.

Notre collègue M. Puls, de Gand, nous écrit n'avoir pas reçu le Tome XXVI des Annales.

M. Ern. Olivier, aux Ramillons (Allier), n'a pas reçu le Comptendu d'avril 1883.

M. Ch. Brongniart, à Paris, n'a pas reçu les nos 33, 34 et 40.

M. le Dr Hagen, à Cambridge, n'a pas reçu les nos 26, 30 et 33.

La Société Espagnole d'Histoire naturelle n'a pas reçu le Tome XXV des Annales.

M. A. Fauvel (rue d'Auge, 16, à Caen, Calvados) écrit la lettre suivante : « Après dix ans de recherches infructueuses, je viens enfin d'obtenir quelques individus de la rarissime variété *cupreonitens* du *Carabus auronitens*. Vous connaissez sans doute cette variété, plus curieuse encore que le *Putzeyi*, puisque le changement de couleur affecte à la fois la tête, le corselet et les élytres. Je prends donc la liberté de vous offrir deux ou quatre exemplaires de cette variété en échange d'autant de la variété *Putzeyi*. Si vous n'êtes pas disposé à profiter vous-même de mon offre, je vous serais obligé d'en faire part à ceux de vos collègues de la Société entomologique belge qui ont le *Putzeyi* en double et manquant du *cupreonitens*... »

M. L. Fairmaire désirerait obtenir deux ou trois exemplaires de la *Cicindela maritima* de Calmthout.

L'Académie Royale *dei Lincei*, à Rome, nous annonce la mort de son Président, Quintino Sella, homme d'État et savant éminent, dont la perte est déplorée par toute la science en Italie.

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique nous transmet le programme des questions mises au concours par la Classe des sciences. Aucune ne se rapporte à l'entomologie.

L'Académie des Sciences de Lisbonne, le Musée de Gènes, le Geological Survey des États-Unis et les éditeurs de la revue *Science*, à Cambridge, nous remercient pour l'envoi de nos publications.

La Société Royale des Sciences de Saxe et la Société de Physique et de Médecine d'Erlangen nous adressent leurs publications.

L'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam et la Société des Naturalistes de Brûnn nous envoient leurs publications en nous accusant réception des nôtres.

L'Université Royale de Norvège, à Christiania, en nous accusant réception de nos Annales, nous indique la direction à donner aux publications qui lui sont destinées.

La Société Entomologique Néerlandaise demande que les publications soient dorénavant expédiées directement à l'adresse de son bibliothécaire, M. C. Ritsema, Rapenburg, 94, à Leyde.

M. le Dr G. de Horvath, l'un de nos membres, nous fait hommage des trois premières livraisons d'un journal entomologique en langue hongroise, dont il vient d'entreprendre la publication. — Remerciements.

L'assemblée décide que nos Comptes-rendus seront adressés à titre d'échange à la Société de Microscopie de Hanovre.

Sur la demande qui en est faite par la Société Linnéenne du Nord de la France, ils seront aussi envoyés chaque mois à cette Société.

M. Manceaux, libraire, demande si la Société ne serait pas disposée à accorder une remise aux libraires qui prennent des abonnements aux Comptes-rendus. — Après discussion et sous réserve de confirmation par la prochaine assemblée générale, il est décidé que pour six abonnements pris par un libraire, le prix sera celui de cinq abonnements.

M. Laroche, coloriste enlumineur, rue Ransfort, 22, à Molenbeek, se recommande à la Société et à ses membres. Le Secrétaire fait voir deux planches de nos Annales qu'il a coloriées comme spécimen.

La Société a reçu un numéro du *Mesos* et un catalogue de coléoptères siciliens à vendre chez M. Failla-Tedaldi.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu le rapport de MM. Capronnier et de Borre, l'assemblée vote l'impression aux Annales de la *Révision des Diptax palæarctiques*, par M. de Selys-Longchamps.

M. de Borre dépose un manuscrit ayant pour titre : *Tentamen Catalogi Lyxosetalarum, Julidarum, Archiatularum, Polyzonitarum atque Siphonularum hucusque descriptarum*. — MM. Plateau et MacLeod sont désignés comme rapporteurs.

M. Kerremans présente un travail ayant pour titre : *Énumération des Buprestides décrits postérieurement au Catalogue de MM. Gemminger et de Harold, 1870-1883.* — Rapporteurs : MM. Candèze et Roelofs.

M. Duvivier demande la parole pour lire le travail suivant :

DESCRIPTIONS DE QUELQUES PHYTOPHAGES NOUVEAUX.

M. de Borre ayant eu l'obligeance de me permettre d'examiner les *Oïdes* du Musée Royal de Bruxelles, j'ai trouvé parmi ces insectes quelques espèces (provenant des chasses du Dr Semper aux Iles Philippines), que feu le Dr Chapuis avait considérées comme inédites, et nommées. Je donne ici les descriptions de ces espèces, en leur conservant le nom donné par notre regretté collègue.

Oïdes sexvittata n. sp.

Largement ovulaire, convexe, d'un fauve pâle avec l'extrémité des mandibules, les yeux et trois larges bandes longitudinales sur chaque élytre, noirs; les élytres profondément et densément ponctuées. — Long., 9 mill.

Australie. (Ma collection.)

Corps largement ovulaire, assez convexe, d'un fauve pâle. Palpes et mandibules d'un testacé pâle, sauf l'extrémité de ces dernières, qui est noire; labre testacé, marqué d'une large et profonde impression; yeux noirâtres, ovulaires, modérément saillants; antennes filiformes, testacées, sauf l'extrémité des articles 3, 4, 5, qui est fortement enfumée (les autres articles manquent). Prothorax transversal, deux fois aussi large que long, assez convexe, d'un fauve sale, marqué à la partie antérieure d'un sillon transversal atteignant les côtés, et de chaque côté d'une dépression assez profonde touchant au sillon; bords antérieur et postérieur presque parallèles, légèrement sinués, les côtés rétrécis en arrière: angles antérieurs presque droits, épaissis, légèrement relevés, les postérieurs obtus; surface inégale, peu brillante, couverte d'une ponctuation fine, assez éparse, plus dense vers les angles et la base. Écusson assez grand, en triangle curviligne, largement arrondi au sommet, testacé. Élytres ovulaires, assez convexes, un peu plus larges que le corselet, à marge latérale médiocre, entièrement couvertes d'une ponctuation profonde et très dense; d'un fauve sale, ornées chacune de trois bandes noires longitudinales assez larges, partant de la base et n'atteignant pas le sommet: la plus étroite prend naissance près de l'écusson et s'étend le long de la suture.

sans toutefois l'atteindre, et s'arrête un peu avant l'angle apical ; la seconde, un peu plus large, part du milieu de la base et s'arrête bien avant le sommet ; la troisième, plus large encore, s'étend de l'épaule au sommet sans toucher les deux autres. Épipleurcs concaves, très courtes, testacées. Dessous du corps d'un fauve sale, rembruni sur la poitrine et l'abdomen ; pattes d'un testacé légèrement ferrugineux, tibias canaliculés en dehors ; crochets tarsiens bifides, d'un brun rougeâtre.

Suivant la description qu'en donne Montrouzier, cette espèce paraît assez voisine de son *O. serlineata* ; elle doit en différer par la coloration de ses antennes, par la ponctuation de ses élytres, et leur forme ovalaire, par la disposition des bandes longitudinales.

Oides semipunctata n. sp.

Convexe, ovalaire, d'un fauve sale. Yeux, extrémité des antennes, quatre points sur le corselet, poitrine, une tache sur chaque côté des segments de l'abdomen et tarses, noirs. Élytres marquées de gros points enfoncés épars. — Long., 13 mill.

Deccan. (Musée Royal de Bruxelles.)

Corps ovalaire, très convexe, d'un fauve sale. Extrémité des palpes et des mandibules rembrunie. Tête fortement impressionnée en arrière des antennes, qui sont courtes, robustes, brunâtres avec l'extrémité noire. Pronotum transversal, 2 1/2 fois plus large que long, à côtés infléchis en avant, relevés en arrière ; bord antérieur échancré, le postérieur arrondi ainsi que ses angles ; surface finement ponctuée, ridée vers les angles, d'un fauve sale, ornée de quatre points noirs. Écusson grand, arrondi, lisse, brillant. Élytres à peine plus larges que le corselet, fortement convexes, ovalaires, à rebord marginal presque nul, un peu marqué à la base, couvertes de gros points enfoncés, arrondis, disposés irrégulièrement. Épipleurcs larges et courtes, sinuées, concaves. Dessous de la couleur générale, sauf le métasternum, une tache arrondie de chaque côté des segments de l'abdomen, le sommet des tibias et les tarses, qui sont noirs. Crochets tarsiens largement bifides, d'un brun de poix.

Cette espèce se distingue de celles qui ont également l'abdomen marqué de taches noires, par les gros points enfoncés dont les élytres sont couvertes.

Oides abdominalis n. sp.

Ovalaire, convexe, d'un testacé blanchâtre, brillant. Extrémité des mandibules, yeux, cinq derniers articles des antennes, noirs.

Abdomen noir (sauf le segment anal, qui est blanchâtre), entouré d'une bordure testacée. Corselet et élytres finement ponctués. — Long., 8 mill.

Java. (Ma collection.)

Convexe, de forme régulièrement ovulaire, entièrement d'un testacé blanchâtre, brillant. Extrémité des mandibules noirâtre; yeux noirs, ovalaires, peu saillants; front convexe, tête marquée d'une large dépression en arrière des antennes, et d'un sillon longitudinal profond; antennes filiformes, de la moitié de la longueur du corps, testacées, avec les cinq derniers articles d'un noir mat, et l'extrémité du précédent rembrunie. Pronotum transversal, convexe, brillant, $2\frac{1}{2}$ fois environ aussi large que long, à bord antérieur arrondi, à base légèrement sinuée, côtés arrondis; angles antérieurs presque droits, les postérieurs obtus; surface couverte d'une fine ponctuation. Écusson en triangle carviligne assez aigu, lisse, convexe. Élytres régulièrement ovalaires, médiocrement rebordées, couvertes d'une ponctuation fine et dense. Dessous et pattes d'un testacé blanchâtre comme le dessus, sauf l'abdomen, qui est en partie d'un noir brillant; les arceaux étant rebordés de testacé blanchâtre et le segment anal entièrement de cette couleur.

Oides vexilla n. sp.

Convexe, subovulaire, brillant. Entièrement d'un rouge ferrugineux, sauf les yeux, les articles 4, 5 et 6 des antennes et l'extrémité du 3^e, les cuisses postérieures, les tibias, les tarses et quelques taches sur l'abdomen, qui sont noirs. Ponctuation très fine. — Long., 9 mill.

Luzon (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium vexillum Chp. mss.

Palpes testacés, extrémité des mandibules noire, labre fortement rembruni, marqué de quelques points sétigères; front convexe, très relevé entre les antennes, testacé, vertex ferrugineux, tous deux lisses, brillants; yeux noirs, ovalaires, assez convexes; antennes filiformes, de la $\frac{1}{2}$ de la longueur du corps, testacé pâle, sauf l'extrémité du 3^e article et les articles 4, 5 et 6, qui sont entièrement noirs; le 1^{er} article renflé, assez long, le second très court, oblong, le 3^e presque trois fois aussi long que le second, et égal au quatrième, les suivants diminuant graduellement de longueur. Thorax transversal, $2\frac{1}{2}$ fois aussi large que long, à bords antérieur et postérieur parallèles, les latéraux rétrécis vers la base; angles antérieurs aigus, à sommet arrondi, les postérieurs très arrondis; d'un rouge ferrugineux, brillant, à surface légèrement

convexe, couvert d'une ponctuation très fine, à peine visible, très éparse sur le disque, un peu plus dense vers les côtés. Écusson en triangle curviligne allongé, à sommet arrondi, testacé, lisse, brillant. Élytres subovales, plus larges que le thorax, très étroitement rebordées, à côtés d'abord presque droits, sinués en dessous des épaules, puis s'élargissant brusquement jusque vers les 3,5 et se rétrécissant ensuite jusqu'à l'angle apical, qui est arrondi; d'un rouge ferrugineux, à surface brillante, très finement et à peine visiblement ponctuée; épipleures internes, très concaves, très courtes, ferrugineuses. Dessous ferrugineux, brillant, avec le milieu des segments de l'abdomen noirâtre; cuisses antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures noirâtres, excepté leur base, qui est de la couleur du dessous; tibiais et tarses noirs, couverts d'une pubescence roussâtre brillante, assez longue; crochets bifides.

Oides tibialis n. sp.

Ovale, court, convexe, ferrugineux. Avant dernier article des palpes, extrémité des mandibules, articles 3-7 des antennes et tibiais noirs ou fortement rembrunis; corselet et élytres à peine visiblement ponctués. — Long., 6 3/4 mill.

Siagao (I. Philippines) (Semper). (Musée de Bruxelles.)

Adorium tibiale Chp. mss.

Corps ovale, court, convexe, d'une couleur ferrugineuse. Palpes d'un testacé pâle, sauf l'avant-dernier et la base du dernier article, qui sont presque noirs; mandibules testacées avec l'extrémité noire; labre échancré, testacé; front et vertex testacés, le premier fortement convexe, relevé entre les antennes, le dernier impressionné en arrière de celles-ci et finement ridé autour des yeux, qui sont ovales, peu convexes, d'une couleur argentée; antennes filiformes, de la moitié de la longueur du corps; le premier article renflé et recourbé, le second très court, oblong, fortement rembruni, le 3^e presque entièrement noir, très allongé, les 4^e, 5^e et 6^e entièrement noirs, le 7^e noir avec l'extrémité rembrunie, les suivants entièrement testacés. Pronotum transversal, 2 1/2 fois aussi large que long, ferrugineux, brillant, submarginé, couvert d'une fine ponctuation à peine visible, à bords antérieur et postérieur parallèles, les latéraux rétrécis en arrière; les angles antérieurs sont aigus, peu saillants, les postérieurs, obtus mais bien marqués. Écusson convexe, lisse, brillant, ferrugineux, en triangle curviligne allongé, à sommet arrondi. Élytres un peu plus larges que le corselet, ovales, brièvement rebordées, à épaules assez saillantes, ferrugineuses, densément et finement ponctuées

sur toute leur surface. Épipleures concaves, très courtes, testacées. Dessous d'un testacé ferrugineux, avec la poitrine plus foncée. Cuisses testacées, tibias canaliculés en dehors, noirs, tarses testacés rebordés de noir; crochets tarsiens brunâtres, bifides.

Cette espèce se reconnaît aisément à sa petite taille, jointe à la coloration de ses antennes et de ses tarses. Elle a été capturée par le Dr Semper à Siagao (I. Philippines) et fait partie de la collection Chapuis, au Musée d'histoire naturelle de Bruxelles.

Oides subtilissima n. sp.

Ovale, convexe, entièrement d'un testacé pâle, avec les crochets tarsiens rougeâtres; couvert d'une ponctuation très fine. — Long., 7 1/4 mill.

Luzon (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium subtilissimum Chp. mss.

Corps ovalaire, convexe, d'un testacé pâle. Parties de la bouche et tête d'un testacé pâle, sauf le dernier article des palpes, qui est rembruni, et l'extrémité des mandibules, qui est noire; labre arrondi; front convexe, modérément relevé, vertex largement impressionné, marqué d'un fin sillon longitudinal. Yeux ovalaires, d'un gris argenté; antennes filiformes, atteignant presque les deux tiers de la longueur du corps, testacées. Pronotum transversal, modérément convexe, inégal, marqué de chaque côté, vers les angles postérieurs, d'une large dépression irrégulière; bords antérieur et postérieur presque parallèles, le dernier légèrement sinué, les latéraux sensiblement dilatés vers l'arrière; angles antérieurs presque droits, les postérieurs arrondis; surface entièrement couverte d'une ponctuation très fine et assez dense. Écusson très convexe, en triangle curviligne, lisse, également d'un testacé pâle. Élytres de même couleur, un peu plus larges que le corselet, modérément dilatées au delà de leur milieu, brièvement rebordées, à épaules peu saillantes, couvertes sur toute la surface d'une ponctuation très fine et très dense. Dessous et pattes testacés, sauf l'extrémité des tibias, qui est un peu rembrunie, et les ongles des tarses, qui sont rougeâtres.

Cette espèce est voisine de *O. tibialis*; elle en diffère par sa coloration générale plus pâle, son corselet moins convexe, plus inégal, des yeux plus saillants, sa taille un peu plus grande, et sa forme relativement plus étroite.

Elle se rapproche également de *O. flarida*, et s'en distingue par sa taille moindre, sa ponctuation à peine visible, son corselet plus allongé, la coloration des yeux et des antennes.

Oides flavida n. sp.

Ovale, entièrement testacé, avec les yeux noirs et l'extrémité des antennes rembrunie; corselet et élytres densément ponctués.

— Long., 8 à 8 1/2 mill.

Samar, Luzon (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium flavidum Chp. mss.

Brillant, entièrement testacé, avec les yeux noirs; de forme ovale; extrémité des mandibules et le bord externe du labre légèrement rembrunis, ainsi que l'extrémité des antennes. Pronotum transversal, plus de deux fois aussi large que long, assez convexe, déprimé vers les bords latéraux; angles antérieurs presque droits, les postérieurs arrondis, bords antérieur et postérieur presque parallèles; surface très finement et à peine visiblement ponctuée. Écusson lisse, brillant, en triangle curviligne. Élytres plus larges que le corselet, à épaules bien marquées, ovalaires, à rebord latéral médiocre, couvertes d'une ponctuation très dense et bien marquée. Épipleurcs concaves, courtes et larges. Dessous brillant comme le dessus, et couvert d'une pubescence courte et dense, argentée; crochets tarsiens bifides et d'un brun de poix.

Cette espèce est très voisine de *O. subtilissima*: elle en diffère par son pronotum plus court et plus transversal, par son écusson relativement plus aigu, par sa forme générale plus ovale et surtout par la ponctuation des élytres, qui est à peine visible dans *O. subtilissima*, tandis qu'elle est bien marquée dans la présente espèce.

Oides elliptica n. sp.

Elliptique, modérément convexe, entièrement testacé, sauf les yeux, qui sont noirs, et les cinq derniers articles des antennes, qui sont rembrunis ainsi que l'abdomen. Corselet presque quadrangulaire, très finement ponctué ainsi que les élytres. — Long., 8 mill.

Luzon (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium ellipticum Chp. mss.

Corps elliptique, modérément convexe, d'un testacé sale. Front convexe; tête marquée d'un profond sillon longitudinal en arrière des yeux, lisse; yeux noirs, subhémisphériques; antennes filiformes, testacées, avec les cinq derniers articles rembrunis. Pronotum presque quadrangulaire, environ deux fois aussi large que long, modérément convexe, légèrement sinué à la base, marqué vers les bords latéraux d'une impression large et assez

profonde, couvert d'une ponctuation très fine, presque invisible sur le disque, plus marquée vers les angles, d'un testacé sale et orné de chaque côté d'une petite tache ronde d'une couleur plus foncée, ces taches presque entièrement effacées chez certains exemplaires. Écusson en triangle curviligne, lisse. Élytres un peu plus larges que le corselet, de forme elliptique, à rebord marginal étroit, couvertes d'une ponctuation très fine. Épipleures très courtes, concaves. Dessous testacé avec l'abdomen rembruni, et parfois les pattes rougeâtres.

Cette espèce se reconnaît à sa forme elliptique et à son corselet presque quadrangulaire.

Oides marcida n. sp.

Convexe, ovulaire, d'un fauve sale avec les yeux noirs, l'extrémité des antennes, les tarses et parfois une partie des segments de l'abdomen, rembrunis; corselet brillant, marqué de quelques points à peine visibles, élytres finement et densément ponctuées.

— Long., 8 à 10 mill.

Iles Philippines (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium marcidum Chp. mss.

De forme ovulaire, allongée chez certains exemplaires, raccourcie chez d'autres, convexe, entièrement d'un fauve sale, parsemé de taches roussâtres. Extrémité des mandibules noirâtre, palpes parfois rembrunis; tête brillante, marquée d'une dépression en arrière des antennes, et d'un sillon longitudinal profond; yeux noirs; antennes filiformes, dépassant la moitié de la longueur du corps, testacées, avec l'extrémité rembrunie et le sommet de chacun des cinq derniers articles noirâtre. Pronotum transversal, brillant, subémarginé, à angles antérieurs légèrement arrondis et un peu penchés, à angles postérieurs obtus, marqué d'une dépression vers ces derniers, qui paraissent un peu relevés, couvert de quelques points très fins à peine visibles, plus distincts vers les bords latéraux, qui sont arrondis. Écusson assez grand, en triangle curviligne, arrondi au sommet, lisse, brillant. Élytres plus larges que le corselet; ovalaires, élargies en arrière, brièvement rebordées, couvertes d'une ponctuation fine et dense. Épipleures concaves, très courtes. Dessous et pattes de la couleur générale, avec les tarses, parfois l'extrémité des tibias et les segments de l'abdomen rembrunis. Crochets tarsiens largement bifides.

Cette espèce est très voisine de *O. sumatrensis* Blanch.; elle en diffère par sa coloration d'un fauve sale parsemé de taches roussâtres, par son corselet plus irrégulier, à surface moins convexe, plus inégale, par ses antennes à articles relativement plus allongés,

noirâtres en partie seulement à l'extrémité, par son écusson plus grand, plus largement arrondi au sommet, par son rebord élytral plus étroit, peu marqué.

Oides quadriguttata n. sp.

Ovale allongé, peu convexe, entièrement d'un testacé pâle, sauf l'extrémité des mandibules, les yeux, les antennes et deux petites taches arrondies sur chaque élytre, qui sont noirs; corselet et élytres très finement ponctués. — Long., 9 mill.

Luzon (Semper). (Musée Royal de Bruxelles.)

Adorium quadri-guttatum Chp. mss.

Corps en ovale allongé, peu convexe, entièrement d'un testacé pâle. Palpes et mandibules d'un testacé pâle, l'extrémité de ces dernières d'un noir brillant; labre profondément échancré; front relevé, brillant; vertex impressionné en arrière des antennes et muni d'un fin sillon longitudinal assez profond; yeux ovalaires, noirs, peu saillants; antennes filiformes, testacées, avec les quatre derniers articles noirs. Pronotum transversal, brillant, environ trois fois aussi large que long, finement ponctué sur toute sa surface; bord antérieur arrondi, le postérieur presque parallèle à l'antérieur, légèrement sinué, les côtés rétrécis en arrière; angles obtus. Écusson très petit, peu convexe, lisse, brillant, en triangle curviligne. Élytres un peu plus larges à la base que le corselet, ovalaires, peu convexes, brièvement rebordées, peu brillantes, finement ponctuées sur toute la surface, ornées chacune de deux petites taches noires arrondies, la première vers le quart antérieur, la seconde plus petite vers le quart postérieur. Épipleures très courtes, concaves. Dessous et pattes d'un testacé pâle, tibiae canaliculés en dehors, crochets bifides; tibiae et tarses recouverts d'une pubescence soyeuse, très brillante.

Cette espèce se distingue facilement de ses congénères par ses élytres flaves, ornées chacune de deux taches noires.

M. E. Simon nous adresse le travail suivant :

DESCRIPTIONS DE QUELQUES ARACHNIDES DES GENRES

MILTIA E. S. ET ZIMIRIS E. S.

par Eug. Simon.

Ces deux genres constituent un petit groupe très naturel dans la famille des DRASSINÆ, caractérisé principalement par la structure des filières intérieures, beaucoup plus épaisses que les supérieures.

disjointes et biarticulées, avec le 1^{er} article pourvu d'un denticule à l'extrémité interne, par les lames maxillaires très atténuées et convergentes, les chélicères longues, divergentes, à crochet très long, fortement arqué et grêle dès la base, avec les deux bords de la rainure mutiques. Les pattes sont remarquables par la grande longueur du trochanter à la 4^e paire, mais ce caractère est peu indiqué dans le genre ZIMIRIS.

Jusqu'ici, ce groupe ne renferme que quatre espèces :

MILTIA AMARANTHINA Lucas (sub *Enyo*), d'Algérie et du Maroc.

— DIVERSA Cambr., de Syrie.

— LETOURNEUXI E. S., de la Basse-Égypte.

ZIMIRIS DORLÆ E. S., de l'Arabie méridionale.

Nous ajoutons les suivantes :

1. **Miltia flavida** sp. nov.

♂♀ long., 2.8-3.2 mill.

Cephalothorax anguste ovatus, flavo-testaceus, tenue coriaceus, parce crasse albido-pubescent. Area oculorum latior quam longior, oculis 4 anticis æquis fere contiguïs et rotundatis, oculo laterali 2^o ovato et obliquo (haud transverso), oculo laterali 3^o elongato postice paulo attenuato et obtuso valde obliquo, spatio inter oculos posticos diametro oculi multo angustiore. Chelæ sternumque flavo-testacea lævia nitidissima. Abdomen elongatum fere cylindricum antice posticeque obtuse truncatum, albo testaceum. Mamillæ testacæ. Pedes flavo-testacei, sat longe pilosi, mutici, antichi robusti, postici graciliores et longiores.

♂). Pedes maxillares testacei tarso paulo infuscato, femore fere recto versus basin paululum compresso et arcuato, patella longiore quam latiore a basi paulo attenuata, tibia brevior extus ad apicem apophysa robusta subacuta divaricata atque supra denticulo minuto et acuto armata, tarso magnò longe ovato, parum attenuato, bulbo ovato simplice.

♀). Vulva area rufula magna in medio dilutior, postice paululum emarginata, utrinque tuberculo minuto rotundato, foveolato et marginato notata.

Algérie : Le Hodna !

Au mois de mai, sous les pierres, dans les endroits les plus secs.

2. **Miltia Chaperi** sp. nov.

♂ *pullus*, long., 7 mill.

Cephalothorax brunneo-rufescens marginem versus infuscatus, coriaceus, parce crasse albido-pubescent. Area oculorum fere

aeque longa ac lata, oculis magnis fere aequis, mediis anticis rotundatis et convexis parum disjunctis (intervallo dimidio diametri oculi angustiore) a lateribus haud separatis, oculo laterali 1^o rotundato, 2^o elongato et transverso, 3^o elongato obliquo postice acute acuminato. Chelæ fulvæ, ad basin convexæ, parum divaricatæ. Sternum rufo-brunneum, nitidum, tenue punctatum, parce albo-pubescent. Abdomen ovato elongatum, fere cylindricum, antice posticeque obtuse truncatum supra obscure rufo-violaceum, infra testaceum. Pedes obscure fulvo-rufescentes, robusti, longe pilosi, anticis muticis, posticis tibiis metatarsisque infra ad apicem aculeis binis gracilibus instructis.

Hindoustan : Wagra-Karour, district de Bellary. (Muséum de Paris, par M. Chaper.)

3. *Miltia gulosa* sp. nov.

♀ long., 4 mill.

Cephalothorax lacte flavo-rufescens subtile coriaceus. Area oculorum paulo latior quam longior, oculis parum inæqualibus, mediis anticis rotundatis disjunctis (intervallo dimidio diametri oculi latiore) a lateralibus anticis angustissime separatis, oculo laterali 2^o paululum majore ovato transverso extus truncato, oculo laterali 3^o paulo minore, elongato, obliquo, postice acute acuminato, Chelæ robustissimæ, a basi valde convexæ, apicem versus valde attenuatæ et divaricatæ. Sternum flavum, anguste flavo-limbatum, leve, nitidissimum. Abdomen ovatum, antice posticeque obtuse truncatum supra cinereo-violaceum, infra testaceum. Pedes flavo-aurantii sat longi, parum robusti, mutici. Mamillæ testaceæ. Vulva area fusca plicata, in medio carina canaliculata postice truncata et breve bituberculata longitudinaliter secata.

Nouvelle-Calédonie : Nouméa. (Savès.)

4. *Zimiris indica* sp. nov.

♀ long., 3.6 mill.

Cephalothorax flavo-testaceus utrinque paulo infuscatus, levis, nitidus, striga thoracica tenui munitus. Area oculorum paululum latior quam longior, oculis mediis anticis reliquis paulo majoribus a sese anguste disjunctis, oculis lateralibus 1^o et 2^o æquis, latis, paulo angulatis, oculo laterali 3^o paulo minore elongato postice acuminato et obliquo. Chelæ fulvæ. Sternum nitidum, fulvum angustissime fusco-marginatum. Abdomen testaceum, breve ovatum, antice truncatum, postice attenuatum, supra punctis impressis minimis 6 notatum. Mamillæ testaceæ. Pedes flavo-testacei, longi et graciles, femoris anti-is compressis atque pone basin supra dilatatis, tibiis spinis gracillimis et setiformibus 2 vel 3 infra instructis, tarsis, metatarsis et apice tiliarum infra scopulatis. Plaga vulvæ

plana utrinque infuscata et rufula, postice truncata atque in melio fovea minima et elongata longitudinaliter secata.

Hindoustan méridional : Ramnad. (Fabre.)

M. L. Fairmaire nous adresse le travail suivant :

DIAGNOSES DE COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE

(Suite)

par M. Léon Fairmaire.

Scarabæus opacipennis. — Long., 19 mill.

Niger, nitidiusculus, elytris sericeo-subopacis sutura nitida, capite strigoso-punctato, inter oculos punctis majoribus sparsuto et linea transversa vix elevata, melio angulata signato, antice acute 4-dentato, prothorace lateribus angulato et antice denticulato, postice crenulato, dorso alutaceo, subtiliter punctato et punctis majoribus sparsuto, elytris subtiliter striatis, intervallis rarissime punctulatis, margine laterali bicarinato — Makdischu.

Ressemble au *S. ebenus* Klug., mais très différent par la tête rugueuse et le corselet parsemé de gros points épars.

S. salebrosipennis. — Long., 27 mill.

Niger, supra modice nitidus, lateribus fere opacis, subtus nitidior; capite antice acute 4-dentato et strigoso-punctato, fronte media læviore, convexiusculo, summo medio fere lævi; prothorace lateribus crenato, dorso laxo punctato, intervallis obsolete dense punctato-impressis, elytris extus acute carinatis, subtiliter lineato-punctatis, intervallis vage convexiusculis, interrupto-impressis; femoribus anticis crenatis et basi bidentatis. — Makdischu.

S. nepos. — Long., 28 mill.

S. prodigioso valde affinis, sed multo minor, fronte inter oculos laxius asperato, margine laterali leviter sinuata, prothorace lateribus minus angulato, dorso tenuius granulato, margine postico dense granulato, medio obtuse angulato, spatio lævi transverso fere nullo, elytris minus parallelis, striis subtilibus, haud punctatis, intervallis fere sericeis, punctis subtilibus rarius impressis, pygidio subtilissime laxo punctulato. — Zanzibar.

Trochalus seminitens. — Long., 5 1/2 mill.

Brevissime ovatus, subglobosus, rufus, parum nitidus, capite et prothoracis parte antica et laterali lunata nitidis, subtus cum pedibus nitidissimus, capite dense punctato, antice constricto,

apice reflexo, inter oculos transversim carinato, prothorace antice valde angustato, subtilissime dense punctato, elytris globosis lineis laevis signatis, linea suturali substriata, intercallis subtilissime punctulatis; subtus lateribus punctatis, coxis anticis angulatis. — Zanzibar.

PACHYPOÏDES n. g.

Ce nouveau genre est très voisin des *Pachypus*, dont il diffère par le corps moins épais, moins atténué en arrière, la tête non carénée transversalement, la massue des antennes plus longue, plus mince, arquée, le corselet non excavé, arrondi aux angles postérieurs, les tarses moins hérissés de soies, les antérieurs un peu plus larges, pubes cents en dessous; les crochets des tarses sont finement fendus à l'extrémité.

P. limbipennis. — Long., 7 1/2 mill.

Oblongus, modice convexus, fusco-piceus, nitidus, elytris testaceis, brunneo-limbatis, ad basin angustissime, capite prothoraceque dense punctatis, hoc brevi, lateribus angulatim rotundato, postice spatio medio levi, scutello ogivali, punctato, elytris a basi postice attenuatis, apice separatim rotundatis, punctato-lineatis, vage substriatis, margine laterali et apice fere rugose punctatis. — Makdischu.

Anoplochilus limbicollis. — Long., 16 mill.

Breviter ovatus, castaneo-piceus, glaber, prothorace vitta laterali et punctis 4, elytris guttis parum regularibus, pygidio maculis 5 et metasterni macula apicali albido-pubescentibus, capite oblongo, rugoso-punctato, prothorace fortiter sat dense punctato, scutello polito, acuto, elytris suturam versus tenuiter striatis, extus transversim plicatis, pygidio dense strigoso-rugosulo, subtus nitidior. — Makdischu.

Pachnoda chionopleura. — Long., 20 mill.

Oblongo-ovata, supra atropurpurascens, opaca, prothorace elytris que lateribus anguste rufo-marginato, his apice vage castaneo-maculosis, subtus fulva, valde nitida, lateribus maculis niveis ornata, abdomine extus obscuriore, tibiis obscurioribus, basi niveo-maculatis, tarsis fuscis, pygidio niveo-sex-guttato. — Zanzibar.

Voisin de l'*Euparypha* Gerst., mais d'une coloration très différente.

Oxythyrea (Leucocelis) amplicollis. — Long., 9 1/2 mill.

Oblongo-ovata, postice attenuata, fusca, nitida, prothorace lateribus late rotundato, rufo anguste marginato et plaga impressa

niveo-pubescente utrinque signato, elytris viridibus, punctis fuscis seriatis, seriebus basi geminatis, primis postice sulcatis, lateribus albo-maculatis, pygidio ocellato-punctato, pectore abdomineque lateribus albo-maculatis. — Zanzibar.

Ressemble beaucoup à *P. lucidicollis* Gerst., mais le corselet est plus largement arrondi en avant, la ponctuation est plus serrée, les côtés présentent au milieu une impression blanche, les tarses postérieurs sont plus courts et la taille est plus faible.

Cymophorus sexfoveatus. — Long., 9 mill.

Oblongus, convexus, niger, nitidus, prothorace elytrisque rufis, illo basi anguste nigro-marginato, his basi, sutura et utrinque punctis 2 nigris, ultimo sutura connexo, capite densissime punctato, antennarum clava rufa, prothorace postice parallelo, sat dense punctulato, basi bifovento, elytris oblongis, apice fere truncatis, laxe punctatis, spatio suturali basi valde depresso, utrinque pluristriolato, elytris utrinque bifoventis, pygidio carinato, cum pedibus griseo-villosa. — Zanzibar.

Chalcophora procera. — Long., 38 mill.

Elongata, modice connexa, supra fusco-metallescens, nitida, punctis impressionibusque purpureo-cupreis; capite rugoso, medio sulcato, prothorace antice angustato, medio canaliculato, lateribus carioso, scutello punctiformi, elytris post medium angustatis, subseriatim foveolato-punctatis, intervallis convexiusculis longitudinaliter subordinatis; subtus aenea, viridi- et aureo-micans, cum pedibus grosse punctata et pallido-fulvo-villosa. — Makdischu.

Psiloptera inæqualis. — Long., 27 mill.

Oblonga, modice convexa, postice attenuata, aenea, metallica, spatiis elevatis fusco-cornulescentibus, depressionibus fulvo-pubescentibus; capite dense fulvo-villoso, inter oculis plagulis 2 nitidis, prothorace carioso-punctato, medio plagulis 2 antice attenuatis, utrinque plaga ovata et plagula antico-laterali laevibus, elytris late striatis, intervallis valde interruptis, apice magis regularibus, subtus dense fulvo-cinereo-pubescentibus, plagulis angustis politis. — Makdischu.

P. confossipennis. — Long., 21 mill.

Oblonga, convexa, antice vix postice magis attenuata, violacea, nitida, capite prothoraceque punctis orichalceis impressis, elytris fusco-cyanescentibus, grosse punctato-striatis et impressionibus oblongis aut sub-quadratis, orichalceis, pubescentibus, extus interruptis, subtus dense rufo-villosa, abdomine medio et lateribus anguste longitudinaliter denudato, tarsis viridibus. — Makdischu.

Cette espèce se rapproche du *rugosa*, dont elle est bien distincte par les fortes impressions des élytres, et sa coloration violette. La précédente ressemble, au contraire, au *perspicillaris*, mais plus allongée, avec les angles postérieurs du corselet moins pointus et les intervalles des stries fortement interrompus en travers.

Chrysobothris impressifrons. — Long., 8 mill.

Ovato-oblonga, fusco-cyanescens, nitidula, capite antice leviter lilaceo, inter oculos transversim elevato, summo punctato, antice strigoso, prothorace elytris angustiore, postice abrupte angustato, dorso subtiliter strigoso, elytris inaequalibus, subtiliter dense punctulatis, extus rugosulis et postice tenuiter denticulatis; subtus nitidior, femoribus anticis dente acuto armatis, segmento ventrali ultimo acute carinato.

Voisin de *C. serrata*, mais autrement coloré, plus petit, plus court, avec le corselet brusquement rétréci à la base.

Janthe zanzibarica. — Long., 5 mill.

Oblong-ovata, convexa, obscure cyanea, micans, fronte medio leviter foveolata, metasterno haut carinato. Ab *J. felici* statura majore, paulo magis ovata, metasterno haut carinato et abdomine densius punctato; ab *J. Beccarii* fronte foveolata distincta. — Zanzibar.

Sternocera Revoili. — Long., 36 à 40 mill.

Oblonga, postice attenuata, viridi-metallica, leviter auromicans, foveolis punctisque flavo-pubescentibus, prothorace fere a basi valde angustato, dense foveolato, lateribus antice plaga oblonge impressa flavo-tomentosa, elytris foveolis minus profundis, dense impressis, intervallis angustis, reticulatis, basi utrinque biplagiatis et flavo-tomentosis, sutura et utrinque lineis 3 leviter elevatis, lateribus vitta marginali obscure rufa ante basin interrupta et plaga subhumerali oblonga flavo-tomentosa brevi signatis, subtus fusco-cyanescens, medio aureo-micans, abdomine lateribus flavo-tomentoso-impressis. — Guélidi.

Luciola galactopyga. — Long., 4 1/2 à 5 mill.

Oblonga, subparallela, fusco-brunnea, prothorace lateribus late, antice et postice anguste rufo-marginato, scutello plus minusve rufo, subtus cum pedibus antennisque obscure rufescens, abdomine medio infusato, segmentis ultimis lacteis, capite dense punctato, excavato, prothorace transversim subquadrato, dense punctato, medio sulcato, elytris subtiliter rugosulis, sutura et utrinque lineis 2 tenuiter elevatis. — Zanzibar.

SEPIDIACIS nov. gen.

Sepidiis valde affine, sed corpore nudo, prothorace antice verticali, haud antice producto, angulis lateralibus nullis aut fere nullis, dorso gibboso, utrinque acute spinoso, elytris disco acute spinosis, oculis ovatis, antennis gracilioribus distinctum.

S. compressa. — Long., 16 mill.

Elongata, compressa, fusca, indumento albido-griseo dense vestita, dorso obsolete terreo, prothorace elytrisque brunneo-vittulatis, prothorace antice asperato, dorso fere conico-elevato, summo utrinque dente sat acuto armato, elytris dorso grosse punctatis, utrinque distanter 4-spinosis, spina antica majore, extus directa et basi spinula brevi munita. — Makdischu.

Le *Sepidium Pradierii* Guér. doit rentrer dans ce genre.

Pycnocerus Hercules. — Long., 40 mill.

Oblongus, valde convexus, nigro-fuscus, vage corulescens, sat nitidus, capite rugoso-punctato, utrinque valde impresso, antennis apice clavatis, prothorace amplo, elytris latiore, dense sat fortiter punctato, elytris fere cylindricis, late sulcatis, intervallis convexis, asperulis, femoribus anticis dente fere medio valido et prope basin denticulo armatis tibiis posticis valde curvatis, intus denticulatis. — Makdischu.

Endostomus plicicollis. — Long., 16 mill.

Oblongo-ovatus, antice et postice aequaliter rotundatus, unilique fusco-conspersus, subtiliter dense punctulatus, prothorace carinula longitudinali antice et basi obsoleta signato, postice medio haud punctato et utrinque plica oblonga signato, elytris connatis, sutura elevata et utrinque costulis disci 3 tenuibus, basi et postice abbreviatis, externa fere marginali, subtus picescens. — Guélidi.

Cossyphus costulicollis. — Long., 9 1/2 mill.

Alatus, oblongo-ovatus, prothoracis elytrorumque lateribus reflexo-marginatis, fusculo-conspersis et subtiliter densissime punctatis, prothorace supra caput acute carinato, postice linea vix elevata signato, elytris sutura et utrinque costa postice abbreviata sat acute elevatis, disco utrinque fortiter crenato, abdominis segmento ultimo utrinque carinato. — Ouabbi.

PHÆOSTOLUS nov. gen.

G. *Hedyphanem* approximans, sed antennis validioribus, articulis ultimis haud compressis, ceteris longioribus, articulis 3°, 4°,

5^{ae} aequalibus, palporum maxillarum articulo ultimo caltriformi apice truncato distinctum.

P. grandicornis. — Long., 11 mill.

Elongatus, valde convexus, sat nitidus, prothorace densissime punctato, opaco, anguste lateribus marginato, elytris angustiore, longitudine parum latiore, antennis validis, medium corporis superantibus, elytris elongato-ovatis, fortiter punctato-striatis, punctis post medium oblitteratis, intervallis planis, basi vix convexiusculis. — Makdischu.

Eupsalis bifalcatus. — Long., 13 mill.

E. vulsellato affinis, sed major, rostro lato, antice arcuatim depresso, margine transversim subtiliter plicatulo, mandibulis majoribus, capite inter oculos deplanato, prothorace latiore, basi minus fortiter plicato, elytris paulo opacis, capite subtus medio carinato, prosterno inter coxas latiore, femoribus anticis dente paulo majore armatis. — Ouabbi.

Microcerus dorsofumatus. — Long., 11 mill.

Ovato-oblongus, indumento griseo dense vestitus, capite rostroque medio carinulatis, hoc valde inaequali, antice emarginato, prothorace lateribus, medio fere angulatis antice paulo constrictis, disco inaequaliter, lateribus transversim plicato, elytris ovatis dorso striatulis, intervallis inaequalibus, dorso postice grosse tuberculatis, tuberculo ante-apicali communi, lateribus multituberculatis, tuberculo ultimo majore. — Makdischu.

Systates crenatipennis. — Long., 9 mill.

Nigro-fuscus, nitidus, supra parce, subtus densius griseo-pubescent, rostro carinato, capite inter oculos breviter striato, antennis sat gracilibus, scapo vix sensim arcuato, apice incrassato, prothorace transverso, tuberculis depressis dense obsito, elytris ovatis, valde convexis, sat late punctato-striatis, striis transversim interruptis, intervallis convexiusculis, asperatis. — Zanzibar.

S. setosipennis. — Long., 8 1/2 mill.

Nigro-fuscus, nitidus, pube fulva dense vestitus, elytris basi, lateribus et postice pallidiore maculosis, rostro carinato, capite inter oculos breviter striato, antennis parum gracilibus, scapo crassiusculo, leviter arcuato, apice paulo crassiore, prothorace minus transverso, dorso denudato et tuberculis depressis obsito, elytris breviter ovatis, punctato-striatis, intervallis convexiusculis, setulis brunneis et pallidis seriatis. — Zanzibar.

Cylas curtipennis. — Long., 5 mill.

Elongatus, valde convexus, subcyanescenti-atr., modice niti-

dus, rostro paulo gibboso, apice punctulato, antennarum clava
 fusca, opaca, cinereo-pubescente, prothorace basi constricto, ely-
 tris brevibus, latitudine vix duplo longioribus, basi fere truncatis,
 apice tantum angustatis et abrupte declivibus, parce brevissime
 setulosis, lateribus punctulatis, femoribus valde clavatis, postero-
 ribus elytra longe superantibus, tarsis piceis. — Zanzibar.

Voisin du *cyaneus*, mais plus petit, plus étroit, moins gibbeux,
 avec les fémurs postérieurs bien plus longs.

Liocalandra? pygialis. — Long., 7 mill.

Linearis, nigro-fusca, nitida, rostro arcuato, fere lævi, basi
 paulo crassiore et punctato, prothorace elongato, subparallelo,
 antice tantum attenuato, dense punctato, elytris prothorace vix
 latioribus, vix longioribus, truncatis, dense punctatis, subtiliter
 striatis, pygidio obliquo, dense punctato, albido-squamoso, apice
 fere truncato, subtus nitidior, meso- et metapleuris albido-squa-
 mosis, pedibus sat magnis, femoribus parum clavatis. — Gué-
 lidi.

Phyllocnema petalophora. — Long., 10 mill.

Cyanea, modice nitida, abdomine nitidiore, antennis pedibusque
 testaceo-flavis, tibiis posterioribus ante medium laminato-dilatatis,
 cyaneis, intus concavis, capite prothoraceque punctatis, hoc late-
 ribus angulato, elytris subtilius sed densius punctatis, scutello
 acuto, impresso. — Makdischu.

Diffère du *mirifica* par sa coloration d'un beau bleu uniforme
 et sa taille plus faible, et la dilatation des tibias postérieurs plus
 arrondie en dedans.

Hypatium cœrulans. — Long., 26 mill.

Squalide cœruleum, modice nitidum, subtus albido-sericans,
 femoribus piceis; capite rugoso-punctato, antennis elytris breviori-
 bus, articulis ultimis fuscis, opacis, longitudine decrescentibus,
 prothorace valde rugoso, lateribus breviter angulato, antice
 utrinque angulato, postice utrinque transversim elevato, elytris
 subtiliter rugosulis, basi vermiculatis, femoribus 4 anticis clavatis,
 posterioribus minus clavatis, tibiis compressis. — Makdischu.

Ceroplesis Pauli. — Long., 32 à 36 mill.

C. Revoili Fairm. simillima, sed prothorace angustiore, scutello
 truncato, elytris magis fuscis, punctis impressis majoribus, minus
 numerosis, interdum confluentibus, vittis minus limitatis, 1^a latiore,
 ad marginem dilatata, 2^a magis integra, abdomine brevius pubes-
 cente, metapleuris fuscis, segmento ultimo rufo, basi fusco et
 medio profunde striato. ♀. — Guélidi.

Mombasa subinermis. — Long., 10 à 11 mill.

Oblonga, cyanea, modice nitida, tenuiter fulvo-sericans, subtus fusco-cyanescens, antennis pedibusque nigro-fuscis, illis ♂ corpore vix brevioribus, ♀ medium corporis paulo superantibus, prothorace rugoso-punctato, lateribus ♂ medio dentatis, ♀ inermibus, scutello fusco, dense pubescente, elytris sat subtiliter dense punctato-rugulosis. — Guéldi.

Brumus fulviventris. — Long., 2 à 2 1/2 mill.

Breviter ovatus, flavo-rufus, nitidus, elytris vittis 2, altera suturali, communi, altera discoidali, nigris, prothorace basi arcuatim vage infuscato, metasterno femoribusque posterioribus infuscatis. — Zanzibar.

Diffère des *nigrifrontis* Gerst. et *suturalis* Fab. par la taille plus faible, la forme plus courte, l'abdomen et les pattes rousses, et du second en outre par les bandes des élytres atteignant presque l'extrémité.

Ces insectes, ainsi que ceux décrits dans les précédents bulletins, proviennent du voyage de M. G. Révoil et m'ont été communiqués par les soins de M. Henri Deyrolle.

Le Secrétaire donne lecture des communications suivantes, envoyées par M. le Dr Heylaerts :

NOTE SYNONYMIQUE.

En comparant la figure 22, tab. LXXXIII, de la partie zoologique (*Reise der Novara*, 2^e Band, 2^e Abth.), *Psychoglène basinigra* Feld., avec l'exemplaire original de mon *Animula dimidiata*, décrite p. xxxviii du Compte-rendu de la séance de la Soc. Ent. Belge du 5 janvier 1884, il me paraît que cette dernière pourrait bien être l'espèce figurée. Malheureusement, MM. Felder et Rogenhofer ont figuré les Hétérocères *sans donner le texte*, de sorte qu'il est plus que difficile de comprendre ces genres et ces espèces, sans étude préalable de leur spécimen original. Je ne retire donc pas le nom donné par moi-même, et j'ajouterai seulement, en synonymie :

? *Psychoglène basinigra* Feld. *Novara R. Zool.*, 2^e Band, 2^e Abth., tab. LXXXIII, fig. 22.

Si les deux espèces sus-mentionnées n'en font qu'une seule, le genre *Psychoglène* peut être rayé, car elles appartiendraient indubitablement au genre *Animula* H.-S. La patrie de *Psychoglène basinigra* Feld. est le Brésil.

LA CHENILLE DE L'ECOPHORA FLAVIFRONTILLA HÜEN.


Dans les Annales de la Soc. Ent. Belge, IV, p. 102, M. E. Fologne décrit et figure parfaitement, pl. II, fig. 6, 6^a, 6^b, la chenille de cette espèce. En faisant l'éducation *ab ovo* de l'*Ecophora flavifrontella* Hb., je suis à même de compléter l'esquisse biologique publiée.

La chenille a un cycle vital de deux années. Les œufs, pondus le 2 juillet 1882, sont jaune brunâtre, oblongs et fortement cannelés longitudinalement. Après deux ou trois jours, la couleur devient rougeâtre. Les jeunes chenilles se développèrent du 10 au 15 août 1882; elles étaient rougeâtres et avaient la tête, l'écusson et le clapet anal noirs. Elles se fabriquèrent immédiatement un petit fourreau, d'un morceau de feuille sèche de *Vaccinium myrtillus* plié dans le sens de la longueur, et fermé par une soie blanche filée par elles. Par rapport à ce fourreau, j'ai constaté qu'il n'est pas *agrandi* par la chenille avant chaque mue, mais quitté pour un autre plus grand, de sorte qu'une seule chenille a besoin au moins de sept à huit fourreaux avant de se métamorphoser, vu qu'elle mue autant de fois.

Aujourd'hui, 4 avril 1884, mes chenilles sont parvenues à toute leur taille et adultes, et se changeront en chrysalides d'un jour à l'autre. La nourriture vraie de l'espèce sont les feuilles sèches de *Vaccinium myrtillus*, préférées par elles à toute autre espèce de plante desséchée. M. E. Fologne a parfaitement figuré ses spécimens, et les dessins de mes chenilles sont les mêmes, mais la couleur est différente. La tête, profondément et fortement ponctuée, est plus noire, surtout la fourche, qui est d'un noir de jais. L'écusson du premier segment est brun rougeâtre, et la couleur des autres segments est brun grisâtre.

ERRATA.

Il faut que je fixe l'attention sur deux fautes de la description de *Romanoffia imperialis* m. (Compte-rendu dernier, p. xciv.)



Le graveur a oublié (dessin de la nervulation) la partie de la *discocellulaire* qui occlut la *portion inférieure* de la cellule discocellulaire. Les *Cossina* H.-S. ont la cellule divisée.

Page xciv, première ligne, il faut lire, au lieu de : *e 2 e margine posteriori*, ET *2 e margine posteriori*.

M. le Dr Jacobs demande la parole et lit la note suivante :

NOUVEAUX CAS DE LARVES D'ESTRIDES

D'AMÉRIQUE DANS LE CORPS DE L'HOMME, OBSERVÉS EN EUROPE.

Comme suite à mes communications antérieures sur le même sujet, je pense qu'il est utile de faire connaître aux entomologistes la présence accidentelle, bien constatée, sous la peau, de larves d'Éstrides observées récemment en France; ce sont des larves d'Éstres d'Amérique trouvées sur des personnes ayant habité ce pays, et rentrées en Europe en donnant asile à la larve de ces insectes.

Le premier fait a été constaté par Charles Robin sur une dame; la larve, de couleur blanche, avait une forme ovoïde; ce serait un état larvaire assez avancé.

La seconde larve a été trouvée par Mègnin dans une tumeur d'aspect furonculaire de la cuisse gauche, chez un homme venant du Guatemala; elle en était sortie par pression, elle avait 12 millimètres de long, sur 5 dans sa plus grande largeur, elle affectait la forme d'une bouteille. D'après Osten-Sacken, cette dernière forme représente la deuxième station de l'état larvaire.

La mouche adulte, d'après Brauer, est longue de 14 millimètres, à corselet cendré et à abdomen bleu; c'est la *Dermatobia noxialis*.

Ces faits ont été publiés dans les Annales de la Société de Biologie de France.

M. H. Donckier de Donceel fait ensuite la lecture du travail suivant :

Pendant le voyage que M. le Dr Edm. Fromont a fait au Brésil et à La Plata, il a recueilli un nombre relativement considérable de Chrysomélides, étant donnée la saison défavorable pour la chasse pendant laquelle ce voyage s'est accompli.

Notre excellent collègue a bien voulu me confier ces insectes pour les déterminer et j'ai pu constater encore une fois combien il est bon chasseur. Il a chassé à Bahia, à Rio de Janeiro, à Montevideo et à Buenos-Ayres, et en quelques heures de recherches dans chacune de ces localités déjà si souvent explorées, il a su recueillir une cinquantaine d'espèces de Phytophages parmi lesquelles il s'en trouve beaucoup de nouvelles. Notre savant collègue M. Ed. Lefèvre, président de la Société entomologique de France, a bien voulu se charger de nommer ceux d'entre les Eumolpides que je n'avais pu reconnaître, et notre autre collègue, M. Ant. Duvivier, a

décrit les Galérucides et Halticides que M. Jacoby avait déclarés nouveaux.

Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le résultat de ces travaux.

Plectonycha Fromonti H. Donck., nov. sp.

Oblonga, ferruginea; antennis (articulo primo prætermisso) gemibus tibiis tarsisque nigris; thorace supra parum convexo ac subtilissime alutaceo, versus medium forceolato, lateribus medio profunde coarctatis; elytris convexiusculis, punctato-striatis. — Long., 7 mill.; lat., 3 1/2 mill.

Ferrugineuse, avec les organes buccaux noirs: tête assez fortement rétrécie derrière les yeux, à sillons latéraux bien marqués. L'espace entre eux et les yeux fortement rugueux. Antennes noires avec le premier article ferrugineux, un peu plus longues que le tiers du corps. Prothorax entièrement ferrugineux, brillant, fortement rétréci dans son milieu, sur les côtés, un peu plus large que long, avec trois petites fossettes, l'une vers le milieu et les deux autres en avant du rétrécissement latéral, peu convexe et couvert de rugosités très fines et visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Écusson ferrugineux en triangle tronqué au sommet. Élytres ferrugineuses, oblongues, subparallèles, convexes, garnies chacune de 10 rangées de petits points enfoncés, dont les intervalles sont très finement chagrinés. La poitrine et l'abdomen sont finement ponctués, ainsi que les cuisses. Les genoux, les tibias et les tarses sont noirs. Les cuisses de la dernière paire sont légèrement plus robustes que les autres.

M. le Dr Edm. Fromont en a pris un unique exemplaire à Botafogo, près de Rio de Janeiro, le 7 décembre 1883.

Le Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique en possède un autre exemplaire absolument identique ayant appartenu à la collection de feu Chapuis et étiqueté par lui : *P. corrientina* Lac. Corrientes. Lorsque M. Preudhomme de Borre fit le classement de cette partie des collections de M. Chapuis, il reconnut que cette espèce était nouvelle, mais il ne lui imposa aucun nom.

Lema bilineata Germ. Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.

— — var. *c.* Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.

— *fasciata* Germ. Bahia, 13 décembre 1883.

— *pudens* Lacord. —

— *ferrugata* Lacord. —

Monachus rubropustulatus Stål. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883, et Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

Colaspis flavipes Ol. Mêmes localités et mêmes dates.

— *diversa* Lef. — —

— *eruginosa* Germ. — —

— *trivialis* Boh. — —

Colaspis anceps Lef. (Voir plus loin.)

— *foecolata* Lef., sp. nov. (Voir plus loin.)

— *varia* Lef., sp. nov. (Voir plus loin.)

— *pusilla* Lef., sp. nov. (Voir plus loin.)

Chalcophana hilaris Germ. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

— *viridipennis* Germ. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

Typophorus nitidulus Fabr. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

— *simplex* Lef., sp. nov. (Voir plus loin.)

Endocephalus bigatus Germ. Rio de Janeiro (Botafogo), 4 décembre 1883.

Megascelis sp. Un seul exemplaire, qui paraît constituer une espèce nouvelle, ce dont il est cependant difficile de s'assurer, vu l'insuffisance de matériaux. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

Megascelis prasina Chvr. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

Phadon consimilis Stål. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

Zygogramma virgata Stål. Montevideo, 21 novembre 1883.

Systema S-littera L. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

Lactica Fromonti Duviv. (Voir plus loin.)

— *subcostata?* Jac. (Voir plus loin.)

Diphaulaca angularis Hald. var. Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.

Dysonycha bicarinata Boh. — —

— *conjuncta* Germ. — —

— *austriaca* Schauf. Bahia, 13 décembre 1883.

Asphaera T-album Har. Montevideo, 21 novembre 1883.

Homophæta episcopalis Illig. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

Homophæta 8-guttata F. J. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883, et Botafogo, 7 décembre 1883).

Edionychis scissa Germ. Rio de Janeiro (Jardin botanique),
15 novembre 1883.

— *crucigera* Jac. — —

— *nitida* F. — —

— *angustirollis* Duviv. (Voir plus loin.)

Diabrotica 15-*punctata* Germ. Rio de Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.

— *speciosa* Germ. Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.

Uroplata vinula Erichs., Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

Odontota (nec *Uroplata*) *parvula* Chp. Rio de Janeiro, 7 décembre 1883.

Mesomphalia 6 *pustulata* Fabr. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883, et Jardin botanique, 7 novembre 1883.

— *dimidiata* Boh. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

— *deleta* Boh. — —

Chelymorphia infaceta Boh. Bahia, 13 décembre 1883.

— *notata* Boh. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

Omoplata axillaris Sahlb. — —

Charidotis sexpustulata H. Donck., sp. nov.

Rotundata, convexa, nitida, sanguinea, antennis, prætermisiss articulis 4 ultimis nigris, pedibus margineque toto flavescens; prothorace lavi, antice lato rotundato; elytris, singula punctis tribus nigris, medioeriter punctato-striatis, margine sat late explanato, hyalino, reticulato. — Long., 5 mill.; lat., 4 mill.

Tête testacée, yeux ovales, peu convexes, noirs. Antennes jaunes, avec les quatre derniers articles noirs. Prothorax de moitié plus large que long, arrondi largement en avant, légèrement sinué sur les côtés, à angles arrondis, peu saillants; sinué et tronqué en arrière, lisse, brillant, légèrement sanguinolent, pointillé en avant de l'écusson et impressionné légèrement sur les côtés de celui-ci, à bords hyalins et réticulés; écusson lisse et sanguinolent. Élytres plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues, très légèrement sinuées en dessous de l'angle latéral postérieur, qui est subacuminé et saillant; arrondies à l'angle anal, peu convexes, sanguinolentes, lisses, peu fortement striées-punctuées, à interstries peu convexes, lisses; ornées chacune de trois points noirs disposés en triangle, l'un sur le disque vers le tiers

antérieur, les deux autres vers le bord, le premier vers le tiers antérieur, le deuxième avant le tiers postérieur. Le bord peu rélévé, lisse, hyalin et réticulé. Corps brun de poix, lisse, à ponctuation fine, peu serrée. Cuisses brunes, genoux testacés, ainsi que les tibias et les tarses.

Un exemplaire pris à Bahia, le 13 décembre 1883.

Coptocycla sellata Boh. Rio de Janeiro (Jardin botanique),
15 novembre 1883.

— *sejuncta* Boh. Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883.

INSECTES DÉTERMINÉS PAR M. E. LEFÈVRE.

Colaspis anceps E. Lef., Bull. Soc. Ent. de Belgique, avril 1878.

Rio de Janeiro (Botafogo), 7 décembre 1883. (Dr Fromont.)

Colaspis foveolata nov. sp.

Oblonga, subaeneo-viridis, nitida, labro antennisque fulvis, harum articulis quinque ultimis cyaneo-nigris; capite crebre rugulose punctato, supra antennarum insertionem spatio laevi subcalloso nitido notato; prothorace lato, lateribus rotundato ibique medio vix perspicue unidentato, ad latera utrinque fovea subrotundata profunde instructo, dense fortiter punctato, punctis hic illic confluentibus, interspatiis in medio dorsi laevibus; elytris fortiter sublineatim punctatis, versus apicem juxta suturam striatis, ad latera, praesertim infra humeros, transversim rugulosis; pedibus pallide fulvis. — Long. 4 1/3 mill.; lat. 2 mill.

Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883. (Dr Fromont.)

Colaspis varia nov. sp.

Oblonga, nitida, aeneo-viridis vel aenea, interdum subaurato-micans, labro antennisque fulvis, harum articulis ultimis fuscis; capite crebre punctato, in medio impressione profunda longitudinaliter instructo; prothorace modico convexo, lateribus utrinque medio unidentato, grosso irregulariter, ad latera crebris, punctato, punctis hic illic confluentibus, interspatiis laevibus subcallosis; elytris fortiter uniligne punctatis, versus apicem substriatis, punctis juxta suturam lineatim dispositis, ad latera autem, praesertim infra humeros, inter se confluentibus et rugas transversas formantibus; pedibus laete fulvis, genibus interdum, praesertim

posticis, magis minusve nigro-infuscatis. — Long., 3 1/2-4 mill.; lat., 1 1/2-1 3/4 mill.

Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883. (Dr Fromont.) Montevideo, Bahia. (Ma collection.)

Colaspis pusilla nov. sp.

Minor, oblonga, viridi-aenea, nitida, antennis nigris, articulis quatuor basalibus fulvis; capite inter oculos transversim impresso, vertice lævi, punctis nonnullis tantum disperse instructo; prothorace convexo, subtiliter sat dense punctulato, lateribus utrinque medio unidentato; elytris fortiter punctatis et ad latera, præsertim infra humeros, transversim subrugulosis, punctis juxta suturam et versus apicem lineatim dispositis; pedibus pallide fulvis, genubus posticis nigro-infuscatis. — Long., 2 3/4 mill.; lat., 1 1/2 mill.

Bahia, 13 décembre 1883. (Dr Fromont.)

Typophorus simplex nov. sp.

Obovatus, omnino cum pedibus rufo-fulvus, nitidus, antennis flavis; capite lævi, medio inter oculos fortiter transversim impresso, oculis mandibulisque nigris; prothorace lævi, in medio punctis nonnullis vix perspicue instructo; elytris prothorace basi latioribus, juxta callum humeralem longitudinaliter, et infra humeros transversim, impressis, striato-punctatis, punctis in impressione basali majoribus, ultra medium usque ad apicem omnino evanescentibus. — Long., 2 1/2 mill.; lat., 1 3/4 mill.

Rio de Janeiro (Jard. bot.), 15 novembre 1883. (Dr Fromont.)

INSECTES DÉTERMINÉS PAR M. DUVIVIER.

Lactina Fromonti Duvivier, nov. sp.

Convexe, ovulaire, entièrement d'un testacé rougeâtre, brillant, sauf la tête et les yeux, qui sont noirs; élytres finement et confusément ponctuées. — Long., 4 mill.

Rio de Janeiro, 15 novembre 1883. (Dr Fromont.)

Corps assez convexe, de forme ovulaire, entièrement testacé et brillant. Palpes d'un testacé pâle, à dernier article noirâtre; extrémité des mandibules et labre d'un brun de poix; tête et yeux entièrement noirs, vertex marqué de quelques points enfoncés, assez gros, autour des yeux; antennes subfiliformes, d'un testacé pâle, dépassant un peu le milieu de la longueur du corps. Prothorax transversal, presque deux fois aussi large que long, rétréci en avant, convexe, d'un testacé rougeâtre, brillant, marqué à la base d'un sillon transversal, profond et limité; angles antérieurs

arrondis, légèrement épaissis, les postérieurs obtus. Écusson triangulaire, convexe, lisse, brillant. Élytres oblongues-ovales, légèrement dilatées vers le milieu, brièvement rebordées, d'un testacé rougeâtre, brillant, couvertes d'une ponctuation fine et confuse. Épileures larges, dessous et pattes d'un testacé rougeâtre, brillant, avec les hanches, les deux paires de pattes antérieures, les tibias et les tarses postérieurs d'une teinte plus claire. Crochets tarsiens appendiculés.

Je dédie cette espèce à notre collègue et ami le Dr Fromont, à qui nous devons déjà plusieurs nouveautés pour la science.

Lactina subcostata ? Jacoby.

Un exemplaire provenant de Rio de Janeiro (15 novembre 1883) paraît appartenir à cette espèce, décrite et figurée par M. Jacoby, dans *Biol. Centr. Amer.*, VI, 1883, p. 273, pl. X-VI, fig. 13. D'après la description qu'en donne cet auteur, l'exemplaire que j'ai sous les yeux diffère de *L. subcostata* par les antennes entièrement noires, sauf le sommet du premier article, qui est rougeâtre, par les palpes et l'extrémité des mandibules noirs (M. Jacoby ne dit rien à ce sujet), par la côte marginale, d'un rouge prononcé, ainsi que la partie adjacente des épipleures.

Est-ce une espèce distincte? N'est-ce qu'une variété? L'exemplaire rapporté par M. le Dr Fromont, de son récent voyage, est en trop mauvais état pour me permettre de me prononcer à cet égard.

Ædionychis angusticollis.

Convexe, ovale, d'un testacé sale, brillant, avec les mandibules et les yeux noirs, les fémurs postérieurs et l'abdomen rembrunis; corselet rétréci en avant avec les angles antérieurs très proéminents; élytres densément et finement ponctués. — Long., 7 mill.

Brésil (Rio de Janeiro), 15 novembre 1883. (Dr Fromont.)

O. angusticollis Clk. mss.

Convexe, de forme régulièrement ovale, entièrement d'un testacé rougeâtre sale, brillant. Palpes testacés, mandibules et bord antérieur du labre noirs; tête d'un testacé sale, brillante, yeux noirs, assez gros; antennes brunâtres, de la longueur de la moitié du corps. Pronotum transversal, rétréci en avant, à bord antérieur échancré en demi-cercle; angles antérieurs très proéminents, surface peu convexe, bords latéraux dilatés et arrondis, entièrement d'un fauve sale, marqués de taches roussâtres et noirâtres; le sillon latéral peu profond. Écusson triangulaire,

plan, lisse, brillant, brunâtre. Élytres à peine plus larges que le corselet, convexes, régulièrement ovalaires, brièvement mais distinctement rebordées sur tout leur pourtour, entièrement fauves et couvertes d'une ponctuation fine et dense. Dessous et pattes d'un fauve sale, avec les fémurs postérieurs et l'abdomen fortement rembrunis.

M. Lefèvre nous transmet également la description d'un Eumolpide de Bahia.

Iphimeis fuscitarsis nov. sp.

Ovata, cyanea, violaceo-micans, nitida; capite sat fortiter punctato, juxta oculos ruguloso; labro, mandibulis antennisque nigris, harum articulis quatuor basalibus fuscis; prothorace medio leviter, ad latera fortius et crebrius punctato, punctis aciculatis; scutello lævi; elytris undique punctulatis, infra humeros utrinque transversim impressis; callo humerali ipso fortiter calloso; pedibus cyaneis, tibiis apice tarsisque omnino fuscis. — Long., 7 1/2-8 mill; lat., 4 1/2-5 mill.

Bahia. (de Lacerda.)

M. de Borre donne lecture de la lettre suivante, qui lui a été adressée par M. le Dr Aug. Puton :

Dans le Bull. de la Soc. Ent. belge, 1884, p. LII et LIII, M. Weyers et vous manifestez d'une manière incidente votre aversion pour les exhumations de noms archaïques, qui est si conforme à ma manière de voir, que je me permets de vous en témoigner ma satisfaction.

J'ai moi-même, après Schaum, Stål, de Marseul, Abeille de Perrin, etc., etc., combattu pour la même cause, ainsi que vous avez pu le voir dans mon article intitulé : « La loi de priorité et la loi de prescription » (Ann. Fr., 1880, p. 33) et dans la préface de mon Catalogue des Hémiptères, 1875, mais tout cela n'aboutit à rien; le nouveau *Catalogus Coleopterorum Europæ* ne fera qu'augmenter le mal par les excès de ces changements de noms, et si on n'y porte remède, la génération entomologique qui s'élève ne comprendra plus rien aux écrits de la précédente.

Je trouve, comme vous et M. Weyers, grotesques, ridicules, insensés, les changements de *Bruchus* en *Myiabriss*, de *Byrrhus* en *Cistela*, de *Ptinus* en *Bruchus*, etc., etc., qui vont faire de notre chère science une Babel entomologique. Je les déplore non seulement parce que la nomenclature binaire va devenir insuffisante, puisque les a-leptes de ces changements sont déjà obligés d'employer trois ou quatre noms et de dire, par exemple : *Myiabriss pisorum*

L. (*Bruchus pisi* auct.), *Cistela pitula* L. (*Byrrhus* auct. ¹⁾); je les déplore surtout parce que beaucoup de noms d'insectes sont sortis du domaine de la science spéciale pour tomber dans la science générale et même dans la science élémentaire. On apprend aux médecins, pharmaciens, etc., que les Mylabres sont des insectes vésicants qui peuvent remplacer la Cantharide; aux jardiniers, que les Bruches dévorent les graines des pois et des haricots. Tout cela devient faux! Quel ridicule pour les entomologistes!

Le nouveau catalogue s'est livré à de tels excès de changements de noms, que, sans la synonymie, il devient incompréhensible; mais les auteurs, dans leur zèle aveugle, ne se sont pas aperçus qu'ils ont attribué plusieurs fois le même nom ancien à deux espèces différentes (²); ce qui est la meilleure critique de cette manière de faire.

Mais sur tout cela, nous sommes parfaitement d'accord: le mal est grand, il grandit tous les jours; quel remède y opposer? Vous dites « par une résistance énergique, en restant obstinément attaché aux noms consacrés par l'usage de trois quarts de siècle ». C'est très vrai, mais c'est un moyen un peu platonique et peu efficace; il faut entrer résolument dans la lutte et opposer catalogue à catalogue. Je ne connais que ce moyen qui puisse avoir une réelle efficacité.

Pourquoi la Société belge, qui a de l'argent et, ce qui vaut mieux, des membres actifs, zélés et animés des meilleures intentions, ne publierait-elle pas un catalogue basé sur le principe de la priorité modérée par la prescription et surtout sur le principe du bon sens?

Ce catalogue, embrassant la faune paléarctique, généralement étudiée par tous les entomologistes de l'Europe, devrait être pratique et servir à la fois aux études, aux échanges et au classement des collections. Pour cela, une édition imprimée sur un seul côté ou sur une seule colonne (comme mon Catalogue des Hyménoptères) pourrait servir d'étiquettes ou de registre de notes et serait bien vite appréciée.

Chargez-vous de ce catalogue avec votre ardeur habituelle, vous rendrez grand service; trouvez des collaborateurs et ouvrez une souscription. Je m'inscris d'avance pour plusieurs exemplaires.

(¹) Cet *auctorum* est la meilleure preuve que le nom doit rester, et il devrait servir de pierre de touche dans les cas douteux.

(²) Exemples: *Curculio scaber* L. au *Trachyphloeus scaber* et à l'*Otiorhynchus septentrionis*. — *Dytiscus minimus* Scop. au *Budešsus geminus* Fab. et à l'*Hydroporus granularis* Lin.

M. Kerremans pense que nous devons déclarer que les entomologistes belges s'associent complètement à la réprobation que témoigne M. Puton contre des agissements qui font de la nomenclature entomologique un véritable gâchis. Il s'excuse sur son inexpérience d'avoir suivi le Catalogue de Stein et Weise pour les noms du Catalogue des Coléoptères de Belgique qu'il a publié en 1880. S'il avait à le recommencer aujourd'hui, il entrerait dans la voie de protestation conseillée par M. Puton.

M. Donckier fait remarquer qu'une nouvelle édition du Catalogue des Coléoptères d'Europe de M. de Marseul est en préparation et qu'on peut s'attendre à lui voir remplir le rôle d'antidote contre les catalogues allemands, qui chaque jour dépassent, en modifications des noms consacrés, les limites du vraisemblable.

M. Van Segvelt fait voir un exemplaire de la variété *spretus* du *Procrustes coriaceus* pris autrefois (6 juillet 1875) à Rumpst, près de Malines. L'existence de cette variété en Belgique était encore douteuse. L'exemplaire exhibé a les côtes caractéristiques de cette variété parfaitement marquées.

M. Devaux, qui avait dirigé l'excursion de la Société du 9 mars, n'étant pas présent à la séance, le rapport sur cette excursion, où étaient présents MM. Devaux, Kerremans, Lameere, Preudhomme de Borre, Remy, Vandervelde et Willain, est ajourné à la prochaine séance.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion du 11 mai. Sur la proposition de M. Weinmann, qui dirigera l'excursion, la localité choisie est une côte sablonneuse située au bord de la Lasne, entre le village de Genval et le hameau des Bourgeois. On partira de Bruxelles (Quartier-Léopold) à 8 h. 55 m. du matin, pour arriver à Rixensart à 9 h. 35.

M. Donckier annonce que notre collègue M. Dietz a à vendre d'occasion les tomes I à IV de *Naturgeschichte der Insekten Deutschlands*, d'Erichson, Schaum, etc. Il en propose l'acquisition pour la bibliothèque de la Société. Il sera statué sur cet objet à la prochaine assemblée mensuelle.

La séance est levée à 9 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 45.

Assemblée mensuelle du 3 mai 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergé, Capronnier, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, Devaux, Duvivier, Fologne, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lallemand, Lameere, Maurissen, Pfaff, Remy, Vanden Branden, Vandervelde, Van Nerom, Van Segvelt, Vernieuwe, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. de Bormans et H. Donckier de Donceel ont fait excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 avril est approuvé. Plusieurs erreurs typographiques sont signalées par MM. Roelofs et Duvivier dans les deux Comptes-rendus précédents et feront l'objet d'un errata.

Le Président annonce la perte que la Société vient de faire d'un de ses membres effectifs, entomologiste anglais distingué, sir Sidney Smith Saunders, décédé à Londres le 15 avril.

M. Joseph du Trieu de Terdonck, membre associé, a été admis, sur sa demande, au nombre des membres effectifs.

Le Président dépose un certain nombre de tirés à part des discours qu'il a prononcés au Sénat en faveur des sociétés scientifiques menacées de perdre les subsides que le Gouvernement leur accordait. M. le Ministre de l'Intérieur, devant ces protestations, est revenu à des dispositions plus favorables pour nous.

L'assemblée vote des remerciements à M. de Selys. Une lettre de reconnaissance sera aussi adressée à M. le professeur Crocq,

sénateur et président de la Société Royale Malacologique, qui, dans cette discussion, s'est joint à M. de Selys pour plaider la cause des sociétés scientifiques et de leurs publications.

Correspondance.

Le Secrétaire donne encore lecture de quelques réclamations qu'il a reçues au sujet de publications égarées à la poste. Il fait remarquer que l'envoi de nos bulletins renfermant ces plaintes à M. le Ministre des Travaux publics ne produit pas de résultats bien satisfaisants jusqu'à présent. Nos réclamations sont transmises hiérarchiquement à l'administration centrale des Postes, laquelle exige toujours que chaque réclamation donne lieu à de la paperasserie; en un mot, pour chaque numéro manquant, un imprimé est fourni, sur lequel l'expéditeur et le destinataire ont chacun à s'exprimer un quart d'heure pour répondre à dix-neuf questions posées en français et en flamand. Ce procédé n'a qu'un résultat : dégoûter le public de faire des réclamations. Prenons patience, en espérant que les employés de la Poste prendront désormais plus de soin de nos expéditions, avertis qu'ils ont été de notre mécontentement.

La Société des Sciences naturelles d'Offenbach nous annonce la célébration du XXV^e anniversaire de sa fondation, le dimanche 11 mai. — Une lettre de félicitations lui sera adressée.

La Société des Naturalistes de Berne nous adresse ses publications, ainsi que la Société Helvétique des Sciences naturelles.

La Société Entomologique Suisse nous fait un semblable envoi en nous accusant réception de l'envoi de nos *Annales*.

Les Académies des Sciences de Modène et de Cordoba, l'Institut Royal Lombard des Sciences et des Lettres et les éditeurs de *Science* nous remercient pour l'envoi de nos publications.

MM. E. Deyrolle, à Paris, et Steigerwald, à Chetebor (Bohême), envoient des catalogues d'insectes à vendre.

M. de Borre fait voir une loupe de la fabrication de F. Sartorius, à Göttingen. Ce genre de loupe, prise par demi-douzaine, coûte sept francs la pièce. Notre collègue M. E. Van den Broeck, qui lui a procuré cette occasion si avantageuse, se propose d'aller cette année à Göttingen et se chargera volontiers des commandes que ses collègues voudraient faire de loupes semblables. Adresser les demandes au Secrétariat.

Rapports, lectures, communications.

L'assemblée ajourne à la prochaine séance la lecture des rapports en retard sur les mémoires présentés à la séance précédente par MM. de Borre et Kerremans.

Le Secrétaire donne lecture du travail suivant :

DESCRIPTION D'UN COLÉOPTÈRE NOUVEAU DU CHILI

par le R. P. Fr. Marie-Joseph BELON, des Frères Prêcheurs.

En étudiant, pour les décrire, un certain nombre de Lathridiens provenant du Chili, j'ai rencontré, confondu parmi eux, un insecte que j'ai tout lieu de croire inconnu aux entomologistes. Du moins, malgré toutes mes investigations, il m'a été impossible de le rapporter à aucune des espèces publiées jusqu'ici. Aussi ai-je pris le parti de le décrire, ainsi que le genre nouveau dont il doit constituer le type. Cette publication, en même temps qu'elle fera connaître un type intéressant, aura, je l'espère, l'avantage d'attirer l'attention des savants sur cette bestiole microscopique, et d'encourager des recherches ultérieures sur son organisation et ses affinités, demeurées obscures en plusieurs points, comme sur ses mœurs et ses premiers états, dont nous ne savons absolument rien.

COLOVOCERIDA, nov. gen. (¹).

Corpus ovatum, convexum. Caput thoraci insertum. Mandibulae apice bifidae. Palporum maxillarium 4 articuli subæquales, oblongi; ultimo crassiore, ovato. Frons plana, ab epistomate haud distincta. Antennae retractiles, 11-articulatae, sub margine capitis insertae, 2 prioribus articulis longioribus subæqualibus; 3-9 valde transversis; clava subovali, bi-articulata (ultimo articulo multo minore atque inter pubem apicalem vix distincto). Oculi distincti, minimi, oblongi. Pronotum transversum, antice profunde emarginatum (angulis anticis acutis, usque ad oculos productis), basi arcuatum, angulis posticis rotundatis. Scutellum nullum aut inconspicuum. Elytra oblonga, basin prothoracis amplexentia; epipleuris ad humeros et metasternum latis, fere usque ad apicem distinctis. Prosternum obtriangulare, apice coxas anticas attingente. Mesosternum pentagonum, prosterni partem obtegens, ultra coxas medias triangulariter productum. Metasternum subtrapeziforme, antice versus coxas intermedias arcuatum, late inter coxas posticas productum ibique truncatum. Abdomen segmentis 5 compositum : 1^o longiore, linea femorali intus subarcuata et apicem fere attingente signato; 2^o, 3^o et 4^o brevioribus, subæqualibus; 5^o singulis præcedentibus longiore. Coxae anticae contiguae, 4 posteriores valde distantes. Acetabula antica retrorsum aperta. Femora dilatata,

(¹) *Colovocera*, nom de genre; εἶδος, forme.

ovata. Tibiæ robustæ, extus rectæ et versus apicem 6 aut 7 setis lateraliter instructæ, intus arcuatæ, pubescentes; calcaribus apicalibus inter setas vix distinctis. Tarsi 4-articulati; postici articulis simplicibus, longius ciliatis, 1^o et 2^o elongatis, fere æqualibus, intime unitis (sutura ægre distincta); 3^o brevior; 4^o duobus primis simul sumptis circiter æquali; unguiculis haud dentatis, simplicibus; onychio nullo (*).

Colovocerida unicurva Belon.

Oblongo-ovata, leviter convexa, ferruginea; confuse, parum dense ac subtiliter punctulata; breviter pubescens.  Long. circiter 1 mill.

Cet insecte a été recueilli au Chili, sans désignation plus spéciale de localité. M. Edm. Reitter l'avait reçu jadis de M. Kirsch, pharmacien à Dresde. Bien qu'il fût unique dans ma collection, je n'ai pas hésité à le sacrifier pour être à même d'en étudier plus complètement les diverses parties, que je conserve à l'état de préparats microscopiques.

Au premier abord, on dirait qu'il appartient au genre *Colovocera* Motsch., ou du moins qu'il doit rentrer dans la famille des *Lathridiidae* et faire partie avec elle de la tribu des *Merophysini*. La ressemblance extérieure est tellement frappante, qu'il est difficile de se défendre de cette impression, que j'ai traduite par le nom imposé au genre. Mais, lorsqu'on examine avec soin les détails de sa structure, on reconnaît bientôt qu'on a sous les yeux un nouveau cas de mimétisme comme on a déjà pu en constater plusieurs dans le domaine de l'entomologie. A défaut de renseignements sur les mœurs de ce minuscule coléoptère, j'ai dû me borner à rechercher dans son organisation les indices de ses véritables affinités et de sa place systématique la plus probable.

Malgré la présence de plaques fémorales sur le premier segment de l'abdomen, je ne pense pas qu'on puisse le rattacher aux *Coccinellidae*, dont il s'éloigne par un bon nombre de caractères assez importants. Il ne faut pas songer non plus à le ranger parmi les *Colydiidae*, bien que cette famille, où les tarses sont, comme ceux de notre insecte, composés de quatre articles simples, renferme des formes plus ou moins analogues à celles qu'on rencontre chez les *Lathridiidae*; mais, sans parler de quelques autres détails essentiellement différents, l'organisation des arceaux du ventre s'oppose

(*) A l'exemple de Le Conte et de plusieurs savants, je donne le nom d'*onychium*, non pas à l'article angulifère, mais à un appendice situé entre les crochets et armé ordinairement de deux soies, *Asterklaue* de Redtenbacher et de Seidlitz.

à cette réunion. Il semble plus rationnel d'introduire le genre *Colorocerida* dans la petite famille des *Mycetaridae*, telle qu'elle a été constituée par Jacquelin Du Val (*Gen. Col.*, II, p. 219), et plus récemment par M. Reitter (*Bestimmungs-Tabellen*, I, 1879, p. 22), car il en possède tous les traits principaux, et il ne paraîtra point déplacé à côté des types divers qui se rapprochent par la réunion d'un ensemble de caractères ayant une valeur incontestable.

Dans la lettre accompagnant cette note, M. Belon disait :

" Si quelques-uns de nos collègues possédaient dans leurs cartons quelques exemplaires de *Lathridiidae*, provenant soit du *Chili*, soit de la *Nouvelle-Zélande*, je leur serais bien reconnaissant de vouloir bien me les communiquer, car je prépare deux petits mémoires sur les Lathridiens de ces deux faunes, et les matériaux ne sont pas aussi nombreux que je le souhaiterais. "

M. Kerremans demande la parole et fait la lecture suivante :

A PROPOS DE LA LETTRE DE M. PUTON.

Il y a environ dix ans, notre confrère M. Gehin, dans ses remarquables *Lettres sur les Carabides*, se prononçait franchement contre les remaniements synonymiques auxquels se complaisent tout particulièrement nos confrères d'outre-Rhin, qui recherchent laborieusement dans des documents préhistoriques si telle espèce, admise par tout le monde sous un nom connu et consacré depuis longtemps par l'usage, ne doit pas être dénommée d'une autre façon de par l'autorité très contestable d'un entomologiste obscur dont les travaux étaient restés jusqu'ici ensevelis dans l'oubli ou l'indifférence.

Il citait, entre autres singularités, le cas du *Cychrus rostratus* Linné, que les partisans de la priorité à outrance auraient voulu changer en *Cychrus caraboides* Linné.

Ce Carabide, placé d'abord par Linné dans le genre *Tenebrio*, sous le nom de *Tenebrio caraboides*, fut reconnu peu après par l'auteur lui-même comme devant entrer dans son grand genre *Carabus* : il rectifia son erreur, et, pour éviter le pléonasme passablement vicieux de *Carabus caraboides*, il changea le nom spécifique en celui de *rostratus*, dont Fabricius fit, plus tard, le type de son genre *Cychrus*.

Ce qui n'était, il y a dix ans, qu'une tentative, est devenu aujourd'hui un fait accompli, de par l'autorité de MM. von Heyden, Reitter et Weise. On remarque, en effet, dans leur nouveau Cata-

logue, que le *Cychrus rostratus* s'appelle maintenant *caraboides*. On nous impose ainsi une erreur de l'illustre auteur du *Systema*, erreur corrigée par Linné lui-même, et l'on change un nom adopté par tous les entomologistes depuis plus de cent ans. C'est ce qu'on pourrait appeler le comble de la priorité !

Cette déplorable manie, dont nous avons pu apprécier les ennuis, pourrait bien être la source d'une petite exploitation qu'il importe de dévoiler dans l'intérêt des collectionneurs distraits ou... naïfs.

La plupart des marchands qui publient des catalogues de vente sont établis en Allemagne et en Autriche, où sévit particulièrement l'épidémie de la priorité. Ils s'empressent donc d'adopter le classement le plus récent, en même temps que le tout dernier nom adopté à chaque édition comme désormais le seul authentique et invariable. Mais les listes ainsi dressées ne mentionnent ni la synonymie, ni le nom d'auteur, ce qui fait qu'un commençant ou même un entomologiste très sérieux, mais momentanément distrait ou dérouté par ces remaniements, remarque, en pointant ces listes, qu'il lui manque, par exemple, le *Cychrus caraboides*, le *Bruchus Aubei*, la *Cantharis fusca* ou le *Mylabris pisorum*. Il commande ces espèces, dont il n'a jamais entendu le nom, reçoit des vulgarités telles que *Cychrus rostratus*, *Ptinus Aubei*, etc., et le tour est joué.

Il semble que là aussi il y ait lieu de se méfier de ces innovations vexatrices, que l'on serait en droit de qualifier d'une tout autre façon.

Quant à la prétendue atteinte que notre indifférence pour la *priorité quand même* semble porter aux droits sacrés de l'auteur d'une première description, si imparfaite qu'elle fût, je trouve cette raison étroite et mesquine, peu en rapport avec l'ampleur de vues qui distingue les vrais savants, et je doute que les Linné, les Fabricius, les Latreille et les Schönherr eussent réclamé la priorité avec l'âpreté que mettent aujourd'hui certains entomologistes à déterrer, à dénicher des manuscrits poudreux.

La vraie science, et c'est un de ses mérites, est modeste.

Enfin, si l'on constate, d'une part, qu'à chaque nouvelle édition de nouveaux noms remplacent ceux qu'à l'édition précédente on avait déclarés les seuls vrais et désormais invariables, et, d'autre part, que les noms consacrés par l'usage ont du moins l'avantage de rester fixes et immuables, on sera tenté d'admettre les derniers généralement adoptés.

Il est, du reste, un moyen bien simple d'éviter les difficultés de ces changements de noms, qui rendent, pour les commençants, les sciences naturelles si rebutantes. C'est de ne pas en tenir compte et de s'en tenir au nom donné par le monographe le plus apprécié d'un groupe ou d'un genre.

J'estime, pour ma part, qu'il y a, dans l'étude des sciences naturelles, trop de points restés douteux et encore plus de faits totalement inconnus pour s'amuser à des niaiseries pareilles.

Étudions les mœurs, décrivons des espèces et surtout les larves encore inconnues de la plupart de nos insectes indigènes, recherchons les lois de la distribution géographique, dirigeons nos efforts vers une classification raisonnée, et, si peu que nous fassions dans ce sens, nous rendrons à notre chère science plus de services qu'en décrétant, par exemple, que les *Plinus* sont devenus des *Bruchus*, ceux-ci des *Mylabris*, et les *Telephorus* des *Cantharis*, ce qui, comme le fait justement remarquer M. Puton, doit gêner considérablement les pharmaciens, qui croyaient les *Mylabris* et les *Cantharis* des vésicants, et les agriculteurs, à qui l'on apprenait à se méfier des *Bruchus*.

Qui sait? Nous apprendrons peut-être un jour que les *Goliathus* sont des *Bembidium*, et les Prioniens des Staphylinides, ce qui constituera un progrès réel et inappréciable pour l'entomologie.

M. de Borre dit qu'en 1684, un naturaliste suisse, Muralto, a très bien décrit la *Cetonia aurata* sous le nom de *Cantharis Aldrorandii*. Il est vrai qu'à la même époque, ce Muralto donnait le même nom de *Cantharis* à une espèce d'Hémiptère. Espérons qu'on ne va pas transformer pour cela les Cétonides en Cantharidides, ce qui aurait pour résultat de mettre d'accord les Vésicants et les Téléphorides, qui se sont disputé le nom de *Cantharis*.

M. de Borre donne ensuite lecture de la note suivante :

DE LA VALIDITÉ SPÉCIFIQUE DES *GYRINUS COLYMBUS* ER.,
DISTINCTUS AUBÉ, *CASPIUS* MÉNÉTRIÈS, *LIBANUS* AUBÉ
ET *SUFFRIANI* SCRIBA.

Pour commencer, je ferai remarquer que je viens d'examiner minutieusement environ deux mille exemplaires de Gyrins, tant de Belgique que de diverses autres contrées d'Europe et régions voisines; j'entends parler du genre *Gyrinus*, tel que le circonscrit M. le Dr Régimbart dans son travail monographique (*Annales de la Société Entomologique de France*, 1883).

De cet examen est résulté pour moi le plus grand doute sur la validité d'un certain nombre d'espèces assez généralement distinguées comme telles par les auteurs et où je serais plutôt disposé à ne voir que des variations, ou tout au plus des races d'une commune et bien légitime espèce, le *Gyrinus natator* Linné.

A côté de ce *Gyrinus natator* L., dont on avait séparé autrefois un *Gyrinus mergus* Ahrens, la plupart des auteurs qui ne s'occu-

pent que de la faune de l'Europe occidentale reconnaissent une deuxième forme spécifique, le *G. colymbus* Er., et parfois une troisième, le *G. distinctus* Aubé. M. Régimbart réunit *colymbus* et *distinctus* et, les fusionnant encore avec des formes orientales, le *libanus* Aubé et le *caspicus* Ménét., les réunit toutes sous ce dernier nom, le plus ancien des quatre : il remonte à 1833.

Quels sont les caractères qui distingueraient ce *caspicus* (Mén.) Régimb. du *G. natator* L.? En creusant bien les descriptions de tous les auteurs, je n'en trouve qu'un, plus ou moins satisfaisant. Il se résume dans ce que dit la dichotomie de M. Bedel (*Faune des Coléoptères du bassin de la Seine*, I, p. 285) :

Fond des élytres absolument poli *natator*.
 Fond des élytres (fortement grossi) semé d'un pointillé imperceptible *colymbus*.

Or, ceci est un caractère tout à fait subjectif, tout à fait subordonné au grossissement des lentilles dont dispose l'observateur, à l'acuité de sa vue, à la circonstance que celle-ci sera plus ou moins fatiguée. Avec de puissants grossissements, il n'est pas de *Gyrinus* qui reste absolument imponctué ; avec des grossissements peu intenses, tous paraissent lisses, et l'expression *imperceptible* employée par M. Bedel exprime trop bien combien ce caractère est illusoire. Ce serait, entre les *natator* et les *colymbus*, une limite trop difficile à saisir, trop facile à déplacer.

Pour ce qui est de la taille plus forte qu'on s'accorde à assigner au *colymbus*, il est assez naturel que, si la ponctuation se distingue mieux, ce soit sur des exemplaires de grande taille ; et il faut remarquer que, dans le *natator*, il y a de grandes différences de taille, comme généralement dans toute espèce commune et à distribution géographique vaste. Pour la nuance rouge des épipleures, de la poitrine et du segment anal, pour la forme de la troncature des élytres et de ses angles, pour l'intensité respective de la ponctuation striale du disque et des côtés de l'élytre, quand on examine par centaines les exemplaires du *G. natator*, ils nous offrent tant de variation à cet égard qu'il serait impossible, je crois pouvoir l'affirmer, de trouver un hiatus suffisant pour y placer la limite d'une espèce à en séparer par les susdits caractères, pris seuls ou réunis.

Ce qui m'a paru le plus plausible à admettre, c'est que les exemplaires des contrées de l'Orient, auxquels on a appliqué d'abord le nom de *caspicus* dans les provinces caucasiennes, et de *libanus* en Syrie, joignent à une taille assez forte une intensité relativement supérieure de cette *imperceptible* ponctuation des interstries. Mais il n'y aurait sans doute lieu d'y voir qu'une race

orientale du *Gyrinus natator* L., race moins concrète que ne l'est, par exemple, la race lithuanienne, plus courte et plus large, le *Gyrinus Wankowiczi* Régimb.

Dans nos contrées occidentales, les individus qui, par leur taille et leur ponctuation interstriaire apparaissant avec un effort oculaire moindre que pour les autres, se rapprochent de ces races orientales, ont donné lieu, un peu trop gratuitement, je pense, à la création de ces *Gyrinus colymbus* Er., et *distinctus* Aubé, qu'il n'est plus du tout possible de bien délimiter lorsqu'on se trouve en présence de milliers d'exemplaires réunis de tous côtés, au hasard et sans idées préconçues.

J'ai remarqué aussi que, dans sa notice sur les Gyrinides anglais (*Entomol. Monthly Magazine*, V, 1868, p. 57), notre savant collègue M. D. Sharp faisait du *G. distinctus* Aubé une espèce douteuse, une variété peut-être du *G. bicolor*. Cela voudrait dire que, dans les collections qui lui étaient soumises, on donnait le nom de *distinctus* à tout autre chose que dans les collections du continent. Rien, en effet, de commun entre les formes du *G. natator* et des espèces ou pseudo-espèces affines et les Gyrins à corps semi-cylindrique, tels que le *bicolor* et l'*elongatus*.

Il me reste à dire un mot du *Gyrinus Suffriani* Scriba. Mon doute sur sa validité spécifique n'est pas aussi accentué, mais j'incline également à penser qu'il ne réunit pas dans ses caractères diagnostiques ce qu'il faudrait pour en faire une véritable espèce. Il a la taille des petits exemplaires du *natator*. M. Bedel dit qu'il a le sommet des élytres retroussé; il serait sans doute plus exact de dire que tous les *Gyrinus* ont ce sommet retroussé et que les petits exemplaires qu'on appelle *Suffriani* l'ont plus retroussé que d'autres. L'oblitération plus ou moins complète du petit collier de points dessinant une strie fermée sur ce bout de l'élytre, est un caractère que j'ai observé chez des *G. natator* très typiques. La couleur plus foncée de l'épipleure ne dit rien, le *G. natator* offrant toutes les nuances, jusqu'à des exemplaires où elle est si assombrie qu'elle les rapproche du *G. marinus*.

Quand on suit les vieux errements des collections, tant publiques que privées, quand on veut limiter le nombre d'exemplaires appelés à y représenter les espèces, quand, à la chasse, au lieu de tout capturer, on veut commencer l'étude, on arrive à ne prendre et à ne conserver que des exemplaires choisis, où les différences s'accroissent, et, les intermédiaires n'étant pas en présence pour les rattacher, il n'est que trop aisé de découvrir des spécificités assez imaginaires et de méconnaître ce qu'il y a souvent de factice dans celles que nos devanciers ont cru reconnaître. Mais, si on veut se donner la peine de prendre les choses telles qu'elles sont dans la

nature, de rassembler des multitudes d'exemplaires les yeux fermés, sans se laisser entraîner à des triages qui nous égarent, si ensuite on s'impose la tâche lente d'un examen consciencieux de tous les matériaux, on arrive à des vues tout autres et qui aboutissent à cette conclusion :

Lorsqu'une espèce est très commune, très abondante, répandue sur une étendue de pays considérable, comme le *Gyrinus nator*, elle varie considérablement par tous ses caractères, et suivant les localités, et dans la totalité de son aire ; il s'y rencontre des races, des sous-espèces, des variétés, que, si l'on n'y prend garde, on élèvera à la dignité d'espèces. Soit ; appelons-les espèces, mais ce ne seront pas des espèces de la valeur des autres, car nous n'arriverons pas, quand nous nous priverons de faire des triages et éliminations arbitraires, à tracer entre elles ces limites précises de caractères qui font la véritable spécificité en zoologie.

Après cette lecture, M. de Borre fait circuler un exemplaire monstrueux de *Carabus auratus* offert à la Société par M. M. Kraus, et lit à ce sujet la communication suivante :

Le 10 avril dernier, le père de notre collègue, M. Kraus, a pris à Berbourg, dans le grand-duché de Luxembourg, une femelle du *Carabus auratus* offrant un cas de polymélie remarquable, consistant dans la présence d'une septième patte bien complète et très développée, quoique non utilisable, doublant la patte intermédiaire du côté droit. La cavité cotyloïde s'est élargie et la partie adjacente de la saillie antérieure du métasternum s'est par suite oblitérée, en même temps que l'épisternum se déformait en donnant naissance, vers son bord antérieur, à une protubérance large et pointue. De la cavité cotyloïde, immédiatement derrière la patte normale (laquelle est de tout point régulière et semblable à la patte gauche correspondante, chose rare chez les monstres), sort la hanche accessoire, un peu basse, présentant un trochanter aussi développé que celui de la patte normale ; la cuisse, de longueur ordinaire, est grêle et se déforme en s'arquant sous la cuisse normale, qui la comprime contre la protubérance épisternale dont j'ai parlé plus haut ; elle présente un bord fort plissé transversalement ; le tibia, de longueur égale au tibia normal, mais un peu atrophié en épaisseur et rugueux au sommet, continue cette courbure, en se portant en avant au-dessus de la patte antérieure, et il vient aboutir en face du bord antérieur du prosternum ; là commence un tarse de cinq articles, un peu plus courts que ceux de la patte normale ; ses crochets n'ont que la moitié de la taille des crochets de celle-ci. Ce tarse continue fortement l'incurvation

commencée par la cuisse et le tibia, de sorte que ce membre, que je n'ai pas vu, d'ailleurs, à l'état vivant, se présente comme une spirale assez irrégulière se glissant entre le corps et les deux pattes antérieures du côté droit et venant faire son dernier crochet sur le devant de la poitrine. Je remarque enfin que l'exemplaire lui-même n'a pas l'axe du corps bien droit, mais formant, au contraire, une convexité du côté où la nature l'a gratifié d'une patte de trop.

M. le Dr Fromont nous adresse les deux notes suivantes :

NOTE SUR L'ÉLEVAGE DES LARVES DE LONGICORNES
ET AUTRES XYLOPHAGES.

En écrivant ces lignes, je n'ai nullement la prétention de faire connaître du nouveau; depuis longtemps d'illustres observateurs ont publié des travaux remarquables sur ces matières, et il serait trop présomptueux de ma part de vouloir y ajouter quoi que ce soit. Mon but est simplement d'indiquer à mes jeunes collègues un moyen facile d'étudier une branche de l'entomologie qu'on néglige généralement beaucoup trop.

De nos jours, en effet, un grand nombre d'amateurs se bornent à capturer les insectes et à les classer dans des cartons sous des noms plus ou moins barbares, sans s'occuper le moins du monde de leurs mœurs et de leurs métamorphoses. Cependant, c'est dans cette étude qu'ils trouveraient le plus de jouissance et les surprises les plus imprévues.

On me répondra qu'il existe sur ces matières des ouvrages spéciaux, à l'aide desquels on peut acquérir des connaissances très étendues sans se fatiguer dans des recherches dès lors inutiles. Sur ce point, nous sommes d'accord, mais cela ne doit pas empêcher le jeune adepte de lire dans le grand livre de la nature et de vérifier par lui-même ce qu'il aura appris dans les travaux des spécialistes; un fait qu'il aura contrôlé lui-même acquerra plus de poids à ses yeux, et, n'eût-il que le plaisir d'obtenir pour ses collections des insectes d'une fraîcheur irréprochable, il serait déjà amplement dédommagé de ses peines.

Il y a quatre ans, en décortiquant des troncs de chênes morts, couchés dans la forêt de Soignes, je fus frappé de la prodigieuse quantité de larves de Longicornes qui creusaient leurs galeries sous l'écorce de ces arbres. Les insectes de cette famille étant loin d'abonder dans notre pays, l'idée me vint aussitôt de tenter l'élevage d'un certain nombre de ces larves, afin d'obtenir l'in-

secte parfait et d'étudier leurs métamorphoses, si cela était possible.

Ma tentative ayant réussi au delà de mes espérances, je l'ai renouvelée depuis, chaque année, en étendant le cercle de mes recherches, et les résultats que j'ai obtenus m'engagent à faire connaître le procédé que j'ai employé pour y parvenir.

Ce procédé, simple et facile à mettre en pratique, rend l'élevage des larves xylophages aussi aisé que celui des chenilles de Lépidoptères; il permet, en outre, d'étudier avec la plus grande facilité, et pour ainsi dire au coin du feu, les diverses phases de la vie larvaire et les métamorphoses ultimes de l'insecte.

Voici en quoi consiste ce procédé :

Taillez, soit dans le bois, soit dans l'écorce de l'arbre mort où vivent les larves, de petites lattes que vous ajustez deux à deux, de façon qu'elles se correspondent exactement comme les deux valves d'une coquille. Ces lattes étant ainsi accouplées, creusez dans l'une des deux une petite excavation de dimensions proportionnées à celles de l'insecte que vous désirez y placer : cette cavité étant achevée, déposez-y délicatement la larve et recouvrez à l'aide de la seconde latte, en ayant soin que le ver, en s'agitant, ne laisse passer hors de la cavité une portion quelconque de son corps, qui serait infailliblement écrasée lors de la fermeture des liens. Disposez alors autour de ces couples de lattes deux ou trois ligatures en fil de fer étamé, que vous serrez à l'aide d'une pince à torsion.

Ne placez jamais deux larves dans la même couple de lattes, car ces vers s'entre-tuent dès que leurs galeries viennent à se rencontrer.

Lorsqu'il s'agit d'élever des larves de grandes dimensions, au lieu de lattes, employez de petites bûches que vous fendez longitudinalement ; pour le reste, le procédé est le même.

Les dimensions de ces lattes ou de ces bûches doivent être proportionnées à la taille des larves, afin de leur procurer la nourriture en excès jusqu'à leur complet développement, sinon vous n'obtiendriez que des sujets de petite taille.

Parfois, cependant, quand vous commencerez l'élevage d'une larve *ab ovo* ou bien capturée dans le premier âge, il sera nécessaire de la placer d'abord dans des lattes de petites dimensions, faites d'écorce ou de bois tendre ; l'année suivante, vous la transférerez dans des bûches plus dures et plus volumineuses.

Voici, d'ailleurs, quelques dimensions qui donneront une idée exacte de la chose :

Larves de *Liopus nebulosus* et de *Callidium variabile* : lattes d'écorces de chêne mort, 10 cent. × 2 cent.

Rhagium inquisitor Fab., *Saperda scalaris* : lattes d'écorces de chêne mort, 20 cent. $\times$ 3 cent.

Strangalia melanura : lattes de sapin en voie de décomposition, 10 cent. $\times$ 2 cent.

Asemum striatum : petites bûches de sapin ramolli par l'humidité, 15 cent. $\times$ 2 cent.

Spondylis buprestoides : bûches de sapin, 15 cent. $\times$ 3 cent.

Prionus coriarius : bûches de hêtre ou de sapin légèrement pourri, 30 cent. $\times$ 4 ou 5 cent.

Quand vous aurez une certaine quantité de bûches ainsi préparées, il sera nécessaire d'indiquer chaque espèce de larve à l'aide d'un signe particulier fixé aux ligatures, afin de pouvoir, au besoin, retrouver l'espèce quand vous voudrez l'étudier.

Il faut aussi les disposer avec ordre, afin d'économiser la place tout en conservant une bonne aération ; le rangement en bûcher est bon, mais il a l'inconvénient de laisser trop de contact entre les bûches, ce qui permet souvent aux larves de passer d'une pièce dans l'autre, chose toujours fâcheuse.

Voici un moyen de remédier à cet inconvénient : Au fond d'une caisse large et peu profonde, enduite d'une bonne couche de couleur claire, et dont une des parois au moins est garnie de toile métallique, vous disposez des cadres allongés formés de petites tringles de bois ; vous placez là-dessus une rangée de bûches assez espacées les unes des autres pour ne pas permettre le contact ; sur cette rangée, vous disposez de nouveau des cadres supportant une seconde rangée de bûches et ainsi de suite : placez cette caisse dans un jardin, à l'ombre, en été, dans un grenier à l'abri des gelées, en hiver.

Cette disposition permet une aération parfaite, et, lors de l'éclosion, les insectes ne sont pas exposés à venir butter contre les bûches voisines ; la surface d'évaporation étant plus grande, les arrosements doivent être plus fréquents ; mais, par contre, elle empêche l'excès d'humidité, plus redoutable qu'un peu de sécheresse. Avec un peu d'habitude, on en arrive d'ailleurs bien vite à reproduire avec assez d'exactitude les conditions où se trouvent les larves dans l'état de nature.

Enlevez de temps en temps, à l'aide d'une brosse rude, les moisissures qui se développent sur vos bûches, et veillez à ce que des insectes carnassiers ne pénètrent pas dans la bergerie.

Défiez-vous des Staphylinides, des Carabiques et des fourmis, ainsi que des larves de certains Élatérides, Diptères et Hyménoptères, véritables vampires qui anéantiraient rapidement le fruit de vos efforts.

C'est ce motif qui, depuis longtemps, m'a fait renoncer à l'emploi

de la mousse pour entretenir l'humidité, parce qu'elle renferme une foule de germes de tout genre, Staphylins, Cloportes, Mille-pieds, etc.

Voilà donc vos larves ensevelies avec tous les égards dus à leur rang. Que va-t-il se passer? Elles vont commencer immédiatement leur travail de mineur, creusant des galeries multiples, se reposant de temps en temps pour effectuer leurs mues, et finalement, pour peu que vous leur ayez donné une aération convenable, une humidité suffisante et une chaleur modérée, elles vous récompenseront de vos bons procédés à leur égard en donnant naissance à des insectes robustes et de toute beauté.

Au point de vue de l'étude, voici les avantages qu'offre ce procédé : La section des ligatures et l'écartement des lattes vous permettent de vous rendre compte à tout instant de l'état des larves qui vous apparaissent à nu dans leurs galeries, ce qui est impossible lorsqu'on emploie les procédés à bûche d'une seule pièce, à moins de briser tout, chose dangereuse pour l'insecte et qui produit chez lui un ébranlement violent pouvant influencer notablement les phases de son existence ; tandis qu'avec le procédé à deux lattes, on ne détruit rien, la bûche s'ouvre et se referme comme une boîte, et l'effet produit sur la larve est à peu près nul.

Si l'on a donné trop d'épaisseur aux lattes, le ver peut s'y enfoncer entièrement au lieu de cheminer entre elles ; dans ce cas, il suffit de découvrir prudemment la galerie à partir du point où elle se transforme en tunnel, et l'on arrivera bientôt jusqu'à la fugitive, qui dévoilera les mystères de sa vie ténébreuse.

Ce procédé s'applique également bien à l'élevage des larves de Lucanides, Cétonides et autres Xylophages.

Si j'ai insisté aussi longuement sur ces détails, c'est afin d'éviter, à ceux qui voudraient expérimenter cet élevage, les nombreux mécomptes qui rebutent souvent les plus intrépides.

NOTE SUR LES MŒURS DU PRIONUS CORIARIUS.

Mon excellent ami M. H. Donckier de Donceel ayant eu l'obligeance de m'indiquer une localité habitée par le *Prionus coriarius*, j'y capturai, au mois d'août dernier, trois femelles vierges de cette belle espèce de Longicorne.

Loin d'immoler sur-le-champ mes captives, comme font la plupart des amateurs, je les conservai soigneusement en vie, afin d'observer leurs mœurs. Quelques jours après, j'eus la chance de prendre plusieurs mâles : j'avais dès lors tous les éléments nécessaires à la reproduction ; il ne me fallait que la bonne volonté de mes pensionnaires et, certes, elle ne me fit pas défaut. Quand on considère

les Priones se trainant lourdement sur les troncs, ou voletant pesamment au crépuscule, on ne soupçonnerait pas que ces Pachydermes à six pattes soient susceptibles de passions violentes, et cependant il est peu d'insectes aussi ardents en amour.

Au point de vue de l'alimentation, j'ignore complètement de quoi ces insectes se nourrissent; je leur ai offert en pâture une foule de substances, feuilles et bois d'essences diverses, fruits, sucre, miel, ils n'ont touché à rien, se bornant à lécher l'humidité qui se condensait sur les parois des flacons.

Connaissant par expérience le caractère peu sociable des Longicornes lorsqu'ils sont prisonniers, je les avais placés prudemment dans des bocaux séparés, afin d'éviter les mutilations. Munies d'une ample provision de fragments de hêtre pourri, les femelles se tenaient immobiles pendant la journée, se bornant à allonger de temps en temps leur tarière à l'extérieur; vers le soir, elles commençaient à se mettre en mouvement, parcourant leurs bocaux en tous sens.

Le 18 août, je leur présentai successivement un mâle que je venais de prendre, et, après plusieurs accouplements avec chacune des trois femelles, je le replaçai dans son bocal, m'attendant à le trouver mourant le lendemain. Erreur : je le retrouvai alerte et prêt à recommencer. Mais le surlendemain, il n'en fut plus de même; le Prione, épuisé, fuyait les femelles avec une terreur égale à l'empressement qu'il mettait la veille à les poursuivre.

La variété qui existe dans l'accouplement des Longicornes m'engage à donner quelques détails sur la manière d'agir des Priones.

Dès qu'un mâle a découvert une femelle, il se précipite avec impétuosité sur elle; cette dernière l'attend de pied ferme, ses pattes antérieures dirigées en avant, les autres fortement écartées du corps; les plus timides feignent parfois de fuir, mais ce n'est qu'un simulacre. Le mâle la saisit vigoureusement et l'enlace : le mouvement des thorax et le choc de ces corps massifs l'un contre l'autre paraissent une sorte de grincement analogue à celui que fait entendre l'*Acherontia Atropos* quand on l'inquiète. Ce bruit est assez intense pour s'entendre à plusieurs mètres, et quand il se reproduit plusieurs fois de suite, il permet de déceler la présence d'un couple de Priones dans un buisson.

Le mâle enlace l'abdomen de la femelle à l'aide de ses pattes antérieures croisées sous le ventre de cette dernière, un peu en avant des cuisses postérieures; ses pattes moyennes s'entrecroisent de la même façon en arrière de ces mêmes cuisses; quant à ses pattes postérieures, dirigées fortement en arrière, elles embrassent les parties latérales du pygidium et de la tarière dans l'angle

formé par la cuisse et la jambe. Les tarses prennent un point d'appui soit sur l'abdomen de la femelle, soit sur le plan où a lieu l'accouplement.

L'extrémité de l'abdomen du mâle s'incurve alors vers la tarière et, l'accrochant vivement, l'étire à la façon des ajutages d'un télescope. Parfois, la femelle darde elle-même sa tarière au-devant du pénis.

Pendant toute la durée de l'accouplement, qui ne dure guère plus de deux minutes, le mâle balance ses antennes en avant et ses palpes, agités d'un mouvement continu, caressent l'écusson et la base des élytres de la femelle.

Ces accouplements se répètent plusieurs fois de suite, le même mâle saisissant toutes les femelles qui sont à sa portée, et ces dernières acceptant successivement les approches de plusieurs mâles.

La fécondation opérée, la ponte ne commence que deux jours après; pour l'effectuer, la femelle cherche un endroit convenable, plongeant sa tarière, avec un soin minutieux, dans toutes les anfractuosités des écorces et dans tous les trous du bois pourri : la sensibilité tactile de cet organe paraît exquise. Quand l'endroit est reconnu propice, la tarière s'allonge d'une manière démesurée, pouvant alors atteindre jusqu'à 18 et 20 millimètres; elle livre alors passage successivement à plusieurs œufs que la femelle dispose en faisceau les uns à côté des autres. Ces œufs, pondus au nombre de 2 à 8 au plus, à la même place, se succèdent rapidement : il n'y a guère qu'un intervalle de 15 à 20 secondes entre la sortie de chacun d'eux; puis, la tarière se rétracte et l'insecte se met à la recherche d'un nouvel emplacement.

Blancs au moment de la ponte, ces œufs prennent une teinte citron au bout d'un quart d'heure, puis passent à l'orange et finalement au brun pâle. Mais cette couleur n'est visible que pour autant qu'ils soient humides, car ils sont revêtus d'un enduit leur donnant un aspect blanc sale quand ils sont secs. Leur forme est celle d'un cylindre légèrement fusiforme, arrondi aux deux bouts, long de 4 à 4,5 millimètres sur 1 à 1,2 millimètre de large.

La durée de la ponte varie de deux à trois jours; la femelle succombe épuisée immédiatement après.

Le nombre d'œufs pondus par chaque femelle varie suivant ses dimensions : des trois pondenses que j'ai élevées, les deux plus grosses m'ont donné 52 et 56 œufs; la petite, qui n'était guère plus grande qu'un mâle, ne m'en a pondu que 21; j'ai donc eu en tout 129 œufs.

Ces œufs, abandonnés à une douce chaleur dans des fragments de bois pourri et maintenus à un degré d'humidité convenable, ont donné naissance à de jeunes larves 37 jours environ après la ponte.

Sur ces 129 œufs, 15 se sont gâtés, 22 ne purent éclore, les larves n'ayant pu perforer leur coque; quant aux 92 restant, ils donnèrent naissance à de petites larves blanches munies de six petites pattes, armées de fortes mandibules noires et couvertes de longs poils incolores, qui se mirent aussitôt à ronger le bois autour d'elles pour se creuser une galerie. Elles ont 5 à 5,5 millimètres de long sur 1 millimètre de large.

Voici un résumé de mes observations avec les dates, ce qui permettra d'établir une moyenne :

Capture des femelles,	14 et 17 août.
Capture des mâles,	18 et 19 —
Accouplements,	18, 19 et 20 —
Ponte,	20, 21, 22 et 23 —
Mort des femelles,	22, 23 et 24 —
Éclosion des larves,	du 23 au 28 septembre.

Ces éclosions se sont réparties comme suit : 8 le 23; 11 le 24; 23 le 25; 26 le 26; 20 le 27; et 4 le 28.

La durée de l'incubation a donc été de 37 jours en moyenne.

Je dois citer ici un fait qui m'a frappé et qui prouve à quel point est développé l'instinct de la conservation chez ces larves.

Ayant capturé, quelque temps auparavant, de grosses larves de *Prione* dans des racines de hêtre mort, je ne trouvai rien de mieux que de placer mes jeunes élèves dans de petites bûches de ce bois, sans réfléchir que cette nourriture, bonne pour des larves robustes, ne convenait pas à des vers aussi délicats. Or, étant connue l'horreur de ces insectes pour la lumière, ils devaient périr d'inanition au cœur des bûches où je les avais placés. Eh bien, il n'en fut pas ainsi : au bout d'un temps plus ou moins long, variant de quelques jours à un mois, la plupart de ces larves perforèrent leurs bûches et je les retrouvai successivement au fond de ma caisse dans l'état où elles étaient quand je les avais séquestrées : elles avaient donc rongé ce bois trop dur pour elles, sans pouvoir y puiser les éléments nécessaires à leur accroissement.

En ouvrant ces bûches, je constatai que mes larves les avaient perforées en prenant le plus court chemin, c'est-à-dire en creusant une galerie à peu près perpendiculaire à l'axe des bûches.

Quelques-unes de ces larves seulement, placées dans des bûches dans un état de décomposition suffisant pour leur permettre de se développer, y creusèrent des galeries longitudinales et prirent de l'accroissement.

Actuellement, ces larves, placées dans de petites lattes d'écorce de chêne, s'y développent parfaitement.

Voilà, je pense, un fait qui permet de supposer que ces larves,

essentiellement lucifuges, peuvent dans certains cas sortir de leurs retraites, notamment quand les conditions nécessaires à leur développement viennent à se modifier de façon à compromettre leur existence.

M. Lameere fait la communication suivante :

J'ai l'honneur de faire passer sous les yeux de l'assemblée une boîte contenant :

1° Un *Aromia moschata* Linn. ♀ qui se trouvait dans la collection Colbeau, vendue récemment, et que son acquéreur, M. Van den Berghe, a bien voulu me céder. L'antenne gauche de cet exemplaire présente un cas de polymélie consistant en ce qu'elle est dédoublée à partir de l'antépénultième article, qui est élargi. L'un des moignons, l'interne ici, est moins développé que l'autre, comme il arrive toujours dans les exemples tératologiques de ce genre;



2° Un exemplaire ♀ de *Leptidea brevipennis* Muls., trouvé par M. H. Donckier dans un livre, à la vente de la bibliothèque et des collections de feu notre collègue Colbeau, dans la maison qu'il habitait à Ixelles;

3° Un exemplaire du *Tetropium luridum* Linn., var. *fulcratum* Fab., pris à Rouge-Cloître;

4° Un exemplaire pris à Ixelles, par M. Mélise, de la variété *praustum* Fab. du *Callidium variable* Linn., variété non encore signalée en Belgique;

5° Un exemplaire du *Clytus tropicus* Panz., pris par M. Kerremans, à Ocquier (province de Liège).

C'est la première fois que cette espèce est mentionnée comme prise authentiquement en Belgique.

M. de Borre cite une capture du *Gyrinus bicolor*, faite en juillet 1883, à Hastière-Lavaux, par M. Engels.

M. Kerremans demande la parole, annonçant qu'il proposera, de concert avec M. Bergé, à la prochaine assemblée générale, l'institution chaque hiver, sous les auspices de notre Société, d'une série de conférences entomologiques, qui auraient pour but de faire mieux connaître au public, et notre science, et notre Société. On se désintéresse trop, chez nous, de nos efforts et de nos travaux, qui restent ignorés, et voilà comment nous pouvons nous voir si facilement menacés dans nos ressources.

M. Bergé ajoute quelques idées relatives à la manière dont ces conférences s'organiseraient.

M. de Borre annonce que notre collègue M. Weyers est revenu d'Espagne, où il a fait un assez long séjour et effectué des récoltes entomologiques qu'il a distribuées à quelques-uns de nos membres, à condition que les listes en soient publiées par notre Société. M. Weyers vient de partir pour l'intérieur de Sumatra, et tous les insectes qu'il se propose d'y recueillir devront aussi donner lieu à des publications par notre Société.

M. Weyers a laissé en Belgique une collection de Coléoptères-Hétéromères européens qu'il avait récemment formée en acquérant celle de M. Zuber-Hofer et une partie de celle de M. Javet. Il est disposé à la céder au prix de 400 francs. Elle est contenue dans quatorze cartons. S'adresser au Secrétaire de la Société.

M. de Bormans nous adresse le travail suivant :

NOTE SUR LES ORTHOPTÈRES

RECUEILLIS PAR M. WEYERS, A AGUILAS, PROVINCE DE MURCIE (ESPAGNE).

Notre collègue M. Weyers ayant eu la bonté de me faire remettre un certain nombre d'Orthoptères pris par lui en Espagne, je saisis l'occasion de le remercier vivement et de faire remarquer combien sont intéressants les envois d'insectes de cet ordre, récoltés par les personnes même qui n'en ont point fait une étude spéciale.

Labidura riparia Pallas, ♂, ♀ et larve.

— *Dufouri* Desmarest, 1 ♂ (espèce rare).

Anisolabis maritima Bonelli, 2 ♂. Malgré d'actives recherches, on n'avait pu découvrir encore, en Espagne, cette espèce, répandue sur tout le reste du littoral méditerranéen.

— *annulipes* Lucas, 1 ♀.

Periplaneta orientalis L., 1 ♂.

Mantis religiosa L., 2 ♀.

Empusa egea Charp., 1 larve.

Tryxalis unguiculata Ramb., 1 ♂, 1 ♀ et larves.

Sphingonotus caeruleus L., 1 ♂.

— *azureus* Ramb., 1 ♂.

Pyrgomorpha grylloides Latr., 1 ♀.

Acridium aegyptium L., 2 ♂.

Caloptenus italicus L. var. *sicula* Burm., 1 ♀.

Euprepocnemis plorans Charp., 1 ♀.

Opomata cylindrica Marsh., 1 ♀. Grande et belle espèce, très rare, trouvée seulement en Sicile, Grèce, Syrie et à Minorque (îles Baléares).

Phaneroptera nana Charp., 1 ♂. Petite espèce très rare et plutôt africaine, signalée avec doute du Portugal (Fieber). Mon savant ami M. Bolivar l'avait d'abord indiquée de Valence (Espagne), mais il a reconnu depuis qu'il avait sous les yeux une autre espèce voisine.

Myrmecophila acervorum Panzer, 1 ♀. Minuscule espèce très curieuse de *Gryllodea*, vivant en société avec les fourmis. Elle est rare partout, et n'a été rencontrée en Espagne que tout récemment. (Valence et Alicante [Bolivar]).

Total : 17 espèces.

M. le Dr Heylaerts adresse la lettre suivante :

« Veuillez, s'il vous plait, rectifier une des assertions de mon avant-dernier travail. J'y ai dit que M. Henry Edwards a été le seul entomologiste des États-Unis qui a voulu me renseigner sur les espèces de sa patrie. C'était la vérité au moment où je l'ai dit, mais heureusement il n'en est plus ainsi. MM. les professeurs Riley et Packard junior m'ont envoyé, surtout le premier, une quantité de spécimens et des tirés à part. Avec ce que je possédais déjà de l'Amérique septentrionale en fait de Psychides, je peux dire maintenant avoir en collection la totalité des espèces de Psychides décrites par les lépidoptéristes nord-américains. »

M. Van Segvelt fait voir un exemplaire de la variété *confluens* du *Polyommatus Hippothoe* Linné (ci-devant *Chryseis* Hb.), pris à Poix par M. Lallemand. Il y signale comme une particularité remarquable que le cordon latéral de taches noires du dessous de l'aile inférieure gauche est beaucoup plus développé que sur le côté droit. Deux exemplaires de cette variété, qui se trouvent dans les collections du Musée royal, sont dans le même cas. M. Van Segvelt voudrait savoir, de ceux qui possèdent ladite variété *confluens*, si cette circonstance est assez générale.

M. Weinmann dit que nous pouvons espérer de reprendre à Arlon, dans l'excursion fixée à la Pentecôte, le *Polyommatus Hippothoe*.

M. de Selys rappelle l'avoir pris à Bouillon, mais, quoique rare, on le rencontre dans toute la partie orientale de la Belgique, puis- qu'on l'a pris jusqu'à Moresnet et à Berneau, près de Visé.

M. Lameere fait voir l'*Argyroneta aquatica* prise par lui à Rosières-Saint-André, près La Hulpe, et dont il observe plusieurs individus, qu'il tient captifs dans un aquarium. Il a vu le mâle se fabriquer une cloche, comme la femelle, pour dévorer plus commodément un ver de terre. Il entre dans quelques détails sur la manière dont ces araignées forment leurs cloches et les remplissent d'air.

MM. Devaux et Remy font voir quelques coléoptères (*Carabus intricatus*, *C. auronitens* var. *Putzeysi*, etc.) pris dans notre excursion du 9 mars, au sud de la forêt de Soignes.

M. Devaux a seul accompagné M. de Borre à l'excursion du 20 avril à la forêt de La Houssière. La localité semble favorable, mais ce jour-là, une bise très froide rendit la chasse à peu près sans résultat. Un *Leistus ferrugineus* a été pris par M. Devaux.

M. Devaux dit qu'il semblerait résulter de la lettre de M. Weyers lue à la séance de janvier dernier que, dans l'opinion de notre collègue, la petite *Cicindela maritima* Dejean ne se prendrait à Calmpthout qu'après que la saison de l'*hybrida* est passée, donc tout à la fin de l'année. Cela n'est nullement exact. Dans la collection du Musée, les exemplaires pris par M. de Borre mentionnent sur leurs étiquettes qu'ils ont été pris au mois de mai, et le 20 mai de l'année passée, MM. Devaux et Van den Branden, chassant ensemble à Calmpthout, en ont pris en même temps que des *hybrida*. C'est donc une espèce à rechercher toute l'année.

Une excursion à Calmpthout étant projetée pour le jeudi 22 mai, MM. Devaux et Weinmann signalent les points de cette localité sur lesquels il serait désirable de porter les recherches.

Le Président rappelle que l'excursion annuelle doit avoir lieu à Arlon, les dimanche et lundi 1^{er} et 2 juin. M. de Borre, qui se propose de la guider, assigne, pour lieu et heure du rendez-vous, la gare d'Arlon, à 7 1/2 heures du matin. Les entomologistes de la capitale pourront quitter Bruxelles par les trains partant le samedi soir, du Quartier-Léopold, à 4 heures (arrivant à Arlon à 9 h. 41 m.) et à 5 h. 56 m. (train rapide dit Malle des Indes, arrivant à 9 h. 51 m.), et loger dans les hôtels vis-à-vis la gare d'Arlon.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion ordinaire du mois de juin (dimanche 8 juin). M. Lameere, qui la guidera, fait choisir les bords de la Sennette et du canal, depuis les ruines du château de Fauquez jusqu'à Ronquières. On partira de Bruxelles (Midi) pour Hennuyères par le train de 6 h. 50 m. du matin.

La séance est levée à 9 1/2 heures.

ERRATA.

COMPTE-RENDU N° 43.

Page cxi, ligne 7, *au lieu de* : for, *lisez* : far.
 — — — 22, — sture — strive.

COMPTE-RENDU N° 44.

Page cliii, ligne 31, *au lieu de* : *Systema*, *lisez* : *Systema*.
 — — — 35, — Hald., — Harold.
 — — — 43, — F. J., — Fabr.
 — clvi, — 27, — **Lactina**, — **Lactica**.
 — clvii, — 11, — **Lactina**, — **Lactica**.
 — — — 25, *ajoutez* : Duvivier, nov. sp.

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 46.

Assemblée mensuelle du 7 juin 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergé, Capronnier, De Glain, Degouve de Nuncques, De Le Court, Demoor, Determe, Devaux, H. Donckier de Donceel, Du Pré, Fondu, Jacobs, Lameere, L'Arbalestrier, Remy, Vandervelde, Van Nerom, Van Rossen, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

M. Kerremans a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 mai est approuvé.

Le Conseil d'administration vient d'accepter, pour porter effet à partir du 1^{er} janvier 1885, la démission de M. Mertens, membre effectif.

Correspondance.

Le Comité d'organisation de l'Exposition universelle d'Anvers en 1885 nous transmet les programmes, prospectus et conditions de cette Exposition. Sur la proposition de M. Devaux, la question de la participation de notre Société à cette Exposition sera portée à l'ordre du jour de notre prochaine séance.

L'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie nous annonce que la session annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences aura lieu dans cette ville à partir du 3 septembre prochain. Elle nous invite à nous y faire représenter. Aucun des membres présents à la séance ne se proposant de se rendre en Amérique cet été, l'assemblée décide que M. le Dr Hagen, de Cambridge, l'un de nos membres honoraires, sera prié de vouloir bien nous représenter à Philadelphie.

La Société Royale Linnéenne de Bruxelles nous adresse le programme de ses conférences d'été et de ses herborisations. Ces dernières auront lieu : le 8 juin, à Droogenbosch et Beersel; le 22 juin, aux environs de Spa; le 20 juillet, à l'étang de Virelles, et le 10 août, à Bergh.

La Société d'Histoire naturelle de Boston nous remercie pour l'envoi de nos Annales et nous adresse ses publications.

La Smithsonian Institution, l'Essex Institute et le Musée national de Rio Janeiro nous remercient pour l'envoi de nos Annales.

La Société Hollandaise des Sciences, à Harlem, nous adresse ses publications et le programme des questions qu'elle a mises au concours. Aucune de ces dernières n'est du domaine de l'entomologie.

La Société Royale de Zoologie Natura Artis Magistra, d'Amsterdam, nous annonce l'envoi de ses publications.

M. Sharp nous annonce qu'il a quitté l'Écosse et s'est établi en Angleterre (Bleckley, Shirley Warren, Southampton).

La Société a reçu un numéro du journal *Le Mesos*.

Rapports, lectures, communications.

Le Président donne lecture des rapports de MM. Plateau et Mac Leod sur un mémoire de M. Preudhomme de Borre : *Tentamen Catalogi Lysiopetalidarum, Julidarum, Archiulidarum, Polyzonidarum atque Siphonophoridarum lucusque descriptarum*. Conformément aux conclusions de ces rapports, l'impression du travail dans les Annales, est votée par l'assemblée.

L'assemblée, après avoir entendu la lecture des rapports de MM. Candèze et Roelofs, prend la même décision pour le travail de M. Kerremans : *Énumération des Buprestides décrits postérieurement au Catalogue de MM. Gemminger et de Harold*.

M. H. Donckier de Donceel présente le manuscrit, accompagné de figures, d'un travail ayant pour titre : *Premiers états de quelques Cassidides exotiques*. — MM. Candèze et Duvivier sont désignés comme rapporteurs.

M. P. Mabille nous adresse le travail suivant :

DESCRIPTIONS DE LÉPIDOPTÈRES EXOTIQUES

par M. P. Mabille.

Charaxes Andranodorus nov. sp.

Statura et facie *C. Phraortæ*, cui similis. Alæ rubrofulvæ, margine lato, communi, nigro, amplæ. In disco anticarum series quinque macularum nigrarum secundum costam, et infra eam

altera series quinque macularum similium : quarum tres prioris seriei in cellula separatae, et alterius duae inferiores etiam distantes, duaeque intermediae inter se connexa ab aliis separatae.

Subtus alae lata fascia argentea communi sectae e costa usque ad spatium abdominale. Omnes maculae nigrae argenteo circumdatae. Posticae fasciam alteram argenteam offerunt antemarginalem, rubro interius obductam, exterius ochraceo. Spatium abdominale album quatuor lineis longitudinalibus sectum, una basilari curva, gracili rubra, et tribus nigris quarum duae primae in margine desinunt, quarta cum linea spissa, transversali, nigra confunditur.

Madagascar. Marem tantum vidimus.

Charaxes Zoippus nov. sp.

Paulo minor precedente, obscurior. Alae minus amplae eadem lineamenta maculasque offerunt, sed aliter disposita. Anticae duas habent maculas prioris seriei tantum distantes; omnes aliae inter se confusae aut connexae. Basis autem purpureo adumbrata.

Alae posticae tribus in basi maculis nigris notatae, diffusis.

Subtus alae posticae ut in specie priori, sed fascia minus lata, roseo lota, fascia antemarginalis griseo-argentea et marginis ipsius vitta superius rubro-fulva, inferius ochracea. Spatium abdominale album quatuor lineis sectum : basilaris autem fulva et sequens nigra, in marginem desinunt ambae : duae autem alterae cum licio nigro transversali confunduntur.

Madagascar.

Ces deux espèces, dont nous ne connaissons que les mâles, font partie d'un groupe déjà nombreux en espèces et difficiles à distinguer. Nous nous sommes décidé à les décrire après avoir cru longtemps pouvoir les rapporter soit au *Druceanus*, soit au *Cinadon*. Mais d'après les figures et les descriptions, le *Druceanus* est une espèce très différente, différant aussi de *Phraortes*. Le *Cinadon*, très éloigné de nos deux espèces, pourrait, au contraire, se rapprocher de *Phraortes* et, jusqu'à ce que nous en ayons vu une figure ou un exemplaire, nous penchons à le croire le mâle de cette rare espèce dont nous connaissons bien la femelle.

Mycalesis Benacus nov. sp.

Alae brunneae; anticae costa et apice nigris, marginibusque limbo lutescente, ocellum nigrum, vix pupillatum ferente inter tertium et secundum ramum nervi compositi prioris; lituraeque nigra in origine ramorum transversa et arcuata.

Alæ posticæ lutescentes, margine antico fusco; duo ocelli inter ramos prope marginem, qui dentatus et licio nigro duplici circumductus.

Alæ subtus luteo-griseæ, fascia communi angulata decoratæ, in anticis ad costam lata et altera breviori in cellula subjecta; in posticis gracili, ad analem angulum bifida: ocelli duo inter nervos punctaque nigra gemina in ipso angulo. Corpus supra fuscum, subtus lutescens.

Madagascar. E collectione Dom. Thierry-Mieg.

Hypolycæna renidens nov. sp.

Staturæ *H. Philippi*. Alæ nigrantes: anticæ cum parte interiore limbi viridi-azuræ: posticæ ad angulum angustatæ, cum parte exteriori limbi azuræ, tertioque ramo nervi compositi posteriori in caudam filiformem, nigram producto. Licium nigrum alam circumducit, et lobus analis maculam viridi-azuræ offert. Alæ subtus fuscae, lineolis albis sectæ, in basi posticarum tria puncta nigra, quorum superius ad costam majus, ante caudam in margine oculus rubidus nigro-maculatus, et in lobo anali macula nigra et viridis.

Corpus fuscum. Collare album. Palpi subtus nivei.

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un mâle, a une tache métallique d'un azur tirant sur le vert aux quatre ailes. Elle se distingue en outre par le dessous, où des dessins blancs forment des bandes à peu près comme dans le *Gambius* de Boisduval.

Trapezites fastuosus nov. sp.

Nous avons donné comme femelle à notre *T. Empyreus* un insecte d'une taille disproportionnée, à corps incomplet. Ayant reçu depuis la femelle d'*Empyreus*, nous considérons celle-ci comme une espèce séparée.

Ailes supérieures d'un brun noir sans dessins.

Ailes inférieures à bord externe sinué, à frange rouge vif, et portant deux bandes superposées: la plus intérieure rose et continue; l'extérieure maculaire.

Le dessous des ailes supérieures semblable, mais un peu roux. Les inférieures d'un beau rouge nuancé de noirâtre au bord externe. Cette couleur forme une rangée de quatre points parallèle au bord vers l'angle anal, et deux traits noirs le long du bord abdominal. Le disque offre quatre grosses taches d'un blanc argenté, placées trois en triangle sur la base, et une isolée en face

l'angle anal. Corps brun. Corselet et poitrine hérissés de poils jaunes.

Madagascar.

Plesioneura Humbloti nov. sp.

Statura *Pl. Eligii* Fabr. Alæ fuscae; anticae cum decem punctis argenteo-hyalinis, in duas series divisae. Prior in media ala habet maculas duas latas et tria minima puncta; altera in ramis et ante apicem tria puncta coadunata ad costam offert et paulo inferius duo altera transversa. Alæ posticae intense fuscae, unum habent punctum, rotundum, rubidum inter ramos: fimbria albo secta. Subtus alæ similes. Sed punctum posticarum luteum. Pectus fulvo-signatum; palpi nivei, articulo tertio nigro. Pedes postici fere nudi, bi-calcarati.

Cette belle espèce est d'autant plus intéressante que le genre était jusqu'ici étranger à Madagascar. Il est commun en Asie et à peine représenté en Afrique.

Nous avons dédié cette espèce à M. Humblot, qui nous a envoyé, il y a plus d'un an, un certain nombre de bonnes espèces de Lépidoptères.

Pamphila gemella nov. sp.

Alæ brunneo-olivaceae. Anticae punctis albis distinctae ut in *P. borbonica*: unum minimum supra extremam cellulam, tria apicalia approximata et quatuor in seriem curvam in disco posita; quorum duo inferiora majora.

Alæ posticae leviter sinuatae, fimbria albida, angusta.

Subtus alæ similes, sed pallidiores. Posticae tria puncta habent, unum ad marginem anticum et duo inter ramos nervi compositi posterioris.

Species affinis *P. borbonicae*, sed habitu, colore, statura certe diversa.

Madagascar.

Sphinx œgrapha nov. sp.

Statura *Smer. tiliar*, griseo-brunnea. Alæ anticae ad costam latae, obscuriores, albido-variegatae, cum puncto discoidali minimo albo. Ultra mediam alam spatium pallide griseum e costa ducitur sub apice usque ad marginem externum. In illo spatio nervi virgulis nigris exasperati.

Alæ posticae fuscae, fimbria albida, obscure interruptae.

Alæ subtus omnino fusco-cinereae. Corpus supra nigrum, subtus

albidum, pedes quoque. Palpi fusci. Antennæ fuscae, graciles, mucrone parvo, inflexo.

Madagascar.

Cette espèce est tout entière d'un brun de bois pourri. Une bande mal définie d'un gris cendré clair naît sur la côte des premières ailes, contourne l'apex et aboutit au bord externe; les nervures sont marquées sur cette bande de points noirs en séries parallèles et l'attache de l'aile est gris cendré.

Syntomis zygænoides nov. sp.

S. alis anticis nigris cum puncto basali luteo et serie duplici macularum lutearum semi-hyalinarum. Alis posticis luteis, nigro-marginatis et apud foeminam nigro-punctatis.

Cette espèce a le port et l'aspect de *Myodes*, mais elle s'en distingue tout d'abord par une tache placée à la base de l'aile et qui est jaune. Elle a ensuite une grande tache médiane, divisée en trois par les nervures; la costale est réduite à un trait jaune et l'intermédiaire est hyaline, surtout chez la femelle. Deux autres taches sont situées au bout de l'aile; l'inférieure touche le bord externe.

Les ailes inférieures sont jaunes avec une faible bordure noire et portent un point noir chez la femelle, placé près du bord antérieur.

En dessous, les taches de la base et du milieu de l'aile sont confluentes et un petit point noir marque seul leur séparation.

Le corps est jaune avec une raie dorsale jaune et le dernier anneau noir.

Madagascar.

Syntomis muscella nov. sp.

S. alis anticis cum quatuor maculis luteis; quarum una basilaris in speciem fasciæ, secunda et duabus maculis efformata, tertia unica in alæ extremitate. Alæ posticæ luteæ, nigro-marginatæ. Caput nigrum, collare luteum, antennæ luteæ.

Les ailes supérieures sont noires. Une tache jaune basilaire touche les deux bords, s'élargissant beaucoup au bord interne; puis deux taches, qui communiquent, occupent le milieu de l'aile. Une seule, isolée, est à l'extrémité. Ces taches sont grandes et jaunes.

Les ailes inférieures sont petites, jaunes et bordées de noir. Le corselet est noir, l'abdomen jaune avec une raie noir médiane.

Madagascar.

Agarista Epipales.

L'*Agarista Pales* Bdv. nous paraît renfermer deux espèces. Le type a les ailes supérieures traversées par une bande blanche maculaire, ou fortement dentée, et porte toujours un point blanc entre cette bande et le corps.

L'A. *Epipales*, que nous en distinguons, a les ailes supérieures aiguës, longues et étroites, d'un beau noir. Elle diffère de *Pales* par la tache blanche, un peu arquée, mieux circonscrite, à peine dentelée extérieurement, par l'absence du point blanc basilaire. La tache bleue des ailes inférieures est plus petite, presque ronde; l'abdomen est très noir, avec les flancs jaune foncé.

Je ne connais pas la femelle et j'ai vu un grand nombre de mâles tous semblables. Elle peut varier, car j'ai un mâle où la tache blanche a tout à fait disparu.

Madagascar.

Lithosia cocciniceps nov. sp.

Lithosia paulo major L. rubricolli. Alæ omnes intense nigræ, fimbria concolori. Caput, collare, scapulæ, thorax et primus abdominis annulus colore vivide rubido. Subtus pectus rubidum, necnon pedes et alarum origo.

Cette espèce est d'un noir profond avec un léger reflet bleu d'acier. La tête, le thorax, l'origine des ailes et le premier anneau de l'abdomen sont d'un rouge vif. Les antennes sont noires, la femelle a l'anus rouge.

Madagascar.

Ametropalpis nasuta nov. sp.

Alæ omnes intense nigræ, corpusque. Alæ anticæ vitta nivea, transversa, recta sectæ e costa usque ad marginem internum.

Subtus alæ minus nigræ, vitta paulo latiori marginibus leviter diffusa.

Caput brevius, parvum, palpis prælongis ter caput æquantibus, compressis, nigris, squamosis, articulo primo brevi, secundo longissimo, ultimo breviori. Lingua longa caput et thoracem æquans.

Madagascar.

Genus incertæ sedis, forsan ad *Callimorphas* referendum, sed potius ad *Lithosias*.

Dasychira phæosericea nov. sp.

Alæ anticæ albo-luteæ sericeæ, lineis maculisque fuscis variegatæ et reticulatæ. In media costa tænia lata fusca, infra cellulam

ad marginem internum tendit. Basis alarum albescens. Alæ posticæ luteæ, immaculatæ. Subtus alæ omnes luteæ, thorax fuscus, antennæ fuscae.

Madagascar.

Ophisma leucochiton nov. sp.

100 mill. Alæ anticæ falcatæ, linea fusca ex apice ad medium marginem internum in duas partes divisæ : superior ex albo cum thorace leviter fuscescens ; inferior grisea ad angulum albescens.

Alæ posticæ albæ, ut et abdomen. Alæ subtus albæ, pectore lutescente.

Cette grande espèce est presque toute blanche. Les ailes supérieures sont falquées et divisées en deux parties par une raie oblique, brune, partant de l'apex. La partie supérieure et le corselet sont d'un blanc de crème, un peu nuancé de jaunâtre ou de gris pâle. L'inférieure est ombrée de gris brun et l'angle interne est plus blanc.

Les ailes inférieures sont blanches, ainsi que l'abdomen.

Le dessous des quatre ailes est blanc. La poitrine, l'abdomen et les pattes sont couverts de poils jaunes, ainsi que l'origine des ailes. Les supérieures ont, en outre, l'apex ombré de gris jaunâtre.

Madagascar.

Ophiodes minians nov. sp.

Ophiodes *O. parallela* statura. Alæ anticæ fusco- et rubido-marmoratæ, duobusque lineis in medio sectæ inter quas maculæ solitæ albo-argenteæ.

Alæ posticæ immaculatæ, miniatæ. Subtus alæ omnes miniatæ, sed pallidiores.

Thorax rubro-fuscus ; abdomen dilute miniatum.

Les ailes supérieures sont nuancées de brun rouge clair et de vermillon. Deux lignes noires, fines, traversent le milieu de l'aile, isolant entre elles un trapèze irrégulier, où les deux taches ordinaires sont d'un blanc argenté. Une troisième ligne antéterminale noirâtre, très fine, sépare une bande marginale plus grise que le fond.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un rouge vermillon. Le bord abdominal est muni de longs poils flexueux.

Cette curieuse espèce est la réduction des *M. discolor* et a tous les caractères de l'*O. parallela*.

Madagascar.

Euclidia remigina nov. sp.

Alæ anticæ brunneo-violaceæ, margine externo tenia dilucida subochracea occupato, cum licio nigro, tenui in limbo. Duæ fasciæ violaceo-nigræ, prior angulata, ante apicem incrassata et linea tenui, ejusdem coloris geminata quæ in rames nervi compositi prioris e fascia removetur et ad costam tendit; altera basilaris, obliqua ad marginem internum dilatatur, maculæ ordinariæ dilutiores, parum distinctæ. Alæ posticæ luteæ, late nigro-marginatæ. Subtus alæ luteæ, disco anticarum fusco. Caput et palpi fulvo-rubri.

Madagascar.

Le Secrétaire donne lecture de la note suivante :

NOTE SUR QUELQUES ESPÈCES DU GENRE CARTODERE THOMS.

par le R. P. Fr. Marie-Joseph BELON, des Frères Prêcheurs.

Parmi les Lathridiides des États-Unis, le Dr Le Conte comprend le *L. filiiformis*, espèce européenne qu'il croit avoir été importée avec des articles de commerce. (Voir *Proceed. Acad. Phil.* April 1855, p. 304.) A l'époque déjà éloignée où il rédigeait ce mémoire, il en connaissait seulement deux exemplaires, l'un capturé dans le Missouri, et l'autre à Philadelphie. La courte diagnose qu'il en donne s'applique convenablement à l'insecte de Gyllenhal; toutefois, l'indication du tableau synoptique (*oculi superni*) est de nature à induire en erreur, puisque les yeux sont latéraux comme chez tous ses congénères. Depuis lors, les collections américaines doivent sans doute renfermer des matériaux plus nombreux, à l'aide desquels nous apprendrions si la *Cartodere filiiformis* faisait originellement partie de la faune septentrionale du Nouveau Monde, ou si, comme tant d'autres coléoptères voyageurs, elle s'y est naturalisée.

Je ne suis point en mesure de donner sur ce sujet de nouveaux renseignements. Mais, en examinant deux échantillons innommés de ma collection, qui proviennent de l'Amérique du Nord sans indication plus précise de localité, j'ai remarqué avec surprise que leurs yeux, au lieu d'être, comme ceux de la véritable *C. filiiformis*, très petits, à peine saillants, et suivis par des tempes distinctes, quoique courtes, étaient relativement gros, assez proéminents, et situés tout à fait à l'arrière de la tête.

Mon attention fut d'autant plus vivement attirée par cette particularité que je venais de lire dans la *Wiener entomologische Zei-*

tung (15 février 1884, page 35) la note où M. Reitter signale, sous le nom de *C. Argus*, une forme jusqu'ici inobservée, qui présente ce même caractère et se distingue ainsi à première vue de la *C. filiformis*. Cette espèce nouvelle, dont je possède deux types, grâce à la générosité de son auteur, est établie sur des exemplaires recueillis en Bohême par le Dr Skalitzky, en Hongrie par le Dr Kaufmann, et à Oran par Leder; mais son habitat doit être aussi étendu que celui de la *C. filiformis*, avec laquelle elle est probablement confondue dans les collections. En tout cas, elle appartient certainement à la faune française, car je l'ai capturée au vol dans une rue de Marseille, au mois d'avril 1882, et j'en ai retrouvé un échantillon parmi des *C. filiformis* provenant de Paris, que j'avais négligé d'examiner de près lorsque je rédigeais ma monographie des Lathridiens de France.

La première pensée qui me vint à l'esprit par suite de cette découverte, c'est que la *C. Argus* était cosmopolite et que mes individus américains en fournissaient la preuve. Cependant, un examen plus attentif me fit bientôt découvrir des différences essentielles, qui justifient leur séparation spécifique sous le nom de :

CARTODERE INTERMEDIA Belon.

Elongata, angusta, depressiuscula, glabra, testacea. Oculi grossi, temporibus fere nullis. Antennarum clava bi-articulata. Prothorax rugosus, cordatus, transversus, antice coleopteris haud angustior, lateribus late marginato-explanatis; ante basin transversim fere æqualiter impressus, in medio disci anteriore non foveolatus, sed evidenter deplanatus. Elytra linearia, humeris vix angulatis, fortiter 7-striatopunctata, interstitiis angustis, subaqualibus, lævibus. — Long., 1,3 mill.

Habitat Americam septentrionalem.

L'espèce que je viens de décrire appartient au groupe caractérisé par des yeux assez rapprochés du bord antérieur du pronotum, par un corselet court aussi large en devant que les étuis, par les élytres à 7 stries avec les intervalles non costiformes. On peut dire qu'elle est intermédiaire entre les *C. filiformis*, *Argus* et *filum*. Elle a, en effet, la taille, la forme et l'aspect général de la première, mais ses yeux sont conformés comme dans les deux suivantes; et si, d'autre part, la massue de ses antennes est biarticulée, ainsi que celle de la *C. filum*, l'absence de fossette médiane sur la partie antérieure du pronotum la sépare nettement de celle-ci. J'ai cherché à exprimer ces rapports et ces dissemblances dans le tableau suivant, qui permettra de distinguer sûrement et facilement l'espèce nouvelle de ses congénères:

Massue des antennes triarticulée. Corselet sans fossette sur la partie antérieure du disque.

Yeux très petits, distinctement éloignés du pronotum par des tempes courtes. Impression transverse uniforme au devant de la base prothoracique **filiformis** Gyll.

Yeux assez gros, dépourvus de tempes et presque contigus au bord antérieur du corselet. Impression antébasilaire de celui-ci trifovéolée **Argus** Reitt.

Massue des antennes biarticulée. Yeux assez gros, dépourvus de tempes et presque contigus au bord antérieur du corselet. Impression antébasilaire de celui-ci uniforme.

Point de fossette médiane sur la partie antérieure du pronotum **intermedia** Belon.

Une fossette médiane arrondie très nette sur la partie antérieure du pronotum **filum** Aubé.

Reste à savoir maintenant si la *C. filiformis* mentionnée par le Dr Le Conte est réellement identique à notre espèce européenne, ou si elle ne se rapporterait pas plutôt à mon *intermedia*. Nonobstant l'expression *oculi minuti*, cette dernière supposition n'aurait rien de surprenant, si l'on considère que les yeux de l'*intermedia*, quoique relativement assez gros et proéminents pour le genre *Cartodere*, mériteraient encore d'être appelés petits par comparaison avec ceux des *Lathridius* vrais, auxquels seuls ils sont opposés dans le tableau synoptique. Quant au caractère différentiel tiré du nombre des articles qui composent la massue antennaire, la diagnose ne le mentionne pas, il est vrai; mais il peut très bien avoir échappé à la perspicacité de l'auteur américain. C'est aux entomologistes des États-Unis qu'il appartient de résoudre la question, et je me borne à signaler mes doutes, afin d'attirer l'attention de mes savants collègues sur un point qui concerne la connaissance de la diffusion géographique aussi bien que la nomenclature et la synonymie des espèces.

M. Lefèvre nous adresse le travail suivant :

DESCRIPTIONS

DE QUATRE GENRES NOUVEAUX ET DE PLUSIEURS ESPÈCES NOUVELLES
DE COLÉOPTÈRES DE LA FAMILLE DES EUMOLPIDES

par Ed. Lefèvre.

Spintherophyta cyanea. Breviter ovato-rotundata, convexa, subtus viridi-aenea, supra cyanea, labro, mandibulis, antennisque

nigris, harum articulis sex basalibus rufo-fulvis, epistomate subarcuatim emarginato, capite opaco, subtiliter remote punctulato; vertice rugulis nonnullis ad latera utrinque notato; prothorace crebre undique sat fortiter punctato, subopaco; scutello lævi, nitido; elytris nitidis, dense seriatim grosse punctatis, versus apicem obijuxta marginem lateralem utrinque longitudinaliter elevato-substriatis, callo humerali subtumido, lævi; pedibus viridi-æneis, femoribus interdum basi magis minusve rufo-fulvis. — Long., 3-3 1/2 mill.; lat., 2-2 1/2 mill.

Mexico (ma collection).

S. aulica. Breviter ovato-rotundata, convexa, subtus cum pedibus nigra, supra saturate violacea, nitida, labro cyaneo, antennarum articulis sex basalibus cyaneis, inferne obscure rufo-fulvis, quinque ultimis nigris; capite subopaco, subtilissime punctulato; epistomate subarcuatim emarginato; prothorace in medio modice, ad latera crebrius punctato, punctis aciculatis; scutello lævi; elytris subtilissime et subgeminatim punctulatis, versus apicem evidenter elevato-substriatis, callo humerali utrinque subcalloso, lævi. — Long., 3-3 1/3 mill.; lat., 1 3/4 mill.

Brasilia (ma collection).

Chrysodina ephippium. E minoribus, subrotundato-ovatus, convexus, fulvo-brunneus, antennis pedibusque dilutioribus, illis apice nigricantibus; prothorace minute parum dense punctulato; elytris subseriatim punctatis (punctis ad latera majoribus, versus apicem autem evanescentibus), juxta suturam fortiter unistriatis, ad latera pone humeros macula parva et in medio disci altera magna communi rotundata, lateraliter excisa, a basi usque ultra medium extensa, nigro-subaneis. — Long., 2 1/2-2 3/4 mill.; lat., 1 1/2 mill.

Brasilia (ma collection).

Chrysolampra cyanea. Oblongo-subelongata, subtus viridi-cærulea, *supra cyanea*, violaceo-micans, ore palpisque fuscis, antennis nigris, articulis tribus basalibus brunneo-fulvis; capite sat fortiter remote punctato, inter oculos transversim impresso, supra antennarum, insertionem spatio lævi tumido viridi-metallico utrinque notato; thorace punctis minutis et majoribus intermixtis undique instructo; scutello lævi; elytris irregulariter prope suturam subseriatim punctatis; pedibus viridi-cæruleis, tibiis apice tarsisque nigro-fuscis. — Long., 6 mill.; lat., 3 mill.

China borealis (ma collection).

Agrianes versicolor. ♂ Oblongo-elongatus, convexus, subtus nigro-æneus, capite punctulato, inter oculos foveolis duabus

instructo, epistomate declivi, apice subarcuatim emarginato, antennis validissimis, rufis, articulis 6-8 apice, tribusque ultimis omnino, nigris; prothorace laevi, nitido, punctis nonnullis minutis hic illic vix perspicue notato; scutello laevi; elytris seriatim sat fortiter geminatim punctatis, ad latera transversim rugulosis, versus apicem punctato-striatis, interstitiis convexis, levibus; pedibus rufis, tibiis apice tarsisque brunnéis. — Long., 5-5 1/2 mill.; lat., 2 1/2-2 3/4 mill.

Var. α . Capite prothoraceque rufis, elytris metallico-viridibus.

Var. β . Capite prothoraceque nigris, elytris saturate violaceo-purpureis, nitidis.

Brasilia (ma collection).

Agbalus hilaris. Ovatus, convexus, aeneus, supra nitidissimus, certo situ cupreo-reflexo micans, labro, palpis antennisque fulvis, his apice nigris; thorace dense minute punctulato, punctis aciculatis, lateribus utrinque late reflexo-marginato; scutello laevi; elytris infra humeros late subtiliter impressis, sublineatim punctatis (punctis ad latera majoribus, ibique strigis nonnullis transversim intermixtis), prope marginem lateralem utrinque costula longitudinali, versus apicem magis elevata, instructis, callo humerali laevi; pedibus viridi-aeneis, femoribus basi, tibiis apice tarsisque magis, minusve rufo-brunnéis. — Long., 5 mill.; lat., 3-3 1/2 mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; tibiis duobus posticis intus calcare acuto armatis.

Cayennæ, Brasilia (ma collection).

A. Klugii. Ovalis, convexus, subtus nigro-aeneus, supra saturate cyaneus, interdum violaceo-purpureus aut viridi-auratus, nitidus, labro, palpis antennisque fulvis, his apice nigris; thorace alutaceo, creberrime strigose punctato, lateribus utrinque late reflexo-marginato; scutello punctulato; elytris infra humeros late evidenter impressis, dorso sublineatim, ad latera fortius et substriгатim, punctatis, juxta suturam unistriatis, prope marginem lateralem costula longitudinali, versus apicem magis elevata, instructis; pedibus rufo-fulvis, tarsis cyaneis aut violaceo-purpureis. — Long., 5-5 1/3 mill.; lat., 3-3 1/3 mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; tibiis duabus posticis intus calcare valido, apice longe pubescente, armatis.

Brasilia (ma collection).

A. strigatus. Ovalis, convexus, aeneus, nitidus, labro, palpis antennisque brunnéis, his apice nigris; thorace creberrime punctato, lateribus utrinque late reflexo-marginato; scutello punctulato; elytris infra humeros late evidenter impressis, dorso sublineatim, ad latera fortius et substriгатim, punctatis, juxta suturam unistriatis, prope marginem lateralem costula longitudinali, versus apicem magis elevata, instructis; pedibus rufo-fulvis, tarsis cyaneis aut violaceo-purpureis. — Long., 5-5 1/3 mill.; lat., 3-3 1/3 mill.

tulato, punctis aciculatis, lateribus utrinque marginato; scutello fere lævi; elytris grosse remote punctatis, punctis hic illic confluentibus et strigas irregulariter, præsertim ad latera et versus apicem, formantibus, interstitiis elevatis, lævibus; pedibus nigro-æneis, tarsis cyaneis aut violaceo-purpureis. — Long., 5-5 1/2 mill.; lat., 3-3 1/2 mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; tibiis duabus posticis intus calcare valido, apice longe pubescente, armatis.

Cayennæ (ma collection).

A. cyanipes. Suboblongo-ovalis, convexus, viridi-æneus, nitidus, labro palpisque brunneis, antennis fulvis, apice fuscis; thorace sat dense punctulato, punctis minutis et majoribus intermixtis, aciculatis; scutello lævi; elytris infra humeros evidenter impressis, lineatim punctulatis, punctis versus apicem minoribus sed intra impressionem basalem majoribus, callo humerali ipso tumido; pedibus saturate cyaneis, femoribus basi magis minusve viridi-æneis. — Long., 4 1/2-4 3/4 mill.; 2 3/4-3 mill.

♂ Primo tarsorum quatuor anticorum articulo valde dilatato; tibiis duabus posticis intus calcare longissimo armatis.

Cayennæ (ma collection).

Prionodera Marshalli. Oblongo-elongata, flava vel flavo-testacea, nitidula, elytris saturate cyaneo-viridibus, antennis (basi exceptâ), tibiis apice tarsisque nigris; capite inter oculos profunde longitudinaliter sulcato; thorace levissimo, vix ad latera punctis nonnullis sparsim instructo, utrinque medio transversim fortiter foveolato, lateribus obsolete sinuatis; scutello lævi; elytris confertim undique regulariter sat grosse punctatis, juxta marginem lateralem utrinque subcanaliculatis, callo humerali tumido, lævi. — Long., 10-10 1/2 mill.; lat., 4 1/2-5 mill.

Brasilia (ma collection).

Colaspis aureopunctata. Oblongo-ovata, convexa, subtus nigro-picea, pectore viridi-æneo-metallico, supra nigro-æneo-violacea, nitida, palpis antennisque flavis, labro brunneo, mandibulis nigris, oculis magnis; capite fortiter punctato, epistomate lævi, linea impressa longitudinali utrinque limitato; prothorace transverso, duplo latiore quam longiore, grosse profunde et inæqualiter punctato, punctis viridi-aureis, hic illic (præsertim ad latera) confluentibus, interstitiis subcallosis, lævibus, lateribus rotundato, late marginato, ibique medio bidenticulato, angulis anticis et posticis extrorsum curvato-productis; scutello lævi; elytris juxta suturam unistriatis, grosse et profunde punctatis, punctis viridi-

aureis, in medio disci sublineatim dispositis, ad latera autem et versus apicem magis minusve confluentibus, rugasque irregulares formantibus, interstitiis callosis, levissimis, callo humerali ipso calloso, laevi, impressione basali obsoleta; pedibus rufo-brunneis, femoribus magis minusve nigro-infusatis. — Long., 8-8 1/2 mill.; lat., 4-4 1/3 mill.

Brasilia (ma collection).

C. nobilitata. Suboblongo-ovata, convexa, subcupreo-aenea, nitida, certo situ purpureo-reflexo-micans, labro, palpis antennisque rufo-fulvis; capite remote punctato, inter oculos longitudinaliter sulcatulo, epistomate laevi; prothorace vix duplo latiore quam longiore, levissimo, punctis nonnullis hic illic disperse tantum instructo, lateribus subrotundato marginato, ibique medio bidenticulato; scutello laevi; elytris utrinque infra humeros transversim evidenter impressis, subtiliter lineatim punctulatis, punctis in impressione basali majoribus, versus apicem autem fere evanescentibus, callo humerali ipso tumido, levissimo; femoribus viridi-æneis, tibiis brunneis, tarsis rufo-fulvis. — Long., 7 1/2-8 mill.; lat., 4 mill.

Brasilia (Bahia). Ma collection.

C. egena. Suboblongo-ovata, convexa, subcupreo-ænea, nitida, certo situ purpureo-reflexo-micans, labro, palpis antennisque fulvis, capite sat fortiter punctato; prothorace in medio disci remote, ad latera crebrius et subconfluentem, grosse profunde punctato, interstitiis levibus, margine laterali utrinque marginato ibique medio obtuse bidenticulato; scutello laevi; elytris juxta suturam subtiliter et lineatim, ad latera grosse subconfluentem, punctatis, punctis obscure metallico-viridibus, impressione basali obsoleta; femoribus subcupreo-æneis, tibiis tarsisque rufo-brunneis. — Long., 7 1/2 mill.; lat., 4 mill.

Brasilia (ma collection).

C. exarata. Suboblongo-ovata, parum convexa, viridi-metallica, nitida, labro, palpis, antennis basi pedibusque rufo-fulvis, tarsis fuscis, oculis magnis, albidis; capite dense punctato, in media fronte impresso; prothorace transverso, duplo latiore quam longiore, grosse profunde et confluentem undique punctato, interstitiis elevatis, levibus, margine laterali utrinque subrotundato, in medio fortiter unidentato; scutello laevi; elytris profunde confluentem exarato-substriatis, interstitiis elevatis, levibus, rugas irregulares formantibus, callo humerali ipso tumido, laevi, impressione basali fere nulla. — Long., 6 mill.; lat., 3 1/2 mill.

Brasilia (ma collection).

C. sulco-gemmata. Ovata, subtus æneo-viridis, supra rufo-subænea, hic illic certo situ aurato-micans, antennis fulvis, articulis 6-7, duobusque ultimis, nigro-infuscat; capite prothoraceque creberrime et confluentè rugose punctato, hoc lateribus utrinque medio bidenticulato; elytris prothorace basi multo latioribus, grosse foveolatim rugose punctatis, interstitiis elevatis, lævibus, costas longitudinales formantibus; pedibus rufo-ferrugineis, femoribus aenescentibus, tarsis nigro-infuscat. — Long., 6 1/2 mill.; lat. hum., 3 mill.

Brasilia (ma collection).

C. pertusa. Ovalis, convexa, nigra, supra obscure ænea, labro, palpis antennisque fulvis, capite inter oculos fortiter impresso, vertice punctulato; prothorace in medio disci remote, ad latera confluentè, grosse et profunde punctato, punctis obscure viridibus, interstitiis elevatis, lævibus, margine laterali utrinque rotundato ibique medio obtuse bidenticulato, angulis anticis extus productis; scutello lævi, elytris juxta suturam versus apicem fortiter punctato-striatis, grosse profundeque irregulariter punctatis, punctis ad latera confluentibus et rugas irregulares formantibus, interstitiis elevatis, lævibus; femoribus obscure ferrugineis, viridi-æneo-micantibus, tibiis tarsisque rufo-brunneis. — Long., 4 3/4-5 mill.; lat., 2 1/2-3 mill.

Brasilia (ma collection).

C. picta. Ovalis, rufo-fulva, nitida, mandibulis, oculis antennisque (basi excepta) nigris; prothorace sat dense punctulato, lateribus utrinque anguste marginato et in medio fortiter angulato; elytris disco interiore subtiliter, ad latera grosse et confluentè punctatis, apicem versus punctato-striatis, interstitiis subelevatis, lævibus; singulo maculis quatuor (altera rotundata inter scutellum et callum humeralem, altera media, sube adrata, tertia pone medium transversa, quarta tandem apicali, minima) piceis, certo situ autem violaceo-micantibus. — Long., 4 1/2 mill.; lat., 2 1/3 mill.

Columbia (ma collection).

C. melanogaster. Ovalis, corpore subtus nigro-piceo, capite, prothorace, pedibus sicut et antennis fulvis, harum articulis tribus ultimis, scutello mandibulisque nigro-piceis; prothorace disperse, ad latera crebrius et fere confluentè, sat grosse punctato, lateribus utrinque marginato et in medio fortiter angulato; elytris flavis, regulariter punctato-striatis, punctis geminatis, interstitiis costæformibus, apice et ad latera magis elevatis, humeris callosis, sutura et epipleuris anguste, et in singulo maculis duabus

parvis (altera callum humeralem ipsum occupante, altera media subrotundata), nigro-piceis. — Long., 5-6 mill.; lat., 2 1/2 mill.

Brasilia (ma collection).

C. Crotchii (*C. brunnei*, var. *costipennis* Crotch, Proceed. of the Acad. of nat. Sc. of Philadelphia, 1873, p. 44). Ovalis, corpore subtus, capite, prothoraceque viridi-metallicis, antennis pedibusque fulvis, illis apice nigro-infuscat; prothorace lateribus rotundato, sat fortiter undique, ad latera crebrius, punctato; elytris fulvo-brunneis, viridi-metallico-marginatis, costis levibus quatuor fulvis (prima cum quarta, secunda cum tertia, apice connexis), interstitiis subseriatim sat fortiter punctatis, punctis hic illic certo situ viridi-micantibus, callo humerali prominente, fulvo. — Long., 4 mill.; lat., 2 1/3 mill.

Variat interstitiis elytrorum dilutioribus.

Carolina (ma collection).

C. cinctella. Suboblonga-ovata, omnino fulvo-testacea, antennis (basi excepta) nigris; capite dense punctato; prothorace convexo, disperse punctato, punctis majoribus et minoribus intermixtis, lateribus rotundatis marginatisque; scutello lævi; elytris sat dense irregulariter punctatis, basi, sutura margineque laterali utrinque, magis minusve viridi-limbatis; pedibus fulvis. — Long., 5-5 1/3 mill.; lat., 2 1/2 mill.

Brasilia (ma collection).

C. cribricollis. Oblonga, fulva, corpore subtus et elytrorum epipleuris viridi-metallico tinctis, prothorace confertim regulariter undique punctato, margine basali lateribusque anguste metallico-viridibus, his medio modice angulatis; elytris punctato-striatis, punctis geminatis, certo situ viridi-metallico-micantibus, interstitiis subelevatis, lævibus; antennis pelibusque omnino fulvis. — Long., 6-6 1/2 mill.; lat., 3-3 1/3 mill.

Brasilia (ma collection).

C. rufo-femorata. Suboblonga, saturate cyanea, subvinea, labro fulvo, capite prothoraceque crebre fortiter punctatis, hoc lateribus medio unidentulato; elytris grosse profunde punctatis, juxta suturam et versus apicem punctato-striatis; antennis nigris, articulis sex basalibus fulvis; femoribus rufo-fulvis, genubus, tibiis tarsisque nigris. — Long., 4-4 1/2 mill.; lat., 1 3/4-2 mill.

Columbia (Mus. Ern. Olivier).

C. despecta. Oblonga, subtus cum labro, palpis, antennis pedibusque fulva, supra lute viridis, sub-aurato-micans; capite lævi, inter oculos profunde transversim sulcato; epistomate punc-

tulato; prothorace lateribus subangulato, punctis nonnullis minutis hic illic instructo; scutello lævi; elytris infra humeros transversim evidenter impressis, sat fortiter punctatis, punctis versus apicem rarioribus et sublineatim dispositis. — Long., 3 1/2-4 mill.; lat., 2 mill.

Peru (Pozuzu). Coll. Kirsch.

C. pumilio. Oblonga, subtus picea, supra caruleo-virescens, labro, antennis pedibusque fulvo-brunneis, femoribus pro parte piceis, capite inter oculos valde impresso ibique supra antennarum insertionem spatiis duobus callosis lucidisque instructo; epistomate punctato; prothorace transverso, grosse inæqualiter punctato, lateribus medio valde angulato; elytris subfortiter punctatis, infra humeros transversim impressis, callo humerali iso tumido, lævi. — Long., 2 1/2 mill.; lat., 1 mill.

Peru (Pozuzu). Coll. Kirsch.

ENTOMOCHIRUS (nov. gen.).

Corpus breviter oblongo-ovatum, subtus pube albida sericea magis minusve obtectum, supra glabrum. Caput usque ad oculos in thoracem insertum, oculis globosis, valde prominentibus. Antennæ filiformes, dimidio corpore fere longiores. Prothorax convexus, paulo latior quam longior, lateribus utrinque medio unidentatus, angulis anticis acute productis. Prosternum latum, inter costas nonnihil contractum, basi recte truncatum. Episternum prothoracis concavum. Pedes validi; maris tibiis duobus posticis intus paulo ante apicem late et profunde emarginatis ibique rigide pilosis, incisione ipsa introrsum lingua lineare extus curvata instructa.

Ce genre appartient au groupe des Colaspites de Chapuis. Il se compose actuellement de quatre espèces américaines, qui, par leur forme ramassée et leur forte ponctuation, ont une certaine analogie avec les *Agetus* de l'Australie. L'échancrure si remarquable des tibias postérieurs chez les mâles les distingue non seulement des espèces de groupe, mais encore de tous les Eumolpides actuellement connus.

Entomochirus sericeus. Ovatus, viridi-aneus, certo situ cupreo-reflexo-micans, subtus pube albida sericea, supra metathoracis epipleura multo densiore, vestitus, labro sicut et palpis fulvis,

antennis ferrugineis, articulis 5-7, tribusque ultimis, nigro-infuscat; capite prothoraceque creberrime et confluentem grosse punctatis, punctis aciculatis, gemellatis; hoc lateribus utrinque medio unidentato; scutello levi; elytris densissime foveolatis et confluentem punctatis, transversim rugulosis, ad latera et versus apicem longitudinaliter costulatis, punctis aciculatis, gemellatis; pedibus rufo-ferrugineis, tarsis magis minusve nigro-infuscat. — Long., 5-6 1/2 mill.; lat., 2 1/2-3 mill.

Cayennæ (ma collection).

E. dispar. Præcedenti affinis, sed obscure æneus, undique multo minus fortiter punctatus, femoribus apice, tibiis, tarsis antennisque nigris, harum articulis duobus primis brunneis. — Long., 5 mill.; lat., 2 1/2 mill.

Cayennæ (ma collection).

E. cribrosus. Validior, aneo-viridis, subtus undique pube albida sericea densissime obiectus, labro, pedibusque omnino rufo-ferrugineis, antennis nigris, articulis duobus primis subtus obscure brunneis; capite, prothorace, elytrisque creberrime grosse foveolatis punctatis, his juxta suturam et versus apicem costulatis. — Long., 6 mill.; lat., 3 mill.

Cayennæ (ma collection).

E. jucundus. Minor, læte metallico-viridis, subtus pube albida, supra metathoracis epipleura densiore, modice vestita, labro, palpis, pedibus omnino, antennisque læte fulvis, harum articulis quinque ultimis nigro-infuscat; capite, prothorace elytrisque creberrime minus fortiter aciculato-punctatis, his ad latera transversim rugulosis, versus apicem subcostulatis. — Long., 4-4 3/4 mill.; lat., 2-2 1/3 mill.

Venezuela (Caracas) (ma collection).

Corysthea humilis. *C. nigripennis* E. Lef. affinis, sed duplo minor. Rufo-fulva, antennis nigris, articulis 3 basalibus fulvis; prothorace minutissime punctulato, lateribus rotundato ibique anguste marginato; elytris subcæaneo-nigris, infra humeros transversim evidenter impressis, subcrebre lineatim punctatis; pedibus rufo-fulvis, genibus tibiisque basi, nigris, femoribus muticis. — Long., 3 1/2 mill.; lat., 2 mill.

Amazones.

Chalcophana scapularis. Oblongo-elongata, parum convexa, omnino cum pedibus antennisque nigra, obscure reflexo-viridi-æneo-micans, elytris saturate viridibus, subopacis, margine laterali utrinque obscure violaceo; capite dense punctato, inter

oculos longitudinaliter profunde sulcato; prothorace nitido, subtilissime remote punctulato, elytris juxta suturam subtiliter, ad latera magis fortiter, inordinatim punctatis, punctis versus apicem fere evanescentibus, infra humeros impressis, callo humerali ipso maxime producto, subacuto, lævi.

♂. Primo quatuor tarsorum anticorum articulo dilatato; elytris juxta marginem lateralem utrinque longitudinaliter subcostato-elevatis. — Long., 7-7 $\frac{1}{3}$ mill.; lat., 3 $\frac{3}{4}$ -4 mill.

♀. Major, primo quatuor tarsorum anticorum articulo triangulari; elytris ad latera utrinque costis longitudinalibus binis maxime elevatis (una a callo humerali ipso usque ad disci medium extensa, altera paulo post callum humeralem et apicem fere attingente) instructis; impressione basi profunda. — Long., 10 mill., lat., 4 $\frac{3}{4}$ mill.

Ecuador (E. de Ville). Collection du Musée de Bruxelles.

C. Volxemi. Suboblongo-ovata, subtus magis minusve nigropicea, supra ferrugineo-brunnea, elytris aurato-æneis, nitidis, margine laterali utrinque ferrugineo; antennis ferrugineis, validis, articulis quinque ultimis nigris; prothorace sat dense punctis minoribus et majoribus intermixtis instructo; scutello lævi; elytris infra humeros transversim evidenter impressis, in medio disci subtiliter, ad latera grosse et profunde punctato-striatis, punctis juxta suturam geminatis, interstitiis ad latera et versus apicem elevatis, costaeformibus; pedibus ferrugineis, tibiis apice tarsisque nigris. — Long., 6-7 mill.; lat., 3- $\frac{3}{4}$ mill.

♂ Paulo minor, antennis crassioribus, elytris ad latera minus grosse punctatis.

Variat elytris obscure omnino ferrugineis.

Brasilia (Cam. Van Volxem). Collection du Musée de Bruxelles. — La mienne.

EDISTUS (nov. gen).

Corpus breviter ovatum, glabrum, caput exsertum, deflexum, vertice tumido, oculis globosis, integris. Antennæ dimidio corpore vix longiores, articulis 2 basalibus incrassatis, 3-4 brevibus, inter se æqualibus, reliquis moniliformibus. Prothorax transversus, convexus, lateribus utrinque medio angulatus. Prosternum subquadratum, basi recte truncatum. Prothoracis episternum margine antico concavo. Pedes modice robusti, femoribus totis fusiformibus, subtus inermibus, tibiis rectis,

quatuor posticis extus ante apicem fortiter emarginatis ibique dense pubescentibus, unguiculis appendiculatis.

Ce nouveau genre rentre dans le groupe des *Callisinites* de Chapuis. Il diffère des *Callisina* par la structure des antennes et par toutes les cuisses non dentées.

Edistus fulgidus. Breviter ovatus, viridi-metallicus, nitidus, labro sicut et palpis rufo-fulvis, antennis nigris, articulis duobus basalibus subius brunneis, capite in media fronte foveolato, vertice tumido, subtilissime punctulato; prothorace remote punctato; scutello laevi; elytris aureo-cupreis, fulgidis, infra humeros transversim evidenter impressis, juxta suturam unistriatis, regulariter lineatim punctatis, punctis versus apicem fere evanescentibus, callo humerali ipso tumido, laevi; pedibus metallico-viridibus, tarsis nigro-brunneis. — Long., 3 3/4 mill.; lat., 2 1/2 mill.

Insula Bintang (ma collection).

Eurytus pedestris. Breviter ovalis, viridi-æneus, nitidus, pilis albidis parcissime vestitus, labro viridi-metallico, palpis antennisque rufo-brunneis, his apice infuscatis, fronte punctulato, epistomate sat fortiter crebre punctato, lateribus utrinque creta longitudinali limitato, antice triangulariter emarginato; prothorace elytrisque alutaceis, sat dense subtiliter punctatis; femoribus totis æneo-cupreis, duobus posticis medio maxime incrassatis, et subtus dente acuto armatis, tibiis totis apice tarsisque rufo-brunneis. — Long., 3 mill.; lat., 1 1/2 mill.

Caput Bonæ Spei (ma collection).

Typophorus fulvipennis. Suboblongo-ovatus, subius piceo-niger, capite prothoraceque brunneis, hoc obscure æneo, in medio disci remote sat fortiter punctato, elytris læte fulvis, nitidis, infra humeros læte evidenter transversim impressis, regulariter substriato-punctatis, punctis versus apicem paulo minoribus, pedibus nigro-piceis, tarsis sicut et antennis rufo-fulvis. — Long., 3 1/2 mill.; lat., 2 mill.

Columbia (ma collection).

T. atomarius. Ovatus, niger, nitidus, antennis pedibusque fulvis, prothorace remote punctato, elytris sat fortiter striato-punctatis, punctis versus apicem evanescentibus, impressione basali fere nulla. — Long., 1 mill.; lat., 1/2 mill.

Bahia (ma collection).

T. nigripennis. Oblongus, nitidus, capite, antennis, prothorace pedibusque læte rufo-fulvis, abdomine, scutello sicut et elytris

nigris, his infra humeros transversim evidenter impressis, lævibus, basi tantum punctis nonnullis, lineatim dispositis, vix perspicue instructis; capite prothoraceque lævissimis. — Long., 2-2 1/2 mill.; lat., 1-1 1/3 mill.

Columbia (ma collection).

T. pygmæus. Ovatus, rufo-fulvus, nitidus, antennis pedibusque dilutioribus; prothorace remote punctulato; elytris infra humeros obsolete transversim impressis, sat fortiter striato-punctatis, punctis versus apicem paulo minoribus, sutura, limbo laterali utrinque et singulo macula magna subrotundata, pone medium posita, piceo-nigris. — Long., 2 mill.; lat., 1 1/3 mill.

Brasilia (ma collection).

EROTENIA (nov. gen.).

Corpus oblongum, subparallelum, convexum. Caput exsertum, deflexum, vertice maxime convexo, fronte plana, epistomate antice recte truncato, oculis magnis, oblongis, intus fortiter emarginatis, extrorsum profunde sulcatis; antennæ filiformes, dimidio corpore longiores. Thorax modice convexus, fere longior quam latior, lateribus utrinque fere rectis. Elytra thorace basi latiora. Prosternum subquadratum. Prothoracis episternum margine antico maxime convexo. Pedes subelongati, femoribus muticis, tibiis rectis, unguiculis bifidis.

Par les crochets des tarses bifides, ce genre appartient au groupe des *Corynodites* de Chapuis. Il est établi sur une espèce brésilienne, dont le faciès rappelle un peu les *Dermoxanthus*, du groupe des *Endocéphalites*, et dont les couleurs sont celles du *Biorus geniculatus* Guér.

Erotenia nigripes. Oblonga, pallide flava, nitida, oculis, mandibulis, femoribus apice, tibiis, tarsis antennisque nigris, harum articulis quinque basalibus flavis; capite prothoraceque lævissimis, illo inter oculos longitudinaliter subsulcato, hoc margine basali profunde transversim striato; elytris juxta suturam unistriatis, remote lineatim punctulatis, punctis versus apicem evanescentibus. — Long., 6 1/2 mill.; lat. hum., 3 mill.

Brasilia (ma collection).

Thyra maculigera. — Oblonga, convexa, subtus cum pedibus

nigra, supra rufa vel rufo-fulva, oculis, mandibulis, antennis (basi excepta fulva), capitis macula media, thoracis maculis tribus, elytrorumque maculis 12, in series tres transversas dispositis (una basali, altera pone medium, tertia ante apicem), nigris; femoribus duobus anticis subtus dente valido armatis. — Long., 8-11 mill.; lat., 4 1/2-6 mill.

Brasilia (ma collection).

Biorus variatus. Breviter oblongus, pallide fulvus, antennis nigris, articulis sex basalibus fulvis; capite crebre punctato, inter oculos macula nigra notato; thorace sat dense punctato, punctis majoribus et minoribus intermixtis, maculis quatuor parvis, subquadratum digestis, insignito; scutello nigro-piceo; elytris antice sat fortiter, postice subtiliter, subcrebre punctatis, juxta marginem lateralem utrinque late canaliculatis et costula longitudinali, versus apicem magis elevata, instructis, singulo maculis sex nigris (interdum duplicatis), in series tres transversas (una basali, altera paulo ante, tertia pone medium) dispositis; pedibus omnino fulvis. — Long., 9 mill.; lat., 5 mill.

Amazones (ma collection).

Chrysochus singularis. Oblongus, convexus, omnino cum pedibus violaceo-cyaneus, supra certo situ viridi-reflexo-micans, nitidus, labro, palpis, mandibulis, oculis, antennisque nigris, harum articulis basalibus interdum cyaneis; capite crebre punctato, inter oculos obsolete bifoveolato; prothorace sat dense fortiter et subrugose punctato, punctis majoribus et minoribus intermixtis; scutello lævi; elytris infra humeros sat profunde transversim impressis, juxta suturam versus apicem fortiter unistriatis, crebre undique punctatis, punctis sublineatim dispositis, intra impressionem basalem majoribus. — Long., 9-10 mill.; lat., 4 3/4-5 mill.

Chine (env. de Pékin). — Coll. de M. Sédillot et la mienne.

APORUS (nov. gen.).

Corpus oblongum, parallelum, modice convexus. Caput usque ad oculos in thoracem insertum, epistomate fronte continuato, antice arcuatim emarginato. Antennæ filiformes, dimidio corporis longiores. Thorax transversus, margine antico sensim leviter producto, lateribus utrinque fere rectis, anguste marginatis. Prosternum subquadratum, basi recte truncatum. Prothoracis episternum margine antico valde convexo. Pedes subelongati, femoribus anticis subtus in medio

fortiter incrassatis ibique subdentatis, tibiis rectis, unguiculis appendiculatis.

Ce nouveau genre appartient au groupe des Endocéphalites. Il se distingue nettement par la forme du prothorax, la structure du prosternum et des cuisses antérieures; ce dernier caractère le rapproche des *Thyra* et des *Biorus*.

A. cyaneus. Oblongus, omnino cum pedibus saturate cyaneus, nitidus, certo situ violaceo-purpureo-micans, labro, palpis, mandibulis, oculis, antennisque nigris; epistomate punctato; fronte lævi; prothorace lævissimo, punctis raris hic illic vix perspicue instructo, ad latera utrinque foveola lata notato; elytris juxta marginem lateralem utrinque canaliculatis ibique obtuse longitudinaliter unicastis, sublineatim obsolete punctulatis, punctis versus apicem evanescentibus. Long., 7-8 mill.; lat., 3 l 4-4 mill. Cayennæ (ma collection).

M. Kerremans adresse la petite note suivante :

BUPRESTIDES

RECUEILLIS EN ESPAGNE PAR M. WEYERS.

<i>Julodis setifensis</i> Lucas, var. <i>Jamini</i> Luc.	} environs d'Aguilas.
<i>Capnodis tenebrionis</i> Linn.	
<i>Acmaeodera cylindrica</i> Fabr.	
— <i>lanuginosa</i> Gyll.	
— <i>tæniata</i> Fab., var. <i>hirsutula</i> Gory.	
<i>Melibæus amethystinus</i> Oliv.	

M. Lameere remet la liste des LONGICORNES rapportés par M. Weyers de la même localité :

Stromatium unicolor Oliv.
Cartallum ebulinum Linn.
Hylotrupes baiulus Linn.
Agapanthia cardui Linn.
Phytæcia rufipes Oliv.
Phytæcia virescens Fab.

Et M. H. Donckier de Donceel y ajoute celle des CHRYSOMÉLIDES.

Crioceris campestris L.
Lachnæa longipes Fabr.
Cyrtonus angusticollis Fairm.
Timarcha sericea Fairm.

Chrysomela Banksii Fabr.

— *bartica* Suffr.

— *americana* Linn.

— *diluta* Germ.

Longitarsus dorsalis Fabr.

Psylliodes marcida Illig.

M. le Dr Heylaerts envoie le travail suivant :

REMARQUES PSYCHIDOLOGIQUES.

Par la bonté de MM. les professeurs Packard et Riley, j'ai été mis à même d'étudier à fond la meilleure partie des Psychides des États-Unis de l'Amérique septentrionale. J'ai eu le bonheur de découvrir, outre ma *Manatha Edwardsii*, une autre *nova species*, que je m'empresse de décrire ici plus bas.

Les Psychides nord-américaines semblent avoir un cachet particulier, et il m'étonne que jusqu'à présent aucune CANÉPHORIDE n'ait été trouvée dans l'Amérique septentrionale. M. Henry Edwards décrit bien une *Pseudopsyche exigua* n. sp. (*Papilio*, 1882, n° 8, p. 125), qui *pourrait* appartenir à cette catégorie, mais comme il ne dit absolument rien par rapport à la nervulation, il faut que je m'abstienne de confirmer cette idée.

Ce serait un fait très intéressant que ce manque de CANÉPHORIDES dans un grand pays où toutes les conditions nécessaires à la vie et à la reproduction de cette sous-famille sont présentes, tout aussi bien qu'en Europe. Je crois donc ne pas me tromper en prédisant la découverte prochaine de quelques espèces des genres *Epichnopteryx*, *Bijugis* et *Fumea*.

Un autre fait digne de remarque, c'est que pas une espèce *euro-péenne* n'a été découverte dans l'*Amérique septentrionale*, et pourtant celles qui habitent nos régions polaires pourraient assez bien se trouver au Labrador, dans le Canada septentrional, etc.

La liste du professeur Grote n'est pas complète pour les Psychides, et devrait être augmentée de quelques espèces et d'un genre au moins; or, outre les espèces nommées, il n'y a pas moins (dans la collection du professeur C. V. Riley) de quatre fourreaux, appartenant à des espèces dont l'image n'est pas encore trouvée, et qui me sont parfaitement inconnus.

J'ai remarqué avec plaisir une méthode pour conserver les chenilles dans l'alcool et les placer dans la collection. M. le professeur Riley place les larves dans un tube de verre assez mince rempli d'alcool. Le tube, fermé par un bouchon en gutta-percha, est étendu horizontalement sur un morceau de bois, nommé par

lui *a slide*, qui est pourvu *en dessus* d'un crochet double pour fixer le tube, et *en dessous* de quatre pointes en fer bien effilées pour piquer le tout dans le liège de la boîte.

Je suis à même de compléter en partie la description de *Manatha Edwardsii* Heyl.

Le fourreau de la femelle a une longueur d'environ 25 millimètres, la forme d'une navette, large au milieu de 7 millimètres, et est couvert de tiges minces placées longitudinalement.

La chrysalide femelle est d'un jaune de cire, mesure 7 millimètres en longueur et 2,5 en largeur. Les restes de la ♀ ont une couleur jaune grisâtre. Les anneaux supérieurs de la chenille sont d'un blanc jaunâtre, striés longitudinalement par des lignes noires; les pattes écailleuses sont jaune brunâtre, annelées de noir, d'après quelques débris trouvés dans le fourreau. L'espèce a été trouvée dans le Texas par M. Belfrage.

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE PSYCHIDE DES ÉTATS-UNIS
DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Chalia Rileyi m.

Mas. Flavo-griseus, dense hirtus; capite flavo-brunneo; antennis brevibus, longitudine marginis anterioris tertii, ciliis longioribus a medio apicem versus decrescentibus, 22-articulatis; pseudopalpis brevibus brunneo-griseis; thorace (abdomen deest) brunneo-griseo piloso. Pedibus brunneo-griseis tarsisque flavis. Tibiis anterioribus spina maxima. Alis concoloribus flavo-griseis, anguste brunneo-marginatis fimbriisque longis atque brunneo-griseis.

Alis anterioribus elongatis basi multo angustiori, apice subrotundato, margine anteriori fere recto ut margo interior; margine exteriori obliquo; costis 10; 1^a et 1^b ut apud genus *Chalia* Moore, 2 et 3 ex margine inferiori, 4, 5, 6, 7 et 8 (ex eodem puncto) ex margine exteriori, 9 ex margine superiori cellulae mediae; 10 libera ex basi. Cellula intrusa nulla.

Alis posterioribus elongatis, margine anteriori subrotundato; margine exteriori obliquo, in medio paulo truncato; margine interiori subobliquo, apice anguloque anali non productis; costis 7 liberis: 7 tota libera ex basi. Cellulae mediae parte anteriori brevi et angustiori, parte posteriori latiori longiorique.

Expansio alae anterioris 5 mill.; id. posterioris 4 mill.

Feminam non vidi.

Involucrum cylindricum, longitudine 11 mill., cinereum, omnino granis sabulosis (fragmentisque lignosis aut lichenum?) obtectum.

Eruca carnea, capite segmentisque tribus anterioribus flavis nitidisque, brunneo-nigro striatis.

Habitat : Unio Americana, Missouri.

♂, larva cum involucris in Museo Prof^s C. V. Riley.

Espèce très petite, pas plus grande qu'une *Epichnopteryx pulla* Esp. de petite taille.

Les chenilles furent trouvées sur le tronc de pommiers et de pêchers dans le Missouri.

Parmi les fourreaux de la petite collection de Psychides envoyée par M. le professeur C. V. Riley, j'en ai trouvé six qui appartiennent assurément à des espèces inédites de la faune des États-Unis, et une seule *species nova* du Brésil.

1^o Un fourreau de la coupe de celui de *Ps. opacella* H.-S., mais couvert à la partie inférieure de tiges très longues, trouvé en Floride sur l'oranger ;

2^o Un id., même coupe, mais très petit, comme celui de *pulla* Esp., de Floride, sur l'oranger ;

3^o Un id. id., aussi grand que celui de *Ps. opacella* H.-S., contenant une chrysalide femelle de la taille et de la coupe de cette même espèce, mais les débris de la chenille indiquent une tout autre species, trouvé sur le pin à Williams Canon, Colorado ;

4^o Quelques fourreaux de la grosseur de celui de *Chalia Rileyi* Heyl., mais couverts de morceaux de lichen, de Floride, Green Cove Spring, trouvés sur *Quercus spec.* ;

5^o Deux fourreaux trouvés sur le chêne (*swamp oak*), Alabama, sept. 1880, de la grosseur de celui de *Ps. Leschenaulti* H.-S., ayant la même coupe, mais couverts de quelques morceaux, mais bien peu, de tiges et de lichens ;

6^o Un très grand fourreau d'Arizona, ne mesurant pas moins de 8 CENTIMÈTRES, ne ressemblant pas mal à un cylindre de cuir blanc, sur lequel sont fixés, par-ci-par-là, de petits morceaux de tiges quelconques dans le sens de la longueur. Je crois que celui-ci est de la ♀, tandis que celui du mâle est couvert de grands morceaux de tiges, fixés seulement à leur bout supérieur, comme les piquants d'un porc-épic. De M. Henry Edwards j'ai reçu également les deux fourreaux, dont celui de la ♀ ressemble à l'*involucrum* de l'*Ork. elongatus* Saunders = *Saundersii* Westw. ;

7^o Un fourreau de Bahia, Brésil, de la coupe de celui de *Ps. riciella* Schiff., mais plus large, couvert irrégulièrement de tiges, de morceaux de bois et de feuilles sèches, et qui ne ressemble ni à celui de *Brasiliensis* Heyl. ni à celui de *Mac Leayi* Lansd. Guild., ni à aucun des fourreaux connus du Brésil.

Je ne veux pas nommer ces espèces, mais bien fixer l'attention

de mes collègues qui auraient l'occasion de les rencontrer. Je recommande aussi à la lecture le petit article de M. Mac Lachlan dans le dernier numéro de l'*Entomologists' Monthly Magazine*, où il décrit et figure des fourreaux de l'Afrique.

M. de Borre demande la parole et fait la communication suivante :

La publication que M. Weyers et moi avons faite (Compte-rendu du 5 janvier 1884), d'une note relative à la *Cicindela maritima* Dej., a vivement attiré l'attention sur cette forme, que nos collègues ont recherché de nouveau cette année à Calmthout, avec d'autant plus d'empressement que de l'étranger cette publication a fait surgir beaucoup de demandes.

Tous nos chasseurs vont-ils maintenant se borner à la satisfaction assez puérile d'avoir cette forme authentiquement représentée dans leurs collections? Ce serait bien regrettable, et j'espère qu'ils vont profiter de l'occasion pour élucider ou aider à élucider les questions scientifiques relatives à cette Cicindèle.

Déjà M. Devaux a pu établir que, contrairement à l'opinion de M. Weyers, la véritable *maritima* se prend à Calmthout aussi bien au printemps qu'en automne.

Ce qu'il faudrait à présent, c'est que, concurremment avec les chasses à Calmthout, on recueille, et en nombre, les Cicindèles des dunes de notre côte. Là, on n'a pris, à ma connaissance, que la grande forme où M. Weyers et moi ne voyons qu'une variété de la *C. hybrida*, ce qui nous faisait incliner à limiter l'aire géographique de la *C. maritima* Dej. vers l'occident à l'Escaut, fleuve qui a comblé là un assez large golfe, il y a un certain nombre de siècles. Mais divers entomologistes français m'écrivent pour affirmer que la véritable *maritima*, la petite forme, existe aussi en France, sur le littoral. Peut-être est-ce une erreur de leur part et continuent-ils à ne pas distinguer une variété de l'*hybrida* et la véritable espèce *maritima*. Mais, dans le cas contraire, il est à supposer que cette dernière sera aussi à trouver dans nos dunes de la côte, où je vous invite à la rechercher. La question géographique est assez importante au point de vue de l'origine de ces espèces et de leur dispersion.

De plus, il serait utile de vérifier sur un grand nombre d'exemplaires, tant de petite que de grande taille, les caractères assignés par MM. Fauvel et Bedel comme diagnostics de la *maritima* et de l'*hybrida*, à savoir la forme plane ou bombée du front et l'existence ou l'absence d'une bande de poils blancs entre les yeux. Enfin, par la dissection on devrait s'assurer si, comme le dit

M. Kraatz, la présence des caractères indiqués par les auteurs français coïncide avec une forme différente du pénis.

Mais ce n'est pas en procédant à la façon des amateurs de timbres-poste, c'est-à-dire en colloquant deux ou trois males et deux ou trois femelles dans sa collection, qu'on tranchera de semblables questions ; il faut examiner des exemplaires par douzaines, et même par centaines, si l'on peut.

M. de Borre entretient ensuite l'assemblée d'une visite qu'il a reçue d'un meunier de Lodelinsart, lequel se plaignait de l'envahissement de son moulin par les larves et les papillons d'une espèce de microlépidoptère (exotique sans doute), et pour la destruction duquel il aurait voulu des conseils, l'emploi du pétrole ne lui ayant pas réussi. M. de Borre n'a pu que lui donner l'adresse de M. le professeur M. Girard, de Paris. Il ajoute qu'il est regrettable que si peu de nos collègues s'occupent de microlépidoptères aujourd'hui, et que la partie de l'entomologie appliquée soit surtout si complètement délaissée chez nous ; car à quoi bon demander à ce meunier de nous envoyer de ces lépidoptères, si en retour nous ne devons que lui fournir un nom latin, chose qui le toucherait très peu ?

M. de Selys rappelle qu'à Maestricht, un moulin où on avait fabriqué de la farine de riz, avait aussi été envahi d'une manière désastreuse par un lépidoptère exotique. Notre collègue M. Maurissen avait apporté beaucoup d'exemplaires de ce lépidoptère.

M. H. Donckier dit que le meunier de Lodelinsart se plaignait, non seulement de trouver dans la farine des larves dudit lépidoptère, mais surtout de ce qu'elles attaquaient les soies des blutoirs.

M. Weinmann révoque en doute ce dernier fait, à moins, dit-il, qu'on n'eût substitué à la soie quelque autre matière.

M. le Dr Jacobs entretient ensuite l'assemblée de l'excursion qu'il a faite le 11 mai à Genval, et où se sont trouvés avec lui MM. Devaux, Giron, Lameere, Remy et Weinmann. Il n'a guère à citer d'autre capture intéressante que celle du *Melolontha hippocastani*. La *Cicindela hybrida* était d'une abondance extrême.

M. Jacobs ajoute qu'il vient de prendre pour la seconde fois en Belgique, à Beersel, le *Bombus arenicola*, un hyménoptère que Wesmael n'avait jamais capturé et qui manque encore à la collection du Musée.

M. H. Donckier signale la capture en grande quantité à Watermael, ce printemps, de la *Prassecuris hannoverana*, sur le *Calltha palustris*.

M. Remy annonce qu'il a pris cette espèce il y a quelques jours, à notre excursion d'Arlon.

M. de Borre s'est rendu à Calmpthout deux fois : le jeudi de l'Ascension, avec M. Devaux, qui y a passé deux jours, et le dimanche suivant avec M. Dietz, M. Van Segvelt et le beau-fils de ce dernier. Ce même jour, M. Remy s'y trouvait aussi, mais les chasseurs ne se sont pas rencontrés. Quoique le vent soufflât du nord, les captures ont été nombreuses. Quatre espèces de *Cicindela* (*sylvatica*, *hybrida*, *maritima* et *campestris*), l'*Omphron limbatum* très abondant, les *Carabus clathratus* (1 exemplaire) et *nitens* (plusieurs exemplaires), l'*Agonum marginatum*, l'*Asemum striatum*, etc., etc.; les Odonates volaient en grande quantité, ainsi que beaucoup d'insectes de divers ordres.

Enfin, M. de Borre s'est rendu à Arlon pour l'excursion annuelle, avec M. Remy, les 1^{er} et 2 juin. Le dimanche matin, notre collègue M. Kraus étant venu les retrouver de Luxembourg, ils ont chassé ensemble toute la journée, par un temps très favorable, dans la direction de l'ouest-sud-ouest, vers Stockem principalement, où la *Cicindela sylvatica* ne paraissait pas rare; mais l'*Asida grisea*, qu'y avait autrefois prise C. Van Volxem, ne s'est pas retrouvée sur le monticule isolé dit : Montagne de Stockem.

Le lendemain, la chasse a continué dans des conditions de température encore plus favorables. M. Kraus, n'ayant pu rester, avait été remplacé par M. Koltz, membre de notre Société royale de Botanique et fonctionnaire supérieur de l'administration forestière du grand-duché de Luxembourg. Après une exploration dans la direction opposée à celle de la veille jusque dans la riante vallée de la Geichel, au pied de la montagne de Guirsch, nous avons un instant franchi la frontière pour aller dîner dans un excellent restaurant adjacent au bureau de la douane. Nous sommes ensuite revenus à Arlon, M. Remy fauchant continuellement au filet, et la Malle des Indes nous a permis d'être de retour à Bruxelles avant huit heures du soir, regrettant vivement qu'une excursion dans des conditions aussi favorables et aussi agréables n'eût pas su réunir au moins une douzaine de nos collègues.

Toutefois, l'activité infatigable de M. Remy lui a permis de réunir une quantité considérable de coléoptères.

Mais il est bien regrettable qu'aucun lépidoptérologue ne fût de la partie; les lépidoptères volaient en nombre, et nous avons même à citer l'abondance de l'*Erebia Medusa*, une bonne espèce qui fut jadis découverte là même pour la première fois en Belgique par M. Putzeys.

Les Hyménoptères, Diptères, Odonates et surtout les Trichoptères et autres Névroptères non Odonates étaient aussi bien abondants et auraient fourni à leurs spécialistes une ample moisson.

M. de Selys, qui se trouvait ce jour-là, ainsi que M. Candèze, à

L'excursion que le Club Alpin belge faisait dans les Hautes Fagnes, y a aussi observé l'*Erebia Medusa*.

M. Remy dépose une liste de toutes les espèces qu'il a déjà déterminées parmi ses captures d'Arlon, en y ajoutant quelques autres observées par MM. de Borre et Kraus; on y remarque : *Cicindela sylvatica*, *hybrida* et *campestris*, *Carabus convexus*, *granulatus*, *cancellatus*, *auratus* et *nemoralis*, *Calosoma inquisitor*, *Elaphrus uliginosus*, *riparius* et *cupreus*, *Calathus fulripes*, *Amara fulva*, *Staphylinus caesareus*, *Cucobius Schreberi*, *Geotrupes stercorarius*, *foveatus*, *mutator*, *sylvaticus* et *cernalis*, *Cetonia metallica*, *Elater ballatus*, *Opatrum sabulosum*, *Cistela murina*, *Meloe brevicollis*, *Rhagium bifasciatum*, *Lamia textor*, *Gynandrophthalma salicina*, *Prasocuris hannoverana*, *Gonioclena litura* et *riminalis*, *Chrysomela staphylea* et *polita*, *Lina arnea*, *cuprea*, *populi* et *tremulae*, etc., etc.

Naturellement, les récoltes doivent contenir encore beaucoup d'espèces intéressantes à déterminer ultérieurement.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion à faire le 13 juillet. Sur la proposition de M. de Borre, l'assemblée choisit Esschenbeek, près Hal. Cette excursion sera conduite par M. le Dr Jacobs. On partira de Bruxelles (Midi) pour Hal, par le train de 8 h. 8 m. du matin.

La séance est levée à 9 1/4 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 47.

Assemblée mensuelle du 5 juillet 1884.

PRÉSIDENTE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Arnold, Capronnier, De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, Devaux, Duvivier, Fologne, Jacobs, Kerremans, Lameere, L'Arbalestrier, Vander-velde, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. H. Donckier de Donceel et Vanden Branden ont fait excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 juin est approuvé.

Le Président annonce l'admission d'un nouveau membre effectif, M. B.-A. de Vaux, ingénieur, à Liège, présenté par MM. Ch. et H. Donckier de Donceel.

M. de Borre annonce la mort d'un jeune homme qui, sans faire partie de notre Société, a beaucoup contribué à la connaissance de notre faune entomologique, M. Ch. De Kempeneer, qui a rempli jusqu'en 1875 les fonctions de préparateur à la section entomologique du Musée. A cette époque, il était parti pour l'Amérique du Nord, comme associé d'un marchand naturaliste; il en revint il y a quelques années, nous apportant des insectes, parmi lesquels un exemplaire du *Merope tuber*. Puis il alla voyager en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il vient de mourir, âgé seulement de 32 ans. Avant de nous quitter, ses explorations en Belgique pour le Musée lui firent découvrir une quantité d'espèces nouvelles ou intéressantes pour notre faune, ainsi que l'ont souvent constaté nos Comptes-rendus, et il s'en trouvera certainement dans les parties non encore étudiées de ses chasses.

Correspondance.

La Direction générale des Postes nous fait connaître que toutes les recherches faites pour retrouver le grand nombre d'exemplaires de nos Annales et de nos Comptes-rendus non parvenus à leurs destinataires en 1883 n'ont donné aucun résultat.

M. le Dr Katter, directeur des Entomologische Nachrichten, se plaint de n'avoir pas reçu les Annales depuis 1882, et très irrégulièrement les Comptes-rendus, bien que n'ayant pas cessé de nous adresser et la cotisation et les Entomologische Nachrichten. L'envoi de nos publications lui a toujours été fait régulièrement, et il a été reconnu que, d'autre part, ses cotisations sont parvenues à notre trésorier ; mais les Entomologische Nachrichten ne nous arrivent plus depuis longtemps ; tout comme nos Annales et Comptes-rendus, elles s'égarent sans doute en route, et nous venons d'apprendre combien il est inutile de réclamer en pareil cas.

M. Vanden Branden écrit pour se plaindre de l'absence d'une tarification exacte et soigneuse pour les tirés à part des travaux publiés par la Société ; il expose tous les incidents d'une contestation qu'il vient d'avoir avec notre imprimeur et insiste pour que la Société, si elle veut que les auteurs n'aillent pas se faire imprimer ailleurs, s'occupe à les mettre, par une convention claire et précise, à l'abri de toute taxation arbitraire.

M. Weinmann pense qu'il suffit d'avoir recours aux engagements pris par notre imprimeur lorsque la Société a conclu avec lui, et qu'il s'y trouvera tous les éléments propres à trancher toutes les contestations du genre de celle-ci.

M. de Borre, au contraire, ne croit pas qu'à cette époque on ait suffisamment fait établir ces points, que l'imprimeur ne pouvait pas alors bien connaître ; les seuls engagements positifs ont eu trait à l'impression des Annales ; quant aux conditions des tirages à part, la convention a été trop vague et trop élastique ; nous rencontrons là à tout moment le point de départ de contestations qui, en se répétant, pourraient donner lieu à un conflit sérieux et amener, par le nombre de membres mécontents, un changement d'imprimeur, ce qui est toujours une chose fâcheuse pour les publications.

L'assemblée renvoie au Conseil la lettre de M. Vanden Branden et une commission, composée de MM. Weinmann, Fologne et de Borre, est invitée à étudier la question, de manière qu'elle soit définitivement résolue avant la fin de l'année.

Les Sociétés des Sciences naturelles de Styrie et d'Elberfeld nous adressent leurs publications.

L'Académie Royale Danoise des Sciences et Lettres, l'Académie

des Sciences, Lettres et Arts de Modène et la Société d'Histoire naturelle de Cassel nous accusent réception de nos publications.

Il est donné lecture d'une lettre du Cercle des Naturalistes Hutois, demandant à obtenir l'échange de publications. Après discussion, l'Assemblée décide que nos Comptes-rendus seront adressés au Cercle.

Il est aussi décidé que nos Comptes-rendus seront envoyés à la Société Entomologique de Brooklyn, qui vient de nous adresser le commencement de son Bulletin de cette année.

La Société a reçu un catalogue de livres entomologiques de R. Friedländer, un catalogue de coléoptères de M. Desbrochiers des Loges, les deux premiers numéros d'un journal pour les annonces entomologiques (*Insekten-Börse*, à Leipzig, Hospitalstrasse, 26), et divers spécimens et prospectus.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu les rapports de MM. Candèze et Duvivier, l'Assemblée vote l'impression dans les Annales du travail de M. H. Donckier de Donceel : *Premiers états de quelques Cassidides exotiques*, accompagné d'une planche.

Le Secrétaire présente trois petites notes envoyées par notre collègue M. Belon :

SUR UN PETIT GROUPE DE CORTICARIA PROPRES A LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

par le R. P. Fr. Marie-Joseph BELON, des Frères-Prêcheurs.

Parmi un certain nombre de *Lathrididae* recueillis par Helms à la Nouvelle-Zélande, ma collection renferme plusieurs espèces de *Corticaria* qui me paraissent avoir entre elles une affinité particulière et qui, jusqu'ici du moins, peuvent être considérées comme propres à la faune de cette région. Par l'ensemble de leurs caractères, elles appartiennent incontestablement à la coupe générique ébauchée par Motschulsky sous le nom de *Melanophthalma*, mais dont la diagnose véritable est due à la perspicacité scientifique de mon collègue et ami, M. Edm. Reitter (*Stett. ent. Zeit.*, 1875, page 431). Elles constituent dans ce genre un petit groupe intermédiaire entre les deux sections que j'ai établies pour y répartir les formes européennes. (Voir ma *Monographie des Lathridiens de France*, 2^e partie, actuellement sous presse.) La première de ces subdivisions comprend les espèces qui, comme la *M. transversalis*, ont les yeux distinctement éloignés du bord antérieur du corselet,

le premier arceau ventral orné de deux stries longitudinales obliques, et les pattes antérieures simples dans les deux sexes. La seconde renferme les espèces qui, comme la *M. gibbosa*, ont les yeux postérieurement contigus au prothorax, le premier segment abdominal dépourvu de lignes gravées, et les tibias antérieurs du ♂ dentés, puis échancrés sur leur tranche interne.

Ni l'une ni l'autre de ces formules ne s'applique entièrement aux espèces que j'ai en vue et qui, d'ailleurs, sont parfaitement reconnaissables entre toutes leurs congénères par la sculpture tout à fait caractéristique du pronotum. Celui-ci, en effet, toujours notablement plus étroit que les élytres, présente sur son milieu un sillon longitudinal parfois interrompu ou plutôt composé de deux fossettes, dont l'antérieure est ordinairement plus grande, et, de chaque côté avant l'angle postérieur, une dépression fovéiforme plus ou moins large et profonde.

Cinq espèces répondent à ce signalement : deux sont inédites, on en trouvera la description ci-après; les trois autres ont été publiées soit par M. le capitaine Broun, dans son *Manual of New-Zealand Coleoptera*, soit par M. Reitter, dans son mémoire intitulé: *Beiträge zur Käferfauna von Neu-Zeeland* (Brünn, 1879). Il sera facile de les distinguer entre elles à l'aide du tableau suivant, si, comme les matériaux à ma disposition permettent de le supposer, la coloration des étuis est assez constante, au moins dans ses lignes principales :

- A. Élytres à fond testacé jaunâtre ou rougeâtre, offrant sur leur disque des bandes ou des taches.
- B. Dessin des élytres constitué par une seule bande obscure située après le milieu.
- C. Cette bande en ligne droite **illustris** Reitter.
- C'. Cette bande en zig-zag. **fulgurita** Belon.
- B'. Dessin des élytres composé de plusieurs bandes ou taches.
- D. Deux bandes obscures en zig-zag : l'une un peu avant le milieu et l'autre après, nettement séparées sur le disque par une étroite fascie testacée couverte de poils argentés **picturata** Belon.
- D'. Des taches obscures : les postérieures formant une fascie interrompue; deux petites antérieures sur le milieu près de la suture; une plus grande derrière chaque épaule **variegata** Broun.
- A'. Élytres couleur de poix, avec leur moitié basilaire testacée, sans dessin régulier, formé par des bandes ou des taches **discoïdea** Broun.

1. *Melanophthalma illustris* Reitter.

Verhandl. d. natürl. Ver. in Brünn (1879), page 479 (*Corticarina*).

Syn. : *Corticaria fasciata* Broun, Man. N. Z. Col., page 235, n° 416.

Oblonga, convexa, fusco-ferruginea, griseo-pubescent, antennis nigris (articulo basali rufo), tibiarum apice tarsisque plus minusve infuscatis. Caput thorace vix angustius. Pronotum subtransversum, confertim fortiter punctatum, dorso longitudinaliter bifoveolato (foveola antica majore), lateraliter utrinque unifoveolatum. Coleoptera oblongo-ovata, thorace valde latiora, fortiter punctata, pone medium subareuatum nigro-unifasciata, stria suturali impressa. — Long., 4,2-4,5 mill.

A cette diagnose, très suffisante pour reconnaître l'insecte, j'ajouterai que le second article des antennes est parfois de la même couleur claire que le premier, que le rembrunissement des tarses et de l'extrémité des tibias est souvent assez peu sensible, et que la ponctuation des élytres est à peine régulièrement sériale. Les yeux, gros et saillants, occupent à peu près intégralement le bord latéral de la tête à partir des antennes, et n'offrent pas trace de tempes en arrière; le métasternum est faiblement échancré en triangle entre les hanches postérieures; enfin, le premier arceau ventral n'est pas orné de deux stries longitudinales obliques. Aucun de mes échantillons, tant chez l'espèce actuelle que chez les suivantes, ne m'a paru posséder une dent suivie de l'échancrure ordinaire aux tibias antérieurs du ♂, ni le premier article des tarses antérieurs dilaté, ainsi que cela a lieu dans le groupe de la *M. gibbosa*. Cela me porte à croire que la simplicité du métatarse et des tibias antérieurs dans les deux sexes est encore un des traits caractéristiques de la section nouvelle-zélandaise; car il n'est guère vraisemblable que mes quinze exemplaires soient uniquement des femelles.

Quoique le capitaine Broun ait eu seulement sous les yeux un ou deux individus rencontrés à Tairua, sa description fait bien ressortir les caractères essentiels de cette espèce très distincte et ne permet pas de la méconnaître. Aussi n'ai-je aucun doute sur la nécessité de la réunion synonymique que je viens de proposer.

2. *Melanophthalma fulgurita* Belon.

Oblonga, convexa, breviter flavo-pubescent, ferruginea, lateribus prothoracis interdum infuscatis, elytris stramineis aut pallide testaceis, pone medium fascia fusca angulatim sinuata signatis, antennis nigris, articulis duobus basalibus pedibusque rufis. Caput cum oculis magnis thorace vix angustius, in medio longitudinaliter subconvexum, sat fortiter punctatum, temporibus fere nullis. Pronotum subtransversum, confertim sat fortiter punctatum, ad latera rotundata utrinque foveatum aut profundius depressum, in medio longitudinaliter sulcatum aut bifo-

veolatum (fovea antica majore). Coleoptera thorace valde latiora, oblongo-ovata, fortiter vix seriatim punctata, antice juxta suturam subsulcata. — Long., 1,2-1,4 mill.

Très voisine de la *M. illustris* par sa forme générale et par la sculpture de son pronotum et de ses élytres, mais distincte par la coloration pâle de ces dernières et par la forme de la bande post-médiane, qui, au lieu d'être en ligne droite, est en zig-zag et forme pour ainsi dire trois V dont le médian, commun aux deux étuis, est en angle plus ouvert et légèrement interrompu au sommet, les bandes ne se réunissant pas sur la suture. Ce dessin la distingue de la *M. discoïdea*, dont les élytres sont bicolores, mais non ornées de bandes ou de taches régulières. On ne saurait davantage la confondre avec les *M. picturata* et *variegata*, qui offrent un système de coloration plus complexe.

3. *Melanophthalma picturata* Belon.

Oblonga, convexa, longius flavo-pubescens, plus minusve dilute testacea, lateribus thoracis tarsisque interdum infuscat, antennis nigris, articulis saltem basalibus, femoribus tibiisque rufis, elytris duplici fascia fusca signatis et aliquando etiam fusco-maculatis. Caput cum oculis magnis thorace vix angustius, fortiter punctatum, dense pubescens, temporibus fere nullis. Pronotum subtransversum, confertim sat fortiter punctatum, dense pubescens, ad latera rotundata utrinque leviter depressum, in medio longitudinaliter sulcatum aut bifoveolatum (fovea antica majore). Coleoptera thorace valde latiora, oblongo-ovata, grosse laud seriatim punctata, antice juxta suturam subsulcata. — Long., 1,3 mill.

Le dessin des élytres, composé de plusieurs bandes ou taches, fera aisément distinguer l'espèce actuelle des deux précédentes. Elle a néanmoins beaucoup d'affinité avec ma *M. fulgurita*; elle s'en éloigne par une coloration toute différente et par la pubescence plus longue, épaisse sur la tête et le corselet, subdéprimée sur les étuis, dont elle fait ressortir les bandes brunes. Bien que j'aie pu constater une assez grande variabilité dans l'extension des signatures élytrales, voici le dessin qui me paraît devoir être considéré comme celui de la forme typique. Sur un fond général couleur de paille, il existe une première bande qui part environ du tiers antérieur de l'étui et se dirige obliquement vers la suture, sans toutefois l'atteindre; une seconde bande post-médiane en zig-zag part du bord extrême, où elle se rattache à une grosse tache marginale située à peu près au milieu, descend d'abord légèrement jusqu'au quart postérieur, remonte en angle vers le milieu du disque, puis reprend une direction oblique vers la suture qu'elle ne couvre pas. Un exemplaire de ma collection offre, en outre, des parties plus ou moins rembrunies sur la moitié antérieure du disque, sur la marge

externe, et vers le sommet, de telle sorte qu'on pourrait presque dire que les écus sont obscurs avec deux bandes testacées, ondulées et obliques, rendues bien visibles par la pubescence de couleur claire. Il ne serait pas impossible que des matériaux plus abondants vinssent démontrer l'identité de mon espèce avec la *M. variegata*. Cependant la sculpture prothoracique et la ponctuation élytrale ne me semblent pas concorder avec la description du capitaine Broun; ce qui permet de supposer, jusqu'à preuve du contraire, que l'espèce est distincte.

4. *Melanophthalma variegata* Broun.

Man. N. Z. Col., page 236, n° 419.

Ne connaissant en nature ni cette espèce ni la suivante, j'ai dû emprunter à la description anglaise les éléments des diagnoses latines qu'on va lire :

Forma similis *M. fasciata* Broun (*illustris* Reitter), longius pallido-pubescens, brunneo-testacea (antennis??), pedibus dilutioribus, elytris piceo-maculatis. Pronotum fortiter punctatum, haud transversum, pone medium paulo angustatum atque ibi versus latera depressum, in disco longitudinaliter sulcatum (sulco fere interrupto aut bifoveolato). Coleoptera ovata, versus basin subdepressa, sat regulariter seriatim punctata, maculis piceis ornata, videlicet : posticis fasciam interruptam quae suturam non tangit efformantibus, 2 minoribus in medio juxta suturam rufescentem, et 2 majoribus pone humeros dispositis. — Long., circiter $\frac{2}{3}$ lin.

Un individu mutilé, recueilli près de Whangarei-Heads, a servi de type à la description de l'auteur du Manuel. A en juger par analogie, il est vraisemblable que les antennes offrent la coloration propre aux autres espèces de ce groupe. Il pourrait se faire, je l'ai dit plus haut, que ma *M. picturata* doive être réunie à la *M. variegata*, à titre de simple variété. Cependant plusieurs caractères de la description ne sauraient convenir à mon insecte, et j'ai cru qu'il valait mieux les séparer, au moins provisoirement.

5. *Melanophthalma discoïdea* Broun.

Man. N. Z. Col., page 236, n° 420.

Oblonga, convexa, picea, elytris longius pallido-pubescentibus, a basi ad medium testaceis. Caput rugose sculpturatum, postice latius. Pronotum longitudine vix latius, antice angustatum, sparsim subtilissime pubescens, fortiter rugoso-punctatum et inaequale, ad latera rotundata utrinque versus medium oblique elevatum ac postea depressum, disco longitudinaliter bifoveolato. Coleoptera ovata, fere rugoso-punctata, ad basin juxta suturam subdepressa. — Long., $\frac{2}{3}$ lin.

Le capitaine Broun a trouvé, aux environs de Whangarei-Heads, deux ou trois exemplaires de cette forme que la coloration particulière des élytres suffit à séparer des précédentes.

NOTES SYNONYMIQUES SUR QUELQUES LATHRIDIIDÆ
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

par le même.

1. **Holoparamecus lucidus** Broun, Man. N. Z. Col., page 232, n° 408 = **H. tenuis** Reitter, Verhandl. d. natürl. Ver. in Brünn (1879), page 179.

Par ses antennes de onze articles, par son prosternum très étroit séparant à peine les hanches antérieures, par la strie suturale des élytres, etc., cet insecte appartient manifestement au sous-genre *Catyplobium* (Aubé, *nec* Reitter). Il doit donc se ranger auprès de nos *H. niger* et *caularum* d'Europe avec lesquels il a de nombreuses affinités, mais dont il est bien distinct par la sculpture prothoracique et par plusieurs autres caractères importants. L'allongement du cinquième article des antennes (qui est aussi un peu plus renflé que ceux entre lesquels il se trouve), me paraît être un signe sexuel du ♂, de même que le large sillon du métasternum. Mes deux types du *tenuis* présentent ce double caractère, dont le premier n'est cependant signalé ni dans la diagnose, ni dans la description de M. Reitter. Je n'ai point vu de ♀, et c'est uniquement d'après les analogies constatées chez les espèces voisines que je suppose ce sexe autrement conformé sur ces deux points. Mes échantillons typiques ne m'offrent aucun vestige de sillon médian sur le disque du corselet, ni de carinule médiane anté-basilaire, quoique M. Reitter en fasse mention dans sa description détaillée du *tenuis*. Je ne parviens pas non plus à discerner, entre la suture et la strie suturale des élytres, une série de petits points dont le capitaine Broun aurait constaté l'existence chez son *lucidus*. Néanmoins, l'identité de celui-ci avec le *tenuis* ne me paraît pas faire l'ombre d'un doute.

2. **Lathridius antipodum** White, Voy. Er. Terr. Ins. (1846), page 18. — Broun, Man. N. Z. Col., page 233, n° 409 = **L. nodifer** Westwood, Introd. Class. Ins. I, page 155; pl. 13, fig. 23.

Cette synonymie est reconnue depuis longtemps, et je ne m'explique pas pourquoi l'auteur du Manuel des Coléoptères de Nouvelle-Zélande ne l'a pas admise et a voulu ressusciter la séparation spécifique du *L. antipodum*. Il avoue que celui-ci est très étroitement allié au *L. nodifer* décrit et figuré par Westwood; mais il n'indique aucun caractère différentiel. J'ai sous les yeux une dizaine d'échantillons reconnus par Helms à la Nouvelle-Zélande et d'autres provenant de Tasmanie, que je puis comparer avec de nombreuses séries d'échantillons européens. Taille, forme, sculpture,

caractère sexuel du ♂, et couleur même avec ses diverses variations suivant le degré de maturité de l'insecte, tout est identique.

3. M. le capitaine Broun a décrit (loc. cit., n° 410), sous le nom de **L. sculpturatus**, deux spécimens trouvés par lui à Auckland. Sauf une expression probablement inexacte (prothorax..... widest at the middle), tous les détails qu'il signale s'appliquent parfaitement au *L. nodifer*, et le doute de l'auteur lui-même sur la validité de son espèce me semble plus que suffisamment justifié. Pour moi, je n'hésite pas à ranger le **L. sculpturatus** parmi les synonymes du **L. nodifer**.

4. **L. costulatus** Broun, Man. N. Z. Col., page 234, n° 412. = **L. costatus** Erichson, Beitr. zur Insekten-Fauna von Vandiemensland, page 242.

L'excellente description du capitaine Broun, quoique faite d'après un seul échantillon, ne saurait laisser aucun doute sur l'identité de l'espèce zélandaise avec celle de Tasmanie. Ma collection renferme plusieurs individus de l'une et l'autre provenance : ils ne diffèrent en rien d'essentiel, et tous les caractères plastiques assignés par l'auteur du Manuel leur conviennent parfaitement.

5. Malgré quelques légères différences, signalées dans les proportions de la massue antennaire, dans le contour des étuis, leurs élévations costiformes, etc., j'incline à penser que le **L. marginalis** Broun (loc. cit., page 233, n° 411), décrit d'après deux exemplaires trouvés à Whangarei-Harbour, pourrait bien n'être également qu'un synonyme de l'espèce d'Erichson. Néanmoins, n'ayant pu corroborer mon impression personnelle, ni par l'examen de types authentiques, ni par l'étude de matériaux assez nombreux, je me borne à signaler mes doutes à l'attention des savants spécialistes qui seraient plus à même de prononcer un jugement motivé.

6. Tous les *Lathridius* qui précèdent appartiennent manifestement au sous-genre *Coninomus*. Il n'en est pas de même du **L. floridus** Broun (Man. N. Z. Col., page 234, n° 413), que je ne connais pas encore en nature, il est vrai, mais que les détails, relevés par l'auteur sur l'échantillon capturé par lui à Whangarei-Heads, indiquent plutôt comme faisant partie des *Enicmus*, et probablement du sous-genre *Comithassa*. D'autre part, les espèces énumérées dans le Manuel du capitaine Broun sous le nom générique de *Corticaria* me paraissent devoir être sans exception rangées parmi les *Melanophthalma*. Cependant, on retrouve à la Nouvelle-Zélande une forme européenne ou plutôt cosmopolite, qui y représente les *Corticaria* vraies : c'est la **C. serrata** Paykull

(*Fauna Succ.*, I, page 300), que je cite sur la foi de M. Reitter (*Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn*, 1879, page 179), car je n'en ai vu aucun exemplaire de cette provenance.

7. Dix espèces de *Melanophthalma* sont décrites par le capitaine Broun : trois d'entre elles sont mentionnées plus haut. (Voir la note précédente.) En ce qui concerne les sept autres, je ne vois que la **C. obesa** Broun (*Man. N. Z. Col.*, page 237, n° 421), diagnostiquée d'après un individu recueilli à Auckland, qui doit tomber en synonymie de la **M. splendens** Reitter (*Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn*, 1879, page 32). Le type de celle-ci, qui fait maintenant partie de ma collection, s'accorde exactement avec la description du Manuel, sauf d'insignifiantes variations de sculpture qui sont, du reste, très fréquentes chez les insectes de ce groupe, ou qui, comme la présence d'un calus huméral saillant, tiennent souvent à la différence des sexes. Par son facies et par les caractères plastiques de la page supérieure du corps, la *M. splendens* appartient au groupe de la *M. transversalis* d'Europe ; cependant elle ne possède point les deux stries longitudinales obliques qui ornent le premier arceau ventral dans les espèces de cette section.

SUR UN METOPHTHALMUS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

par le même.

Avec une obligeance dont je ne saurais trop lui être reconnaissant, notre savant collègue d'Angleterre, M. Sharp, vient de mettre à ma disposition ses *Lathridiidae* de Nouvelle-Zélande. Parmi des matériaux très intéressants, dont je ne manquerai pas de faire usage dans une étude ultérieure, je rencontre une singulière nouveauté qu'il importe de faire connaître immédiatement. C'est un insecte appartenant, non seulement par le facies, mais par tous ses caractères essentiels, au genre *Metophthalmus* Woll., quoique ses antennes soient évidemment composées de onze articles bien distincts. Signalons donc, après le fait déjà constaté chez les *Holoparamesus*, ce nouvel exemple de variabilité dans le nombre des articles antennaires, et par suite la valeur moindre qu'on doit accorder à ce caractère au point de vue générique dans la famille qui nous occupe.

Voici la diagnose rédigée sur trois exemplaires, dont l'enduit cryptogamique blanchâtre n'a pas été conservé :

Metophthalmus sinuosus Belon.

Elongatus, convexiusculus, ferrugineus, antennis 11-articulatis pedibusque dilutioribus. Caput thorace duplo angustius, fronte carinulis 2 antrorsum conver-

gentibus, postice versus oculos subarcuatis instructa. Pronotum transversum, in disco bicostatum et pluri-tuberculatum lateraliter valde explanatum, ante medium rotundatum, versus basin distincte angustius, angulis posticis rectis. Coleoptera oblongo-ovata, circa medium paulo dilatata, striarum punctis grossis paucis profundis, rugulose transversim confluentibus, interstitiis 3^o (integro) et 5^o (antice abbreviato) fortiter elevato-carinatis, sinuosis; supra depressis, extus obtusangulis. — Long., 4,3-4,6 mill.

Par sa taille avantageuse et par ses élytres environ deux fois aussi longues que larges, cet insecte, recueilli à Auckland, doit se placer dans le voisinage de notre *M. niveicollis* d'Europe; mais, outre que son prothorax est notablement plus large et que le contour huméral des élytres est tout autre, il en est essentiellement distinct, comme aussi de tous ses congénères sans exception, par ses antennes de onze articles et par la sculpture du pronotum et des élytres. Celles-ci sont, en effet, remarquables par les deux fortes côtes sinueuses (très finement ciliées) que forment les troisième et cinquième interstries: la première est entière et converge en arc vers la suture, légèrement à la base, mais plus fortement à l'extrémité, sans toutefois se réunir à la suture, qui est à peine relevée et seulement de la voussure au bout; la seconde côte, au contraire, est brusquement raccourcie en avant, à peu près vers le cinquième. Le corselet est plus difficile à décrire avec exactitude en ce qui concerne les élévations discales: néanmoins, je crois donner une idée correcte de ces détails en disant que les deux côtes antérieures semblent partir de deux tubercules médians, situés à quelque distance l'un de l'autre ainsi que du bord lui-même, et divergent en ligne droite pour se terminer également par un tubercule un peu après le tiers de la longueur; entre ces tubercules postérieurs, se trouvent compris deux autres tubercules écartés, qui indiquent pour ainsi dire le point de départ des côtes discales ordinaires, interrompues ici ou plutôt supprimées par une impression transverse, et représentées seulement près de la base par deux légères élévations tuberculiformes.

M. Eug. Simon nous adresse le travail suivant:

NOTE SUR LE GROUPE DES *DIOLENI* (FAMILLE DES *ATTIDE*)

ET DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES,

par E. Simon.

Le genre *Diolenius* Thorell et quelques types voisins forment un groupe très naturel dans la famille des *Attida*, caractérisé par la structure des pattes de la première paire: le trochanter est très

long, beaucoup plus que celui des trois autres paires de pattes et cylindrique; chez les *Diolenius* et les *Atrytone* la longueur du trochanter est telle, qu'elle égale presque celle du fémur et celle du céphalothorax entier; chez les trois autres genres le trochanter est moins anormal, il reste néanmoins beaucoup plus long que chez tous les autres Attides connus; le métatarse est cylindrique ou comprimé, il se rétrécit et se courbe près de l'articulation basilaire, ce qui lui permet de se replier sous le tibia, toujours pourvu en dessous de deux rangs de fortes épines limitant une sorte de gouttière.

Chez les *Diolenii* le plastron est ovale, plus large que les hanches intermédiaires et à peine atténué en avant; les hanches de la 1^{re} paire sont cylindriques, plus de deux fois plus longues que celles de la seconde paire et un peu plus largement séparées, leur intervalle étant aussi large que la pièce labiale et les lames maxillaires à la base.

Les différences sexuelles portent sur la structure du métatarse de la première paire; chez le mâle, cet article est mutique (*Chalcolecta*) ou pourvu de quelques très petites épines perpendiculaires, disposées par paires (*Diolenius*), tandis que chez la femelle il offre en dessous trois ou quatre paires de très longues épines couchées en avant; dans les genres *Discocnemius* et *Lystrocteisa*, le métatarse antérieur offre cependant cette dernière disposition chez les deux sexes.

TABLEAU DES GENRES.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Trochanter 4 coxa multo longior femore parum brevior. | 2. |
| Trochanter 4 coxa brevior (præsertim ♀) femore multo brevior | 3. |
| 2. Cephalothorax humilis. Quadrangulus oculorum latior quam longior. Tibia 4 gracilis parallela (ex Keys.) | <i>Atrytone</i> . |
| Cephalothorax sat altus. Quadrangulus oculorum fere æque longus ac latus. Tibia 4 compressa plus minus dilatata. | <i>Diolenius</i> . |
| 3. Quadrangulus oculorum multo longior quam latior et multo longior quam pars thoracica. Oculi seriei 2 ^æ multo longius ab oculis posticis quam ab oculis anticis locati. . | <i>Lystrocteisa</i> . |
| Quadrangulus oculorum fere æque longus ac latus, parte thoracica fere longitudine æqua. Oculi seriei 2 ^æ vix longius ab oculis posticis quam ab oculis anticis locati. . | 4. |
| 4. Pedes breves, tibia antica valde compressa et dilatata spinarum validarum seriebus duabus atque linea media pilorum crassorum infra insigne instructa. | <i>Discocnemius</i> . |
| Pedes longi, tibia antica compressa, parallela haud dilatata, spinis validis et numerosis biseriatim dispositis infra armata. | <i>Chalcolecta</i> . |

Le groupe des *Diolenii* est jusqu'ici exclusivement propre à la Malaisie et à l'Australie.

Le genre *Atrytone* Keyserling m'est inconnu; il ne renferme qu'une seule espèce, *A. anomala* Keys., originaire de Sydney (Cf. Keyserling in L. Koch, *Ar. austr.*, p. 1378, pl. 116, fig. 6).

1^{er} genre DIOLENIUS Thorell.

1^{er} groupe : *Metatarsus anticus subter 5 paribus aculeorum instructus*.

1. **Diolenius phrynoides** Walek., Ap. t. I, 1837, p. 479 (sub *Attus*).

Attus obisoides Doleschall, Bijdr. Arachn. Ind. Archip., 1857, p. 433, fig. 2.

Diolentus phrynoides Thorell, Rag. Mal., II, p. 215. — Id., L. Koch, *Ar. Austr.*, p. 1240.

Amboine, Nouvelle-Guinée sept. et occid. (Mus. Gen., coll. Simon).

2. **D. amplexans** Thorell, l. c., p. 412 (sp. invis.).

Ile Arou, Nouv. Guin. : Ramoi (Mus. Gen.).

3. **D. lugubris** Thorell, l. c., p. 414 (sp. invis.).

Nouv. Guin. : Ramoi (Mus. Gen.).

4. **D. bicinctus** sp. nov. — ♀ long., 6,6 mill.

Cephalothorax tenue rugosus obscure fusco rufescens, parte cephalica utrinque nigra, pilis brevibus supra flavis in lateribus albidis sparsus, fere dimidio longior quam latior, tibia cum patella IV evidenter brevior. Quadrangulus oculorum haud latior quam longior supra fere planus. Abdomen anguste ovatum, obscure fulvum, flavo-aureo breve pubescens, pone medium lineis albis binis transversis inter se approximatis, 1^a recta, 2^a paulo arcuata, supra ornatum. Pedes Iⁱ paris fusco micantes coxa fulva, patella tota tibia ad apicem albo opacis, metatarso tarsoque obscure fulvis, tibia plus triplo longiore quam latiore, supra in parte prima convexa, subter aculeis 7-7 longis apicem versus sensim brevioribus armata, metatarso subter 5 paribus aculeorum longorum instructo. Pedes II testacei femore tibiaque utrinque infuscatis, tibia metatarsoque infra spinis minutis 3-3 armatis. Pedes III et IV mutici, obscure fusci, coxis, trochanteris, patellis, apice metatarsorum tarsisque fulvo testaceis. Area vulvæ plana semicircularis latior quam longior, tenue nigro marginata atque in medio obscure binotata.

Moluques : Edkor, N. E. de l'île Halmahera (Gilolo) (coll. Simon).

Paraît voisin de *D. amplexens* Th., mais en diffère par le céphalothorax beaucoup plus court que patella et tibia de la 4^e paire, les patellas antérieures blanches, le dessin tout autre de l'abdomen.

2^e groupe : *Metatarsus anticus subter 7 paribus aculeorum instructus*.

5. *D. armatissimus* Thorell, l. c., p. 417.

Ternate (Mus. Gen.), Ternate, Gilolo, Batjan (coll. Simon).

La femelle diffère du mâle, seul sexe décrit par le Dr Thorell, par ses pattes antérieures plus courtes avec les patellas blanches, les épines du métatarse longues et couchées. L'abdomen est noirâtre en avant, noir à reflets bleus en arrière avec les deux teintes séparées par une étroite ceinture de poils blancs.

3^e groupe : *Metatarsus anticus subter 3 paribus aculeorum munitus*.

6. *D. albomaculatus* Thorell, l. c., p. 418 (sp. inv.).

N. Guin. : Ramoi (Mus. Gen.).

7. *D. venustus* Thorell, l. c., p. 421.

Ternate (Mus. Gen., coll. Simon).

8. *D. vittatus* Thorell, l. c., p. 423.

Ternate.

Probablement une variété du précédent.

9. *D. bifasciatus* Thorell, l. c., p. 425.

N. Guin. : Ile Kei (Mus. Gen.).

2^e genre *LYSTROCTEISA* nov. gen.

Voisin de *Diolenius*, seulement : carré oculaire plus long que la partie thoracique, beaucoup plus long que large, convexe en avant, déprimé dans le milieu, yeux 3 fortement saillants, plus gros et visiblement plus écartés que latér. antér. Yeux 2 beaucoup plus rapprochés de latér. antér. Trochanter 1 cylindrique, un peu plus court que la hanche, beaucoup plus que le fémur ; fémur très large claviforme, tibia presque globuleux, comprimé en dessous avec deux rangs de longues épines ; métatarse grêle pourvu de deux paires d'épines longues.

Lystrocteisa myrmex sp. nov. — ♂ long., 4 mill.

Cephalothorax nigro piceus, fere glaber, nitidissimus, subtilissime striolatus. Abdomen fere cylindricum, antice fusco opacum cum vitta transversa arcuata pilosa albido lurida ornatum, postice convexum fusco piceum duriusculum et parcissime pilosum. Sternum nigrum, nitidum. Pedes I nigri metatarsis tarsisque fusco rufescentibus : femore crasso claviformi, tibia crassissima subglobosa infra biseriatis longe spinosa et longe setosa, metatarso gracili, infra spinis quatuor longis instructo. Reliqui pedes sat graciles, lurido testacei, coxis nigris, femoribus tibiis metatarsisque plus minus late nigro lineatis. Pedes maxillares graciles, fuscii, tarso fulvo, tibia mutica patella haud brevior, tarso elongato tibia haud vel vix latiore.

N. Caled. : Nouméa (Savès, coll. Simon).

3^e genre DISCOCNEMIUS Thorell, Rag. Mal., III, 1881, p. 428.

Carré oculaire au moins aussi long que la partie thoracique, un peu plus large en arrière qu'en avant, et au moins aussi long que large, plan avec des saillies assez fortes pour les yeux dorsaux. Yeux presque comme *Diolenius*, seulement antér. en ligne moins fortement courbée, la base des latéraux presque au niveau du centre des médians. Trochanter I un peu plus court que la hanche et beaucoup plus que le fémur; fémur large comprimé; tibia dilaté fusiforme pourvu en dessous de deux rangs de longues épines et d'une ligne médiane de longs crins serrés; métatarse grêle pourvu en dessous de trois paires de longues épines. Pattes 4, 1, 2, 3 ou 1, 4, 2, 3.

L'espèce type **D. lacertosus** Thorell (l. c., p. 429), originaire de Somerset (Cap York), m'est inconnue.

Discocnemius albocingulatus sp. nov. — ♀ (pulla) longueur 4,5 mill.

Cephalothorax subtilissime coriaceus, niger, parte cephalica utrinque et antice pilis albis sparsa, parte thoracica, antice, pone oculos posticos, vitta transversa lata alba notata. Abdomen elongato ovatum, fusco piceum, vitta media arcuata atque macula postica albo-pilosis supra ornatum. Pedes I fuscii apice tibiis metatarsis tarsisque testaceis, tibia dilatata et compressa sed plus duplo longior quam latior aculeis 8-8 subter armata, metatarso aculeis 3-3 instructo. Pedes postici testacei femoribus tibiisque nigro lineatis.

N. Guin. Dorey (coll. Simon).

Discoenemius coccineopilosus sp. nov. — ♂ longueur, 5,2 mill.

Cephalothorax niger subtilissime coriaceus, pilis flavo aurantiis omnino dense vestitus. Abdomen ovato elongatum nigrum, antice macula magna flavo aurantiaca, postice supra mamillas macula alba magna pilosa supra læte decoratum. Pedes II, III et IV graciles, testacei, femoribus tibiisque utrinque paulo infuscatissimis supra albido pilosis, coxa I fusco micante, reliquis coxis testaceis. Pedes maxillares fusco micantes, tarso supra macula pilosa albo-nivea ornato, tibia patella paulo brevior extus ad apicem apophysis brevi crassa truncata cum angulo superiori brevis acute producta, tarso ovato tibia paulo latiore.

N. Guin. Dorey (coll. Simon).

Un seul mâle en mauvais état dont les pattes antérieures manquent.

4^e genre **CHALCOLECTA** nov. gen.

Carré oculaire au moins aussi long que la partie thoracique, de même forme que chez *Diolenius*; yeux semblables seulement antér. en ligne moins courbée. Trochanter I plus court que la hanche (surtout ♀) et beaucoup plus que le fémur; fémur et tibia I très longs, comprimés; parallèles, non dilatés et tibia pourvu en dessous de deux séries d'au moins 10+10 épines fortes, alternativement plus courtes et plus longues; métatarse plus court que le tibia, ♂ mutique comprimé et anguleux, ♀ cylindrique et pourvu en dessous de longues épines, trois ou quatre paires. Pattes longues 1, 4, 3, 2.

Chalcolecta dimidiata sp. nov. — ♂ long., 8 mill.

Cephalothorax tenue coriaceus fusco rufescens, parte cephalica cyaneo micante tincta, maculis ocularibus nigris, pilis oculorum fasciei supra luteis infra albis. Abdomen ovato elongatum planum antice posticeque valde attenuatum, supra duriusculum, in parte prima nigrum dein albo opacum apicem versus sensim infuscatum. Pedes antici læte fusco rufescentes, metatarso tarsoque nigris, pedes postici fusci coxis trochanteris tarsisque testaceis; tibia I infra aculeis 10+12 instructa, metatarso mutico valde compresso infra acute carinato. Pedes maxillares gracillimi, fulvi, tibia patella paulo longior versus apicem leviter incrassata atque extus apophysis brevi et simplici instructa, tarso minimo tibia vix latiore et vix longior. ♀ Metatarsi antici fere cylindrici spinis inferioribus longis 3-3 instructi.

Moluques : Edkor, N.-E. de l'île Halmahera (Gilolo) (coll. Simon).

Chalcolecta bitæniata sp. nov. — ♀ long., 8,5 mill.

Cephalothorax fulvo rufescens antice paululum infuscatus maculis ocularibus nigris latis notatus. Abdomen angustissimum et longum albo opacum, vittis fuscis binis longitudinalibus apicem haud attingentibus atque postice pone mamillas vitta transversa arcuata fuscis supra ornatum, mamillis nigris. Pedes antici obscure fulvo rufescentes, tibia fusco late biannulata, metatarso nigro a basi testaceo, tarso, testaceo a basi infuscato. Pedes sex postici omnino testacei. Tibia I compressa infra 12 + 12 valde aculeata, metatarsus I fere cylindricus 3-3 longe aculeatus. Area vulvae minima, plana, fere semicircularis, anguste rufulo marginata, in medio fusco binotata.

Moluques : Edkor, N.-E. de l'île Halmahera (Gilolo) (coll. Simon).

M. Simon envoie aussi la note suivante :

NOTE SUR LES ARACHNIDES

RECUEILLIS PAR M. WEYERS A AGUILAS, PROVINCE DE MURCIE.

1. *Hasarius Adansonii* Sav. (1 exemplaire).

2. *Menemerus semilimbatus* Hahn (5).

3. *Menemerus Paykulli* Sav. (3).

Nous avons jusqu'ici rapporté cette espèce au genre *Hasarius*, elle nous paraît aujourd'hui devoir rentrer dans le genre *Menemerus*. Chez la femelle, en effet, le tibia et la patella de la troisième paire de pattes sont visiblement plus courts que ces mêmes articles à la quatrième paire; chez le mâle, la différence de longueur est très peu sensible. *M. Paykulli* est presque cosmopolite : il habite tout le midi de l'Europe, une grande partie de l'Afrique, l'Inde, la Malaisie, les Iles Philippines, la Nouvelle-Guinée; nous l'avons reçu aussi du Mexique et du Brésil.

4. *Lycosa radiata* Latr. (1).

5. *Lycosa fasciiventris* L. Duf., Ann. Sc. Nat., 2^e sér., Zool., III, 1835, p. 161. — Id., E. Simon, Et. Ar., VII, 1876.

Nous n'avons pas observé cette espèce aux environs de Carthagène; elle paraît y être remplacée par *L. Dufouri* E. S.

6. *Synœma globosum* Fabr. (1).

7. *Oxyptila albimana* E. Sim. (1).

8. *Textrix coarctata* L. Duf. (1).

9. *Epeira Redii* Scopl. (1).

10. *Enoplognatha mandibularis* Lucas (4).

11. *Lithyphantes paykullianus* Walck. (5).

12. *Stegodyphus lineatus* Latr. (4).

13. *Palpimanus gibbulus* L. Duf. (3).

14. *Drassus severus* C. Koch. (3).
15. *Drassus auspeæ* E. Sim., Ar. Fr., t. IV, 1878, p. 154 (2).
16. *Pythonissa plumalis* Cambr. (2).
17. *Pythonissa exornata* C. Koch (1).
18. *Loxosceles rufescens* L. Duf. (1).
19. *Dysdera crocata* C. Koch (4).
20. *Filistata testacea* Latr. (1).
21. *Ischnocolus andalusiacus* E. Sim., Aran. Nouv., etc., 2^e mém., Liège, 1873 (3).
22. *Pachylomerus edificatorius* Westw., Trans. of the Ent. Soc. of Lond., III, 1840, p. 170, pl. X, fig. 1 à 25 (sub *Actinopus*) = *Actinopus algerianus* H. Lucas, Expl. Alg., Ar., p. 96, pl. I, fig. 5 — *Pachylomerus edificatorius* E. Simon, Bull. Soc. Zool. Fr., 1881, p. 11.

Cette espèce a été découverte au Maroc; elle est commune en Algérie, principalement dans l'est, mais jusqu'ici elle n'avait pas été signalée en Espagne. Nous l'avons cependant observée en juin 1882, sur les collines qui avoisinent Carthagène.

P. edificatorius creuse un terrier relativement court et large, tapissé d'une double enveloppe soyeuse très épaisse, presque papyracée et entière. L'opercule est simple, mince, mais rigide, et recouvert de terre en dessus, il est semi-circulaire transverse, attaché par une base très large souvent à la partie inférieure de l'ouverture.

23. *Garypus litoralis* L. Koch, 1873. — Id., E. Sim., Ar. Fr., t. VII, p. 48 (1).

N'avait jamais été trouvé en Espagne. Nous avons découvert cette espèce en Corse, à Bonifacio, et retrouvé depuis en Provence et à Alger. Sur quelques points du littoral espagnol, notamment au cap Palos, près Carthagène, et à Tarragone, *G. litoralis* L. Koch est remplacé par *G. saricola* Waterh., qui s'en distingue surtout par la main de la patte-mâchoire beaucoup plus large.

24. *Buthus europæus* L. (en nombre).

M. le Dr Heylaerts nous adresse les communications suivantes :

Il y a quelques jours, je fus très agréablement surpris par l'arrivée d'un cadeau, que j'apprécie énormément à cause du donateur, Son Altesse Impériale le Grand-Duc Nicolas Michaelowitch, et, d'autre part, à cause de sa grande valeur scientifique. Mes collègues belges voudront bien comprendre que je désire m'acquitter ici d'une grande dette de reconnaissance en remerciant chaleureusement S. A. I., en priant S. A. I. de vouloir bien agréer l'expression de ma parfaite gratitude.

Pour fixer l'attention de mes collègues sur le livre en question, je crois qu'un rapport court, malheureusement trop superficiel, peut trouver sa place ici.

Sous le titre de : *Mémoires sur les Lépidoptères*, S. A. I. a publié le tome I d'un travail sur les papillons du Caucase, et nous promet la continuation annuelle. Non seulement les espèces caucasiennes, mais aussi celles du vaste empire russe y seront traitées de préférence, toutefois sans exclusion absolue de la faune des autres pays. Ce tome I, édité à Saint-Petersbourg, d'un grand luxe typographique, est pourvu de dix planches à figures coloriées, de vrais chefs-d'œuvre. Les dessins ont été exécutés par M. Lang et une seule par mon savant compatriote M. Brants; ils ont été gravés par MM. Debray et Castelli et coloriés par M. Lang.

La première partie : *Lépidoptères de la Transcaucasie*, est entièrement de la main du Grand-Duc. S. A. I. commence à peindre le Caucase tel qu'il est, indique les erreurs géographiques commises par plusieurs auteurs entomologiques, tels que Kolenati, Lederer, Becker, etc., et énumère les explorateurs scientifiques qui, depuis 1870, ont parcouru le Caucase au point de vue entomologique, entre autres MM. Christoph, Sievers, Mlokossévitch, Hedemann, le lieutenant-général Komaroff et S. Alpheraky. S. A. I. lui-même collectionna plus de dix années consécutives à Tiflis et à Borjom, dont les environs sont décrits minutieusement à la fin de l'aperçu géographique.

Une carte superbe nous est d'une grande utilité pour suivre la description détaillée du Grand Caucase et du Petit ou Anti-Caucase. Conduits par le cicerone impérial, nous montons depuis le dernier jusqu'aux Gletschers du second. Pendant l'ascension lente et sûre, force détails de toute nature, mais tous très intéressants au point de vue entomologique, nous sont indiqués.

En un mot, le Caucase nous est peint d'une main de maître, et cette peinture prouve que l'auguste auteur possède de vastes connaissances géographiques, et que les sciences hydrographiques, météorologiques, botaniques, etc., lui sont assez familières.

Un tableau indiquant la hauteur, la situation et la température de diverses localités du Caucase, puis un aperçu de la végétation, dont les limites ont été tracées en ligne horizontale et en ligne verticale, complètent la description.

Après cette introduction, S. A. I. commence l'énumération des Lépidoptères du Caucase, c'est-à-dire entièrement celle des *Rhopalocères*; des *Hétérocères*, les *Sphingides*, les *Sésiides*, les *Syntomides* et des *Bombyces* les familles des *Nyctéolidæ*, des *Lithosidæ*, des *Arctidæ* et des *Hepialidæ* sont traitées d'une manière supérieure. Plusieurs espèces inédites sont décrites et

figurées (S. A. I. promet de faire dessiner de nouveau quelques espèces publiées antérieurement, mais figurées imparfaitement par leurs auteurs).

Les espèces nouvelles et les variétés non encore décrites et figurées, planches I-V, sont les suivantes :

Rhopaloc. : 1. *Alexanor* Esp. var. *Orientalis* Rom.; 2. *Thestor Romanovi* Chr.

Sesiidæ : 1. *Sesia dioctriiformis* Rom.

Zygænæ : 1. *Z. Cambysea* Led. var. *rosacea* Rom.

Arctiidæ : 1. *A. villica* L. var. *confluens* Rom.

Hepialidæ : 1. *Hep. Mlokossevitschi* Rom.

Le travail de Son Altesse Impériale est suivi de l'énumération des Lépidoptères trouvés dans le pays habité par la tribu des Achal-Tekke par M. H. Christoph. Ce naturaliste, bien connu de tous les lépidoptérogistes par ses intéressants travaux insérés dans la " Stettiner entom. Zeitung ", etc., avait été envoyé par S. A. I. pour explorer au point de vue entomologique ces contrées habitées par des hordes rapaces et à moitié sauvages, récemment soumises à l'empire russe. Après avoir raconté brièvement les particularités de son voyage et de son séjour dans ce pays inhospitalier, il en donne un aperçu de la faune lépidoptérologique, et énumère 153 espèces (*Rhopalocera* jusqu'aux *Noctuinæ* inclusivement). Les *species novæ* et *varietates* décrites sont :

1. *Anthocharis Belia* var. *pulverata* Chr.; 2. *A. Thomyris* Chr.; 3. *Hesperia Ahriman* Chr.; 4. *Zygarna Smirnovi* Chr.; 5. *Enggyna Læwii* var. *pallidior* Chr.; 6. *Hypopta mucosus* Chr.; 7. *Endagria agilis* Chr.; 8. *E. clathrata* Chr.; 9. *Agrotis devota* Chr.; 10. *A. contrita* Chr.; 11. *Manestra albipicta* Chr.; 12. *Episema antherici* Chr.; 13. *Scotochrosta* (?) *distincta* Chr.; 14. *S.* (?) *fissilis* Chr.; 15. *Acontia Eylandti* Chr.; 16. *Talpocharis munda* Chr.; 17. *Photodes Erschoffii* Chr.; 18. *P. limata* Chr. (Planches VI-VIII.)

Page 139, le Dr Staudinger donne un supplément au travail précédent, en énumérant les Lépidoptères qu'il a reçus de ces mêmes contrées par M. Eylandt. Les *species novæ* figurées planche IX sont : 1. *Cossus (Holeocercus) nobilis* Stgr.; 2. *C. (H.) holosericeus* Stgr.; 3. *Acontia dentata* Stgr.; 4. *A. (Armada) Clin* Stgr.; 5. *Leucanitis sinuosa* Stgr.; 6. *L. (?) nana* Stgr.; 7. *Palpangula cestina* Stgr.

Un nouveau genre des *Pyralides*, par M. P. C. T. Snellen, *Amphibolia* Snell. pour la *Pyraustoides* Erschoff (Planche X) et quelques " Lepidopterologische Mittheilungen ", par M. G. Grumm-Grshimaïlo, terminent le tome I.

Hormis les nouvelles espèces mentionnées, plusieurs autres décrites antérieurement sont figurées. Ce sont :

- Planche I. — 3. *P. Alciphron* var. *Melibæus* Stgr.; 4. *P. Satraps* Stgr.; 5 et 6. ♂♀ *M. Larissa* var. *Aslanda* Stgr.; 7. *P. Maera* var. *Adrastoides* Bienert.
- II. — 1 et 2. ♂♀ *Sat. Pelopea* var. *S. Schahrudensis* Stgr.; 3 et 4 ♂♀ var. *persica* Stgr.; 5 et 6 ♂♀. *S. Alpina* Stgr.
- III. — 1 ♂, 2 ♀, 3 ♂. *Sat. Mamurra* var. *Schakuhensis* Stgr.; 4 et 5 ♂♀. *S. Parisatis* Koll.; 6 et 7 ♂♀. *Coenonympha Saadi* Koll.; 8 et 9 ♂♀. *C. Symphita* Led.
- IV. — 1. *Deilephila porcellus* var. *suellus* Stgr.; 2 et 3 ♂♀. *Sesia empiformis* var. *schizozetiformis* Koll.; 4. *Zygæna Erebus* Stgr.; 5. *Z. Armenia* ab *flava*; 6. *Z. Cuvieri* B.; 7. *Syntomis caspica* Stgr.; 8. *Setina irrorella* var. *flavicans* B.
- V. — 2. *Sciapteron ferridum* Ld. var.; 4^{ab}. *Hepialus Lætus* Stgr. ♂♀; 5. *Axiopæna Maura* Eichw.
- VI. — 2^{ab}. *Lycæna Christophi* Stgr. ♂♀; 3^{ab}. *L. Zephyrinus* Stgr. ♂♀; 4. *L. Miris* Stgr. ♂; 7. *Syrictus Staudingeri* Spr. ♂.
- VII. — 1^b. Chenille de l'*Ænogyna* var. *pallidior* Chr.; 5. La chenille de *Chondrostege pastrana* Led.; 7. *Agrotis spinifera* Stgr. ♂.
- VIII. — 2^b. La chenille de l'*Episema Antherici* Chr.; 4 ? *Palpangula Christophi* Ersch.; 9. *Photedes Nisilkumensis* Ersch. ♂; 10. *P. secunda* Ersch. ♂; et 11. *Spintherops gracilis* Stgr. ♂.
- IX. — 8. *Palpangula spilota* Ersch.; et 9. *P. Henkei* Stgr.
- X. — Contient, outre la figure de l'*Amphibolia pyraustoides* Ersch., celles de sa nervulation, de sa tête et de son antenne.

Par ce qui précède, mes collègues ont pu remarquer le service immense que Son Altesse Impériale a rendu à l'entomologie, non seulement par la publication du chef-d'œuvre en question, mais aussi par ses efforts pour faire connaître la faune de ces contrées

lointaines et inhospitalières, et chercher le rapport entre la faune paléo-arctique avec celle des tropiques. Par sa haute position, par ses talents et ses vastes connaissances et surtout par son feu sacré par rapport à notre chère science, S. A. I. peut effectuer de grandes choses au point de vue entomologique.

Je veux fixer l'attention de mes collègues belges sur un travail de M. Georges Rouast, de Lyon : « Catalogue des chenilles européennes », Lyon, imprimerie Pitrat aîné, 4, rue Gentil.

M. G. Rouast a fait tout pour compléter autant que possible ce qu'il promet, c'est-à-dire d'indiquer les *plantes nourricières* des chenilles des Macro et Microlépidoptères de la faune européenne, l'époque où elles paraissent et leur manière de vivre. Il en a cherché les matériaux un peu partout, et quoique j'aie trouvé par-ci par-là quelques omissions, inévitables dans ces sortes d'ouvrages, son travail est des plus méritants, beaucoup plus complet que celui de M. A. Hartmann, et peut rendre de grands services aux lépidoptéristes. Je le leur recommande chaleureusement.

Le Dr Staudinger a commencé de publier un travail sur les Lépidoptères exotiques, sous le titre : *Exotische Schmetterlinge, Abbildungen und Beschreibungen der wichtigsten exotischen Tagfalter, in systematischer Reihenfolge mit Berücksichtigung neuer Arten, von Dr O. Staudinger, unter technischer Mitwirkung von Dr H. Langhans. Mit gegen 1500 color. Abbild. auf 120 Tafeln in Folio-Format. Vollst. in 24 Lief. à 3 M.*

Je crois que nous avons à attendre du Dr Staudinger quelque chose de bon, de solide et d'instructif. Surtout les papillons exotiques, si peu connus de la plupart des lépidoptéristes, ont bien besoin d'être étudiés. L'ouvrage sera complet en deux années. Les livraisons mensuelles contiendront 5 planches coloriées avec le texte nécessaire, et ne coûteront que trois marks. Aussi cet ouvrage-là, je le recommande instamment à mes collègues.

M. de Borre revient à la communication faite par lui, à la séance précédente, de l'apparition, dans un moulin de Lodelinsart, d'un microlépidoptère fort nuisible. Ainsi qu'il le lui avait conseillé, le propriétaire du moulin, M. Brisack, s'est adressé à M. M. Girard, notre savant confrère de Paris, qui a reconnu dans le lépidoptère l'*Ephestia kuehniella* Zeller. Cet incident a donné lieu à une note et à une discussion entre MM. Girard et Ragonot, à la séance du 28 mai dernier de la Société Entomologique de France, note et discussion très intéressantes pour les lépidoptéristes, mais moins pour les meuniers, attendu qu'il n'en est rien ressorti de bien caté-

gorique, de bien efficace quant aux procédés pour venir à bout de cet ennemi.

À propos de ce même micro, notre collègue M. Maurissen m'écrit ce qui suit :

En réponse à votre lettre d'avant-hier, je m'empresse de vous faire savoir que l'*Ephestia Kuehniella* Zeller a fait son apparition ici, peut-être pour la première fois en Europe, en septembre 1879, dans une fabrique de vermicelle appartenant à un de mes cousins. Celui-ci pense qu'elle lui est arrivée avec du maïs d'Amérique. Le pire est qu'elle se propage l'hiver comme l'été et qu'elle fait d'énormes ravages. Mon cousin m'a consulté aussi pour savoir par quel moyen il pourrait la détruire. Je lui ai conseillé de fermer autant que possible les locaux où elle se trouve et d'y brûler des mèches de soufre. Cela a aidé pour un certain temps, mais on a failli incendier la fabrique. Il a essayé alors de l'acide phénique, ce qui procure une odeur détestable et n'a pas été non plus un remède radical.

J'ai été hier à la fabrique, où j'ai appris qu'on se bornait maintenant à faire continuellement la chasse à ce détestable micro, après avoir fait un nettoyage général. Si l'on parvenait à découvrir un moyen de destruction plus efficace, vous m'obligeriez infiniment en me le faisant connaître.

M. Fologne demande la parole et dit qu'il croit que, dans un cas de ce genre, c'est à l'insecte parfait qu'il faut faire la chasse; à l'état de larve et de chrysalide, il est trop protégé contre les causes de destruction. Il ne croit pas non plus qu'il fasse sa nourriture de la soie des blutoirs, mais il pourrait très bien trouver dans ces appareils des matériaux pour la construction de ses coques.

M. Fologne fait ensuite voir un exemplaire de la *Notodonta bicoloria* Schiff., qu'il a capturé le 29 juin à Sanzinne, dans le domaine royal d'Ardenne. Cette espèce fort rare avait été signalée antérieurement à Kinkempoix, près Liège, puis dans la forêt d'Hertogenwald.

M. le Dr Jacobs demande la parole et fait la communication suivante :

ANOMALIE CHEZ UN SYRPHUS RIBESII ♀.

Cette anomalie consiste en ce que, des quatre bandes jaunes de l'abdomen, la seconde n'est apparente que dans sa moitié externe gauche, sous forme de triangle, avec la base touchant au bord de l'abdomen et avec le sommet légèrement incurvé dirigé vers la

ligne médiane, en prenant le tiers de l'arceau. Le second arceau dorsal qui porte cette tache n'est visible qu'à gauche et paraît atrophié à droite; l'arceau ventral est complet et normal. La troisième bande jaune est irrégulière à son bord supérieur et la lunule jaune du second segment est un peu plus large et placée sur un plan un peu plus bas.



M. Jacobs continue par la communication suivante :

L'excursion de Virginal par Ronquières et Henripont, sur la forêt de la Houssière, près de Braine-le-Comte, le 15 juin, n'a pas été fructueuse, à cause d'un vent de nord-ouest très âpre et d'un ciel couvert pendant la plus grande partie de la journée. M. Lameere et moi y étions seuls.

Comme captures, je n'ai à signaler qu'un Diptère indiqué comme rare par Macquart, mais plus commun en Autriche, le *Doros conopseus*, et la variété *nigricans* ♂ (Schmiedeknecht) du *Bombus hortorum*. Ces captures sont mises sous vos yeux.

Les insectes de la famille des Xorides étant rares dans toute l'Europe, je crois utile de faire connaître que le dimanche 29 juin, j'ai capturé à Beersel le *Xylonomus irrigator* ♀ Fabr., voltigeant autour d'un charme rabougri, percé de nombreuses galeries de coléoptères. Je n'ai pu découvrir l'insecte que mon hyménoptère recherchait. D'après les auteurs, il dépose ses œufs dans la larve du *Rhagium indagator*, que nous n'avons pas en Belgique. Taschenberg l'a recueilli de la chrysalide de la *Liparis monacha*.

M. Lameere ajoute qu'il a pris à Ronquières deux exemplaires de la *Leptura nigra*.

M. de Selys-Longchamps a passé quelques jours du mois de juin avec sa famille à Kreuznach. Il y a constaté l'abondance de la *Syntomis phegea* et du *Syrictus Carthami*, seule espèce d'Hespéride qu'il y ait observée.

M. H. Donckier de Donceel fait signaler les captures suivantes :

Obrium cantharinum a été pris le 29 juin à Ixelles par M. S. Putzeys, et le 24 juin, M. Vandervelde avait pris à Watermael l'*Obrium brunneum*.

M. Devaux a rapporté de Blankenberghe la *Nacerdes melanura*, ce qui a permis incidemment à M. Donckier de s'apercevoir que, dans la collection Wesmael, se trouve la *Nacerdes dispar* Dufour, prise aux environs de Liège, mais qui a toujours été omise dans les listes de Belgique.

M. de Borre signale une monstruosité chez un *Carabus auratus* pris à Etterbeek par M. Demoor. L'antenne droite, d'ailleurs parfaitement normale en forme, longueur et proportions des articles, donne naissance sur son deuxième article, à peu près aux quatre cinquièmes de la longueur, à une antenne surnuméraire de sept articles assez courts, et dont les derniers sont aplatis et un peu élargis.

L'ordre du jour appelle l'examen de l'opportunité de la participation de la Société à l'Exposition universelle de 1885 à Anvers.

Après avoir entendu plusieurs membres, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu pour la Société d'intervenir dans cette Exposition et que ses membres peuvent y exposer individuellement s'ils croient utile de mettre des collections de leurs insectes sous les yeux du public.

Sur la proposition de M. de Borre, la Société choisit les localités entre Clabecq et Braine-le-Château pour l'excursion du 10 août. On partira de Bruxelles (Midi) pour Tubise par le train de 7 h. 50 m. du matin.

La séance est levée à 9 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 48.

Assemblée mensuelle du 2 août 1884.

PRÉSIDENTE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Arnold, Bergé, Capronnier, De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, J. Devaux, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lameere, L'Arbalestrier, Vanden Branden, Vandervelde, Van Nerom, Van Rossen, Van Segvelt, Weinmann et H. Donckier de Donceel, faisant fonctions de secrétaire.

M. Preudhomme de Borre, indisposé, a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 juillet est approuvé.

M. Lameere demande la parole pour annoncer la mort de deux naturalistes qui ont beaucoup contribué au développement de l'entomologie. L'un, J.-C. Schiödte, décédé au commencement du mois de juin, à Copenhague, est bien connu par ses admirables travaux sur les larves des coléoptères; l'autre était le doyen des entomologistes actuellement vivants : contemporain de Schönherr, Fähræus, mort quelques jours avant Schiödte, à l'âge de 88 ans, continua l'œuvre de Boheman et nous a laissé une remarquable faune des coléoptères de l'Afrique australe.

Correspondance.

M. B.-A. de Vaux remercie pour sa nomination de membre effectif.

M. Horn envoie un exemplaire grand format et relié, tirage spécialement destiné aux sociétés entomologiques, de son dernier

ouvrage, en collaboration avec feu le Dr Leconte : *Classification of North American Coleoptera*. Il lui sera envoyé une lettre de remerciements.

M. Van Rossen, qui a recueilli l'année passée à Malaise, en nombre, la *Cicindela germanica*, en envoie quatre exemplaires pour être intercalés dans les collections de la Société, et écrit que l'endroit où cette espèce se trouvait abondamment, ayant été défriché, elle semble en avoir disparu.

Les éditeurs du journal américain *Science*, la Société Linnéenne de la Nouvelle-Galles du Sud et la Société *für vaterlandische Naturkunde in Württemberg* accusent réception de nos publications.

La Smithsonian Institution et la Société d'Histoire naturelle de Dorpat nous annoncent des envois d'ouvrages.

M. le Dr P. Durdik, de Prague, ancien officier de santé de l'armée des Indes néerlandaises, adresse une circulaire pour protester contre la publication par M. N.-M. Kheil, dans une Faune des Rhopalocères de l'île Nias, de ses découvertes et d'observations dont il revendique la propriété.

M. Reitter envoie un catalogue de coléoptères à vendre, et M. R. Drosten (boulevard du Hainaut, 149A, à Bruxelles) un catalogue d'instruments de microscopie.

Rapports, lectures, communications.

M. Lameere présente trois mémoires : 1° *Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et à La Plata*; 2° *Matériaux pour la faune des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves à Antigua*; et 3° *Longicornes des voyages du Dr E. Fromont au Brésil et à La Plata*. Sont désignés comme rapporteurs : MM. Candèze et Preudhomme de Borre.

M. de Borre envoie le travail suivant :

NOTE SUR LES JULIDES DE LA BELGIQUE.

La note que j'ai publiée cet hiver (Compte-rendu de la séance du 5 janvier 1884) sur les Glomérides de notre pays, me semble avoir établi qu'il était à propos d'inventorier à nouveau ce que nous possédons de données sur les Myriapodes belges.

La mise en ordre des Myriapodes du Musée Royal continuait à m'en fournir l'occasion. Rassemblés sans étude préalable, sans choix, comme supplément accessoire à des récoltes d'insectes, et enfin sur un bien petit nombre de points de notre territoire, ils n'en ont pas moins apporté des additions notables au premier essai

d'inventaire de nos Myriapodes, publié, il y a une douzaine d'années, par notre savant confrère, M. le professeur Plateau (1).

Les Julides sont un groupe d'une étude beaucoup plus ardue que les Glomérides et, n'ayant pas le temps de m'y préparer par un travail personnel de quelques années, je reconnus immédiatement que l'intérêt de la bonne détermination de nos collections publiques exigeait qu'elles fussent à peu près intégralement soumises à un savant spécialiste, que je rencontrai dans la personne de M. le Dr Robert Latzel, de Vienne, auteur d'un récent travail de premier ordre sur les Myriapodes de l'Autriche-Hongrie (2).

Adoptant ici l'ordre de ce travail, je vais passer rapidement en revue les espèces qu'il a reconnues dans la collection de matériaux belges que je lui avais soumis. Je ferai remarquer que la détermination d'un Julide n'est généralement pas une chose facile et que, dans la caractéristique, l'anatomie et l'inspection micrographique de certains organes jouent le plus grand rôle; nul de nous ne deviendra spécialiste dans les Myriapodes s'il n'est anatomiste et ne cultive le microscope.

Renvoyant donc aux publications du savant qui m'a aidé, pour la partie morphologique et descriptive, je me bornerai à énumérer les espèces et à donner quelques renseignements sur leur distribution géographique chez nous, au moins telle que le petit nombre de matériaux recueillis permet de la connaître.

Ceux-ci comprennent des espèces de deux genres :

I. — GENRE *BLANIULUS* Gervais.

J'ai à mentionner pour la Belgique deux espèces de ce genre de petits Julides : le *Blaniulus venustus* Meinert et le *Blaniulus guttulatus* Bosc (*Julus fragariarum* Lamarck).

1. Le **Blaniulus venustus** Meinert n'a pas été cité comme belge dans le travail de M. Plateau. Deux exemplaires ont été pris à Calmpthout par feu Cam. Van Volxem, et j'en ai également sous les yeux deux exemplaires rapportés des environs d'Utrecht, dans les Pays-Bas, par M. A. Foettinger. C'est, suivant M. Latzel et les auteurs antérieurs, une espèce qui se trouve dans les vieilles souches, sous les feuilles en décomposition, etc.

C. Koch l'a deux fois figurée : sous le nom de *Julus pulchellus*, dans *Deutsch. Crust., Myr., Arachn.*, II. 22, tab. 13, et sous

(1) *Matériaux pour la Faune belge*. II^e note, *Myriapodes* (Bull. de l'Acad. de Belg., sér. 2, XXXIII).

(2) *Die Myriopoden der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie*. I et II, Vienne, 1880 et 1884.

celui de *Blaniulus guttulatus*, dans *Die Myriap. getreu abgeb. und beschr.*, II, f. 211^a (nec 211^b).

2. Ce n'est que depuis quelques jours que j'ai ajouté à la collection du Musée Royal des exemplaires du **Blaniulus guttulatus** Bosc, pris à Watermael. C'est un fait connu que souvent la place des espèces les plus vulgaires reste le plus longtemps vide dans les collections. Celle-ci est probablement répandue dans tout notre pays, et tous les amateurs de fraises la connaissent pour l'avoir trop souvent rencontrée vivant en petites familles dans l'intérieur de ces fruits. M. Plateau l'avait déjà citée parmi les Myriapodes indigènes.

On la distingue immédiatement de la précédente à l'absence complète d'yeux.

II. — GENRE JULUS Linné.

La collection du Musée Royal renferme actuellement dix espèces belges de ce genre.

1. *Julus punctatus* Leach.

On ne trouvera pas la description de cette espèce dans l'ouvrage de M. Latzel, attendu qu'elle n'a pas été observée dans les pays de la monarchie austro-hongroise. Une bonne description (en langue suédoise) se trouve dans un travail de Stuxberg sur les Myriapodes de la Scandinavie (*Oefvers. af K. Sv. Vet. Akad. Förhandl.* : Stockholm, 1870, p. 900). Leach (*Trans. Linn. Soc. Lond.*, XI, 379) et Gervais (Walckenaer et Gervais, *II. nat. des Ins. Apt.*, IV, 141) en ont donné de courtes diagnoses en latin et français, insuffisantes dans l'état actuel de la science; enfin, elle a été deux fois figurée par C. Koch (*Deutschl. Crust., Myr.*, etc., H. 22, t. 12, et *Die Myriap.*, II, f. 210 (*Allajulus punctatus*)).

C'est une espèce qu'on se procurera principalement par le criblage ou l'exploration des mousses recueillies en hiver. Telle a été l'origine de presque tous les exemplaires des collections du Musée Royal :

BRABANT : Groenendael, Etterbeek, Rhode-Saint-Genèse.

HAINAUT : Soignies (M. le professeur Henry).

LIÈGE : Esneux et Sprimont (M. Maréchal).

NAMUR : Rhisnes.

M. Plateau avait indiqué, mais dubitativement, cette espèce comme belge (¹).

(¹) M. Plateau a bien voulu me communiquer les exemplaires qu'il avait étudiés pour son travail. Ceux qu'il croyait pouvoir être le *J. punctatus* m'ont paru se rapporter plutôt au *J. fallax* Meinert.

2. *Julus pusillus* Leach.

Cette toute petite espèce a été assez généralement confondue avec le *J. boleti*, et on en trouvera la description dans l'ouvrage du Dr Latzel (II, 281); elle est aussi figurée, sous le nom de *J. Sturbergi*, dans un bel ouvrage iconographique italien en voie de publication (Berlese, *Acarî, Myriapoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta*, Fascic. VIII, n° 10, f. 1-6).

M. Plateau citait la capture de deux exemplaires dans les ruines de l'église de Damme, près Bruges. Au mois de mai 1877, M. H. Donckier de Donceel en a pris un exemplaire à Forest, et il s'en est trouvé quatre dans des récoltes faites en hiver à Thulin, près Quiévrain, par M. A. Duvivier. Si quelques amateurs s'adonnaient à la recherche des petits Myriapodes chez nous, il est très probable qu'elle serait signalée de nombreuses localités.

3. *Julus londinensis* Leach.

Cette espèce qui, d'après le nombre des exemplaires recueillis (117), doit être fort commune chez nous, est dans le même cas que le *Julus punctatus*, c'est-à-dire que son habitat dans l'Europe occidentale, quoique s'étendant à l'Allemagne (M. De Pauw nous l'a rapportée de Stuttgart et je l'ai prise moi-même à Koesen sur la Saale) et à la Suisse, d'où elle m'a été envoyée en quantité de Genève, n'atteint pas l'Autro-Hongrie. Elle ne figure donc pas dans l'ouvrage du Dr Latzel, et, pour en avoir une bonne description (en suédois), il faudra encore avoir recours à Stuxberg (*op. cit.*, 893) et aux figures de C. Koch (*Deutschl. Crust., Myr., etc.*, H. 22, tab. 4). C'est une espèce à dernier segment terminé en pointe très obtuse ne faisant pas saillie au delà de l'anús; elle n'est pas difficile à distinguer empiriquement une fois qu'on a sous les yeux des types bien déterminés de l'espèce et des voisines.

Voici, comme appoint à la figuration de sa distribution chez nous, l'énumération des localités d'où proviennent les exemplaires étudiés :

BRABANT : La Cambre, Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Laeken, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Forest, Uccle, Anderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Dieghem, Haeren, Saventhem, Melsbroeck, Boitsfort, Groenendael, Leeuw-Saint-Pierre.

FLANDRE OCCIDENTALE : Thourout, Poperinghe.

FLANDRE ORIENTALE : Aeltre, Assenede, Rupelmonde, Tête-de-Flandre, Ninove, Grammont.

HAINAUT : Lessines, Everbecq. (Je l'ai prise aussi dans le département du Nord, à Hautmont, un peu au delà de la frontière.)

LIÈGE : Hologne-aux-Pierres, Flémalle-Haute, Aywaille.

LIMBOURG : Lanaeken.

NAMUR : Namèche, Rochefort, Dinant, Maurenne, Bauche, Annevoie, Mariembourg, Louette-Saint-Pierre.

Si nous ne la citons pas ici des provinces d'Anvers et de Luxembourg, ce ne doit être que par pénurie de matériaux pour ces deux provinces, où elle existe assurément. C'est une espèce des plus communes, ainsi que l'avait déjà constaté M. Plateau.

4. *Julus luridus* C. Koch.

La description de cette espèce a été donnée par M. Latzel, et elle est représentée par C. Koch (*Die Myriap.*, II, f. 187).

Cette espèce, ayant une taille égale et parfois supérieure à la précédente, est généralement jaunâtre et très luisante. Elle n'est guère aussi commune et je n'en ai sous les yeux que des exemplaires du Brabant, au nombre de six, dont deux jeunes ont été jadis pris dans la forêt de Héverlé, près Louvain, en tamisant des fourmilières avec notre regretté collègue Tennstedt. Les autres localités sont : Groenendael, Melsbroeck et Genappe.

La variété *silvarum* Meinert est plus grêle et de plus petite taille (¹). M. le Dr Latzel y a rapporté trois exemplaires pris par M. H. Donckier, à Leeuw-Saint-Pierre, et M. Plateau disait en avoir pris autrefois deux exemplaires près de Gand ; mais était-ce bien cette même forme, car M. Plateau les plaçait parmi les espèces à pointe marquée au bout du dernier segment ?

5. *Julus transversosulcatus* Am Stein.

Cette espèce manque encore à la faune de l'Autriche-Hongrie. Ayant été créée en 1857 (*Jahresb. d. Naturf. Gesellsch. Graubündens*, Neue Folge, II, 136) sur des exemplaires pris en abondance dans le Valais, bien près de la frontière du Tyrol et de la Suisse, il me paraît difficile pourtant qu'elle ne s'y rencontre pas. Mais, M. le Dr Latzel ne l'ayant pas décrite, il faudra avoir recours à la description du Dr Am Stein. Empiriquement et quand on en a eu de bons types sous les yeux, la différence très marquée de la sculpture des moitiés antérieure et postérieure de chaque anneau dorsal est assez caractéristique.

Elle n'est pas rare en Belgique (²).

BRABANT : Ixelles, Laeken, Josaphat (Schaerbeek), Auderghem, Rouge-Cloître, Tervueren, Leeuw-Saint-Pierre, Genappe.

(¹) D'après une lettre que je reçois à l'instant de M. le Dr Latzel, cette forme mériterait le nom d'espèce. Le *Julus silvarum* Meinert doit donc figurer au nombre de nos Jules indigènes.

(²) C'est à cette espèce que se rapporte la seconde forme restée douteuse pour M. Plateau (*op. cit.*, 18) et qu'il rapprochait avec raison des *J. londonensis* et *luscus*.

FLANDRE OCCIDENTALE : Ypres.

HAINAUT : Lessines.

LIÈGE : Aywaille.

LUXEMBOURG : Poix.

NAMUR : Rhisnes, Namèche, Samson, Bauche, Warnant, Hastière.

6. **Julus belgicus** Latzel nov. sp.

M. Latzel a reconnu parmi les Jules que je lui avais communiqués, une espèce nouvelle pour la science, voisine des *J. unilineatus* et *albolineatus*; il a bien voulu m'en remettre une description qui permettra de la publier en appendice à mon travail.

Elle est fondée sur quatre petits exemplaires pris en Brabant. Deux ont été recueillis le 18 octobre 1878, à Leeuw-St-Pierre, par M. H. Donckier, qui pense les avoir trouvés en écorçant. Les deux autres ont été pris à Genappe, le 5 octobre 1883, par M. A. Duvier.

7. **Julus fallax** Meinert.

On trouvera dans l'ouvrage de M. Latzel (II, 316) une bonne description de cette espèce et de ses nombreuses variétés (1).

Nous n'en avons que très peu d'exemplaires belges et d'âge jeune pour la plupart :

BRABANT : Laeken, Groenendael.

HAINAUT : Fleurus (M. Bivort).

NAMUR : Rhisnes.

8. **Julus scandinavus** Latzel.

C'est le nom sous lequel M. Latzel redécrit l'espèce que, suivant lui, MM. Meinert, Stuxberg et Porath, dans leurs travaux sur les Myriapodes de Danemark et de Scandinavie, ont prise pour le *Julus terrestris* de Linné.

Huit exemplaires belges figurent dans notre collection :

BRABANT : Environs de Bruxelles.

HAINAUT : Forêt de la Houssière (moi), Soignies (M. Henry).

NAMUR : Anseremme (M. Engels).

9. **Julus sabulosus** Linné.

M. Latzel a décrit cette espèce (II, 327), extrêmement commune

(1) M. Latzel place avec doute parmi les synonymes du *J. fallax*, le *J. albipes* Koch, que M. Plateau (*op. cit.*, p. 47) met au nombre des espèces belges. Ayant examiné les deux exemplaires pris par notre savant collègue, j'y ai reconnu une espèce bien différente de tout ce que le Musée possédait et qui est probablement bien le *J. albipes* Koch. J'ai cependant peine à croire qu'elle puisse, dans ce cas, n'être que synonyme du *J. fallax*.

et qui a aussi porté dans les auteurs le nom de *bilineatus*, à cause de la double ligne dorsale, composée de taches jaunes, ferrugineuses ou orangées, qui suffit à la faire reconnaître et distinguer à première vue de toutes nos autres espèces. Elle était déjà citée par M. Plateau comme commune chez nous et je puis l'indiquer des localités suivantes :

ANVERS : Hérenthals, Calmpthout.

BRABANT : Auderghem.

LUXEMBOURG : Stockem près Arlon.

NAMUR : Bauche, Walzin.

Sa vulgarité l'avait fait trop souvent laisser de côté *à priori*, sans quoi cette liste serait bien plus longue; ici s'applique encore la remarque que je faisais à propos du *Blaniulus guttulatus*.

10. *Julus mediterraneus* Latzel.

Ce n'est pas là une espèce bien rare, ni chez nous, ni dans d'autres contrées, et cependant c'est l'année dernière qu'elle a été pour la première fois rigoureusement distinguée et publiée par M. le Dr Latzel (*Bull. de la Soc. des Amis des Sciences natur. de Rouen*, 1883, 2^e semestre, 270) (1). Elle lui était d'abord connue uniquement par des exemplaires méridionaux; de là le nom; mais depuis il en est venu à sa connaissance des exemplaires du centre et du nord de la France et enfin ceux de Belgique, où elle est abondante assurément, car j'en ai sous les yeux 99 individus. Cette espèce était jusque-là pour moi le *J. terrestris* L.; sans doute, M. Plateau la croyait aussi telle et bien d'autres auteurs avant lui. Dans le fait, le *J. terrestris*, depuis Linné jusqu'à ces derniers temps, a été un magasin assez confus d'espèces confondues ou mal connues que les travaux contemporains arrivent aujourd'hui seulement à discerner.

Si nombreux qu'aient été les individus recueillis du *J. mediterraneus*, il semblerait que l'espèce soit ici assez localisée, car, à part un exemplaire pris à Rhisnes, près de Namur, tous les autres (au nombre de 98) sont des environs de Bruxelles (La Cambre, Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Laeken, Auderghem, Rouge-Cloître, Boitsfort, Watermael, Uccle, Forest, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Melsbroeck, Saventhem, Bergh, Waterloo).

Je compte ultérieurement dire quelques mots de nos autres Chilognathes; cependant, dès aujourd'hui, je puis annoncer, d'après les déterminations de M. Latzel, que la famille des CHORDEUMIDES,

(1) La priorité est peut-être pour la description dans *Myriap. d. Oest.-Ung. Mon.*, II, 337.

dont M. Plateau n'avait connu aucun exemplaire belge, compte au moins trois espèces indigènes : *Chordeuma silvestre* C. Koch, *Ch. gallicum* Latzel et *Craspedosoma Rawlini* Leach.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE JULUS,

par M. le Dr Robert Latzel.


JULUS BELGICUS n. sp.

Julus unilineatus et *albolineatus* subsimilis. Gracilis et tenuis, subglaber et nitidus, piceus vel piceo-niger, linea dorsali ferruginea vel ochracea ornatus, antennis fuscis, pedibus cum ventre et lateribus pallidis, interdum omnino fere pallescens. Vertex sulco tenuissimo, foveis setigeris duabus, inter se approximatis. Antennae latitudine corporis multo longiores. Oculi manifesti, triangulares, seriebus ocellorum septenis vel octonis, ocellis utrinque 36. Segmenta corporis 46-50. Segmentum primum lateribus haud striatis, angulis rotundatis. Segmenta cetera paullatim densius, omnia vero subtiliter striata, parte anteriore segmentorum laevigata, margine postice, praesertim in segmentis posterioribus ciliato. Foramina repugnatoria parva, sat procul pone suturam emarginatam vel subrectam sita eamque haud tangentia. Segmentum ultimum sublæve, pilis brevibus parce vestitum, in spinam longam, sectam et acutam productum, valvulis analibus vix marginatis, squama simplici. Pedum paria 78-89; pedes breves et subtiles.

Mas : Stipites mandibulares repressi et processu carentes. Pedes primi paris minimi, uncinati. Pedum ceterorum articuli duo penultimi pulvillis singulis, minimis instructi. Margines ventrales segmenti septimi parum prominentes, rotundati. Pedes copulativi obtecti, parvuli, inter se valde approximati; laminæ anteriores breves et obtusæ; laminæ posteriores prioribus multo longiores, tri- vel quadri-apicatæ, apice primo vel interno multifido aut ramoso. Flagellum copulativum manifestum.

Longit. corp., 17-22 mill., lat., 1-1.5 mill.

M. Lameere lit une traduction qu'il a faite de la note sur l'*Hy-*



Grossissement $\frac{60}{1}$.

Moitié droite de l'organe copulateur mâle du *Julus belgicus* n. sp.

- A. Lamelle antérieure.
- B. Lamelle postérieure.
- C. Lamelle médiane.
- F. Flagellum.
- m. Muscles.

pocephalus armatus que M. Sharp nous avait envoyée au commencement de cette année :

NOTICE SUR L'HYPOTEPHALUS ARMATUS

par **D. Sharp**

(TRADUITE PAR A. LAMEERE).

Cet insecte extraordinaire a depuis longtemps attiré l'attention du petit nombre des naturalistes qui ont eu la bonne fortune de le voir : il a été jusqu'ici très rare dans les collections, et il n'est, par conséquent, pas aussi bien connu qu'il le sera bientôt, je l'espère, maintenant que l'on a une connaissance exacte de son habitat. Il y a quelques mois, j'en recevais de M. Antonio de Lacerda, de Bahia, un exemplaire qui excita tellement en moi le désir d'en acquérir une plus ample connaissance, que j'écrivis à M. de Lacerda pour lui demander s'il ne pouvait pas m'en fournir un exemplaire mutilé destiné à la dissection. Il me répondit de la manière la plus obligeante, m'envoyant ce que j'avais sollicité, et cette amabilité m'a permis de faire les observations qui vont suivre.

Dans la position où les exemplaires se trouvent après la mort, et dans laquelle ils sont représentés par les figures qui en ont été publiées, la tête est extrêmement infléchie, de sorte que ses parties antérieures sont placées sous le thorax et que l'extrémité des mandibules est dirigée sous l'insecte vers la partie postérieure du corps. Dans cette position, les singuliers angles postérieurs du vertex reposent sur le bord antérieur du pronotum exactement contre les angles de devant de celui-ci, et la tête a une rigidité et une immobilité particulière, étant absolument dépourvue de tout mouvement de rotation ou de nutation. Cette position n'est pourtant pas celle qu'offre l'insecte lorsqu'il vit et qu'il n'est point au repos, mais en réalité un état de contractilité tel qu'en prennent beaucoup d'insectes lorsqu'ils désirent se protéger durant la vie par l'immobilité, et qu'ils prennent ordinairement à la mort. La tête de cet insecte possède, en effet, une motilité extrême, ce que l'on pourra vérifier sur un exemplaire tout à fait ramolli ; la résistance des muscles puissants qui amènent et maintiennent la contraction pendant la vie, étant alors surmontée, la tête se relève jusqu'à occuper une position parfaitement horizontale, et la partie postérieure du vertex rentre dans le thorax jusqu'à sa dépression concave caractéristique ; la paroi antérieure de cette dépression vient alors s'appliquer exactement contre le bord antérieur du thorax auquel elle s'adapte parfaitement ; la tête peut donc se mouvoir de bas en haut suivant un arc qui vaut presque la moitié d'une circonférence de

cercle. La tête étant donc replacée dans sa position naturelle, une particularité des plus extraordinaires se découvre par l'examen de la face inférieure, où existe à la base de la tête et en avant du prosternum un grand espace membraneux, limité postérieurement par le bord antérieur échancré tout particulier du prosternum; il faut encore remarquer que cette échancrure est hérissée de poils très denses au milieu (partie la plus reculée) de l'entaille, et que la région postérieure de la membrane est également velue.

Le prothorax est aussi doué d'une grande mobilité à sa jonction avec le tronc, et lorsqu'il est complètement étendu, il couvre l'espace déclive visible, chez les individus desséchés, à la base des élytres, ne laissant que la pointe de l'écusson à découvert.

Lorsque l'insecte est placé dans la position que je viens de décrire, la surface du thorax est dans le même plan que celle des élytres, et la tête est légèrement plus élevée; les mandibules se dressent en avant et ne sont que faiblement inclinées vers le bas, tandis que les grands et puissants crocs jugulaires sont dirigés verticalement vers le bas. Dans cette position, l'apparente faiblesse et le facies désavantageux qu'on observe ordinairement chez l'*Hypocephalus* ont entièrement disparu et sont remplacés par une attitude belliqueuse qui pourrait difficilement être surpassée.

L'individu que j'ai disséqué avait sans doute été recueilli après sa mort; il n'était pas âgé, c'est-à-dire que la sculpture et les angles des pattes n'étaient ni usés ni éraillés; l'extrémité des mandibules et des crocs jugulaires était cependant quelque peu usée, et il existait sur l'un des côtés de l'espace membraneux céphalothoracique une grande blessure qui avait été évidemment produite pendant la vie, car la blessure avait fait couler dans la membrane et le tissu musculaire qui l'entourait, la substance noire granuleuse que beaucoup d'entomologistes auront dû remarquer comme se rencontrant autour des blessures faites aux insectes, et qui est sans doute semblable aux exsudations de sérum et de sang qui surgissent des blessures des animaux vertébrés.

La puissance musculaire de l'*Hypocephalus armatus* est évidemment prodigieuse: l'énorme thorax de cet individu était occupé par des muscles d'une taille considérable, la paire des muscles fléchisseurs de la tête étant particulièrement énorme.

La dissection de cet individu m'a convaincu que les particularités de ce merveilleux insecte, telles qu'elles nous apparaissent chez le mâle, sont une adaptation directe des mâles à des combats singuliers exterminatoires, et d'un caractère tout particulier, le point à défendre dans la lutte étant le grand espace membraneux céphalothoracique que j'ai décrit plus haut.

C'est, en effet, la seule partie vulnérable du corps chez le mâle,

et l'on conçoit qu'elle est complètement protégée lorsque la tête est tout à fait infléchie. Je suppose que, lorsque deux de ces mâles combattent, ils s'efforcent l'un et l'autre de saisir et de renverser sur le dos leur adversaire; l'un d'eux vient-il à être renversé, il cherchera à fléchir et à contracter la tête, et s'il peut arriver à le faire et à maintenir cet état de contractilité au moyen des énormes muscles qu'il possède, il est probable que tous les efforts de son adversaire pour achever sa victoire en blessant à mort l'individu retourné, seront infructueux. Mais, d'autre part, l'individu victorieux cherchera évidemment à empêcher son adversaire, plus faible, de contracter la tête, et s'il peut y arriver, ou s'il peut écarter la tête de sa position, il sera capable d'infliger à son ennemi de mortelles blessures en enfonçant ses mandibules ou ses crocs jugulaires dans le grand espace céphalothoracique à découvert et offrant peu de résistance. Je suppose que l'individu que m'a envoyé M. de Lacerda pour la dissection avait été tué de cette manière, ou plutôt qu'il était mort quelque temps après avoir reçu la blessure dont j'ai parlé.

Qu'il me soit permis de rapporter ici quelques observations que j'ai encore faites en disséquant l'insecte, et de dire quelques mots sur la position qu'il devrait occuper dans la classification.

La languette est formée de deux faibles tiges allongées et pubescentes, convergeant en arrière de manière de former un V; elle rappelle ce qui existe dans le genre *Dorysthenes*, mais elle est plus allongée.

Les stigmates du prothorax sont transverses, d'assez grande taille, semblables, quant à leur position et presque en tout à ceux des *Dorysthenes*.

Les élytres sont complètement soudées et sont si exactement adaptées à la base du mésonotum et à l'écusson, qu'il est difficile de les détacher. Il n'y a point de traces d'ailes.

Le métasternum est réduit à une membrane homogène très délicate, sans différenciation ou divisions, semblable, quant à la grandeur et pour le reste, aux segments abdominaux dorsaux. Ceux-ci sont au nombre de sept; ils ne sont représentés que par de délicates membranes, à l'exception du dernier, qui est d'une consistance à moitié cornée et à moitié membraneuse.

Les stigmates sont petits et sont placés à la marge externe de la partie dorsale du tronc; la paire qui se trouve sur le métathorax est à peine plus grande que les autres.

Les arceaux ventraux sont très durs, mais ils sont doués d'une grande mobilité, et chacun d'eux porte une membrane d'une taille considérable, ce qui permet au tronc de s'allonger beaucoup. Les arceaux du ventre sont au nombre de cinq. Il existe encore un

segment apical interne petit et supplémentaire qui peut saillir à l'extérieur. Le pygidium est allongé et simple, en forme de tube, caractère qu'il présente ordinairement chez les *Prionidae*.

Il faut également noter que l'individu disséqué n'avait, lorsqu'il arriva chez moi, qu'une seule antenne, laquelle, de plus, était venue à se détacher pendant le voyage du Brésil en Écosse, mais que je trouvai dans la boîte d'envoi; elle est très remarquable en ce qu'une antenne supplémentaire s'en sépare à partir du troisième article; cette curieuse anomalie s'articule sur le troisième article — qui est considérablement élargi — par un véritable moignon, et quoique cet organe surnaturel ne présente actuellement qu'un seul article, il a dû évidemment en posséder plusieurs autres.

En comparant l'organisation de l'*Hypocephalus* avec un Longicorne tel que le *Dorysthenes rostratus* ou le *D. montanus*, l'on ne peut qu'être frappé par la ressemblance générale de leur organisation, ressemblance qui est en fait si grande, qu'il est certain que l'*Hypocephalus* doit être placé à côté du genre *Dorysthenes*, et la seule question qui puisse subsister est de savoir si l'insecte est suffisamment différencié pour être considéré comme une famille distincte alliée aux Longicornes par l'intermédiaire des *Dorysthenes*, ou simplement comme un membre anormal de la famille des *Cerambycidae*. La dernière manière de voir me semble certainement correcte.

Les principales particularités de l'*Hypocephalus* sont: 1° les antennes; 2° le singulier espace céphalothoracique; 3° les énormes membres postérieurs; 4° les tarses pentamères.

Pour ce qui concerne: 1° Les antennes, il est à remarquer qu'il existe chez les Longicornes une extrême variabilité de ces organes, et la structure des antennes d'un Prionide tel que le *Polyarthron barbarum* est bien plus différente de celle des *Prionidae* normaux, que ne l'est la structure simple de l'antenne de l'*Hypocephalus*, de la structure également très simple du même organe chez le *Dorysthenes montanus* ♀.

2° L'espace céphalothoracique n'est évidemment qu'un développement particulier et une extension de la membrane qui relie généralement la tête au thorax chez les Coléoptères, et malgré le grand intérêt qu'il présente à cause de son rôle encore inconnu, il ne peut donner à son possesseur aucune prétention à être tout à fait isolé. Ce que peut être la fonction de cet espace, c'est sur quoi il serait inutile de spéculer. Il est probable que la membrane qui le recouvre est un organe de sensation en sa région postérieure, et il est bien possible qu'il révélera une origine sexuelle. Le bord antérieur du prosternum est tout entier épaissi et interrompu par un certain nombre d'excavations, la grande échancrure médiane

est très velue, et s'il était prouvé que cet espace a une sensibilité sexuelle, cela expliquerait comment il se fait que les mâles cherchent (comme je le suppose) à se blesser l'un l'autre à cette place.

3° Les pattes postérieures si remarquables sont insuffisantes pour justifier l'isolement de cet insecte comme famille distincte dans les Coléoptères. (Je me sers ici du langage ordinaire de la classification, afin de ne pas ajouter encore d'autres idées à cette discussion spéciale.) Sinon, nous devrions faire une famille des *Sagra*, des *Ateuchides* ou de bien d'autres Coléoptères. De plus, ce caractère n'est, dans la plupart des cas, que sexuel.

4° Les tarses pentamères. C'est là sans doute la plus grande singularité de l'*Hypocephalus* comme Longicorne; néanmoins, il faut observer que chez les Coléoptères tétramères de différents groupes il existe des formes aberrantes ayant les tarses pentamères. Tels sont *Dryophthorus* des *Curculionidae*, *Polyaptilus* des *Phytophaga*, *Parandra* et *Dorysthenes* des *Longicornes*. Et au point de vue de cette discussion, le dernier exemple semble être concluant. Il existe chez les *Dorysthenes* à l'extrémité du troisième article des tarses, non pas seulement un nodule basilaire à découvert, mais un véritable article, articulé, quoique réduit, s'interposant entre le troisième et le cinquième article, et ce n'est que par le plus grand développement de cet article que l'*Hypocephalus* diffère des *Dorysthenes* au point de vue de la structure des tarses.

Il me semble donc parfaitement clair que l'*Hypocephalus* devrait être classé comme une forme à part dans les *Prionidae*, en raison du grand développement des pattes postérieures chez le mâle, de ses antennes courtes et de ses tarses visiblement pentamères.

Je regrette de ne pouvoir faire aucune hypothèse sur la fonction de ces membres postérieurs si extraordinaires. Il est clair qu'ils ne servent point à la locomotion ordinaire et que, bien certainement, dans la marche ils ne sont que traînés sur le sol, la prolongation terminale particulière du tibia empêchant l'extrémité pubescente de toucher le sol, tandis que le tarse est ramené vers le haut et appliqué sur la partie supérieure du tibia dans le sillon particulier dont celui-ci est pourvu à cet effet, de sorte que le tarse est protégé et n'est point exposé à donner prise aux objets environnants. Que ces pattes participent à l'acte de la copulation, ou qu'elles assistent les mâles dans leurs combats, comme armes offensives, c'est ce qu'il m'est impossible de conjecturer.

Je crois que les mâles de cet insecte sont, pendant une courte saison, abondants dans la localité qu'ils habitent, mais que proba-

blement ils sont surtout nocturnes dans leurs habitudes; leur vie à l'état parfait est sans doute aussi très courte.

Si mes hypothèses au sujet de cet insecte sont correctes, ceux d'entre nous qui sont évolutionnistes auront à admettre que l'organisation de cet être extraordinaire est le résultat d'une évolution en corrélation avec ses combats sexuels, à travers une longue série d'âges, et qu'il en est ainsi résulté une perfection des plus extraordinaires des caractères directement et indirectement en rapport avec ce but. C'est là un fait si contraire à notre sentiment moral, que nous pouvons éprouver de la satisfaction en songeant qu'il est à supposer que ces caractères sont uniques et que, parmi les centaines et les milliers d'insectes que nous connaissons actuellement, il n'y a rien qui indique qu'un autre d'entre eux ait passé par une évolution semblable.

MM. Baudi et Tappes ayant fait l'étude de collections d'Œdémérides et de Cryptocéphalides contenant les récoltes de feu Camille Van Volxem, M. H. Donckier donne les listes suivantes :

ŒDÉMÉRIDES

RECUEILLIS EN PORTUGAL ET AU MAROC PAR FEU C. VAN VOLXEM

Déterminés par M. Fl. Baudi.

<i>Asclera dispar</i> Dufour. Pombal.	<i>Probosca metallescens</i> Fairm. Tanger.
— <i>xanthoderes</i> Muls. Santa Clara.	<i>Chitona connexa</i> Fabr. Tanger, Tavira,
<i>Oncomera femorata</i> Fabr. Tanger.	Portimao, Faro.
<i>Œdemera simplex</i> Lin. Santa Clara,	<i>Stenostoma cæruleum</i> Petagn. Tanger,
Cap St-Vincent, Sagres,	Villa Real.
Faro, Villa Real, Santa	<i>Mycterus curculionoides</i> Fabr. Bussaco.
Olalla, Portimao, Tanger,	— <i>pulverulentus</i> Küst. var. <i>scu-</i>
— <i>cærulea</i> Lin. Coimbra.	<i>tellaris</i> Baudi. Santa Clara,
— <i>barbara</i> Fabr. Tanger, Foya,	Portimao.
Monchique, Caldas de Mon-	
chique, Santa Clara.	

CRYPTOCÉPHALIDES

RECUEILLIS AU BRÉSIL ET A LA PLATA PAR FEU C. VAN VOLXEM

Déterminés par M. G. Tappes.

<i>Monachus ater</i> Haldem. Petropolis.	<i>Monachus</i> sp. Environs de Rio de Ja-
— <i>rubidulus</i> Suffr. Environs de	neiro.
Rio de Janeiro.	— <i>rubropustulatus</i> Stål. Santa
— <i>pustulipennis</i> Stål. Rio de	Cruz.
Janeiro.	<i>Scolochrus fulvicollis</i> Dej. <i>rubicundus</i> ?
	Suffr. Brésil.

CRYPTOCEPHALIDES RECUEILLIS EN PORTUGAL ET AU MAROC.

<i>Cryptocephalus rugicollis</i> Oliv. Coimbra,	<i>Cryptocephalus alboscutellaris</i> Suffr. v.
Leiria.	<i>nigridorsum</i> Chvr.
— <i>bæticus</i> Suffr. Tanger.	Tanger.
— voisin de <i>bæticus</i> Suffr.	— <i>pygmaeus</i> Fabr. S. Bar-
S. Bartholomeu de	tholomeu de Messines.
Messines.	— <i>blandulus</i> Har. (pul-
— <i>tristigma</i> Charp. Sagres,	<i>chellus</i> Suffr.) Tan-
Loulé, Alte, Caldas de	ger.
Monchique, S. Do-	— <i>rufipes</i> Goeze (<i>gracilis</i>
mingo, Cap St-Vin-	Fabr.) Monchique.
cent.	— voisin de <i>ochroleucus</i> .
— <i>primarius</i> Har. (<i>impe-</i>	Monchique.
<i>rialis</i> Fabr.) var. <i>pexi-</i>	— <i>querceti</i> Erichs.
<i>collis</i> Suffr. S. Bartho-	<i>Pachybrachys azureus</i> Suffr. var <i>ele-</i>
lomeu de Messines.	<i>gans</i> Graëlls. Bussaco.
— <i>molossus</i> Fairm. Tanger.	— <i>azureus</i> v. <i>regius</i> Schauf.
— <i>celtibericus</i> Suffr. Por-	Caldas de Monchique.
timao.	— <i>scriptus</i> Schauf. Carre-
— <i>parvulus</i> Mull. (<i>flavila-</i>	<i>gado</i> .
<i>bris</i> Fabr.) Mon-	— sp. Tanger.
chique.	— <i>fulvipes</i> Suffr. Castro
— <i>hirtifrons</i> Graëlls. Esco-	Verde, Santa Clara,
rial.	S. Domingo.
— <i>hirtifrons</i> , var. <i>gadita-</i>	— <i>fulvipes</i> var. Castro
<i>nus</i> . Villa Real, Por-	Verde, Santa Clara,
timao, Faro.	S. Domingo.
— var. Faro.	— sp. Foya.
— <i>Koyi</i> Suffr. Villa Real.	— sp. Caldas de Monchique.
— <i>crassus</i> Oliv. (<i>gravidus</i>	<i>Stylosomus tamaricis</i> Herr.-Sch. Faro.
Herr.-Sch.) Tanger.	

Comme annexe aux listes précédentes, M. Tappes envoie la description d'un Cryptocéphale nouveau d'Arabie :

CRYPTOCEPHALUS EGERICKXI G. Tappes.

Long., 0,006 mill.; larg., 0,0035 mill.

Patrie : El Hahaz (Millinger). Collect. Egerickx.

♀ Oblongus, subcylindricus, corpore nigro, pilis sericeis cooperto; antennis fulvis apice obscurioribus; capite, prothorace, elytrisque alutaceis; prothorace laevi, nitido, duabus maculis basalibus nigris utrinque ornato; elytris subnitidis regulariter et satis profunde striatis cum punctis duobus nigris diagonaliter ante declivitatem positis; pedibus nigris pubescentibus.

Oblong, en cylindre légèrement aplati sur le disque des élytres. Tête plate entièrement d'un brun de cuir pâle, couverte entièrement aussi de petits points serrés et un peu aciculés, à peine trace d'une petite ligne enfoncée sur le front et apparence de petits tubercules à la naissance des antennes; épistome triangulaire et un peu plus rugueux. Antennes longues et déliées atteignant un peu plus de la moitié de la longueur du corps, 1^{er} article assez gros, un peu pyriforme, 2^e globulaire, 3^e et 4^e trois ou quatre fois plus grands, presque d'égale épaisseur sur toute leur longueur, les autres allant en s'aplatissant et s'élargissant très peu, légèrement pubescents avec quelques poils très fins, d'un fauve rougeâtre foncé, un peu enfumées et noircies à l'extrémité, une petite marque noirâtre sur le dos de l'article basal. Corselet fortement globuleux, lisse, luisant, couvert d'une ponctuation très fine et très serrée qui en atténue un peu l'éclat; bord antérieur enserrant fortement le front et terminé par une petite baguette un peu plus claire que le corselet; la même baguette se reproduit le long des bords latéraux, qui sont globuleusement rabattus; la baguette en arc presque droit et bordée en dedans de points assez forts qui lui donnent de ce côté un aspect presque crénelé; bord postérieur largement échancré de chaque côté, lobe médian assez prononcé et coupé presque droit au-dessus de l'écusson, sur lequel il s'appuie; angle antérieur presque droit et fortement rabattu sur les côtés de la tête, angles postérieurs également presque rectangulaires, mais laissant apercevoir un petit soupçon de pointe. Couleur d'un brun de cuir un peu plus foncé que celui des élytres, avec deux grandes taches noires aplaties sur la base et s'allongeant ovalairement de chaque côté jusqu'à peu près au milieu du disque, dans le genre de ce qui se remarque chez beaucoup d'exemplaires du *Cr. rufipes* (*gracilis* olim); la couleur noire s'étend sur tout l'ourlet inférieur qui est visiblement crénelé. Écusson de même couleur que le corselet, mais un peu plus clair, lisse et luisant, presque en parallélogramme, cependant légèrement rétréci en arrière, coupé presque carrément au bord postérieur et rendu à peu près cordiforme en avant par une petite échancrure en pointe renversée de couleur noire, un peu relevé en arrière. Élytres en cylindre un peu aplati sur le disque, presque parallèles, allongées, deux fois et demie environ plus longues que le corselet et de la même largeur que ce dernier à sa base, assez fortement rabattues sur la voussure et légèrement déhiscentes, ce qui ne doit



pas exister chez le ♂; bosses humérales un peu en forme de virgules, très proéminentes, lisses et luisantes, bien délimitées à l'intérieur par une impression longitudinale assez profonde, lobes latéraux profondément rabattus, fortement accusés et étranglant un peu les élytres par leur extrémité, qui se termine en pointe rentrante et faisant, en avant, fortement ressortir les épaules; stries fermées par de gros points très rapprochés et un peu tirés en largeur, ce qui donne un aspect plus mat à l'ensemble; très régulières, les intérieures un peu courbées par la large gibbosité qui se remarque en arrière de l'écusson, atténuées et presque effacées par des points entremêlés, mais seulement à l'extrémité; intervalles presque en côtes aplaties. Couleur comme celle du corselet, mais beaucoup moins brillante et un peu plus claire. Deux petites taches noires placées en diagonale un peu en avant de la voussure. Pygidium noir couvert de gros points enfoncés, ce qui lui donne un aspect varioleux; terminé en ovale dont la pointe est visiblement tronquée et légèrement échancrée; cette pointe est formée d'une espèce de plaque lisse de la couleur des élytres et s'étend en s'amointrissant de chaque côté. Dessous noir et couvert de gros points un peu espacés et d'une pubescence soyeuse et blanchâtre, surtout sur les côtés. Prosternum, mésosternum, extrémité postérieure du métasternum et hanches d'un jaune rougeâtre; prosternum fortement tricaréné, la carène du milieu plus forte et plus saillante. Pattes de taille ordinaire, noires, pubescentes en dessus.

♀ Dernier segment abdominal très grand, avec une large fossette peu profonde, à bords peu accusés. ♂ inconnu.

Cet insecte peut se placer auprès de notre *Cr. bimaculatus* pour sa forme et rappelle, par les taches de ses élytres, notre *C. tristigma*.

Je ne suis pas très grand partisan de descriptions faites sur un seul individu et surtout sur une ♀, mais celui-ci est si bien caractérisé et fait présumer si peu de variations, que j'ai cru utile de le publier, quand ce ne serait que pour encourager les recherches dans un pays dont il nous est encore venu si peu de chose. M. Egerickx, qui en était propriétaire, a bien voulu, sur la demande de son ami M. Donckier de Donceel, en enrichir ma collection, et je le lui dédie avec plaisir.

M. Weyers a écrit à M. de Borre pour lui annoncer son arrivée à Sumatra. Il est donné lecture de cette lettre, qui renferme des renseignements très intéressants sur le climat, la faune et la flore de l'île.

M. Lethierry envoie les deux notes suivantes :

LISTE DES HÉMIPTÈRES

TROUVÉS A AGUILAS (ESPAGNE) PAR M. WEYERS.

- Graphosoma semipunctatum* Fabr.
Canthophorus dubius Scopoli.
Dolycoris verbasci de Geer.
Brachynema cinctum Fabr.
 — *triguttatum* Fabr.
Nezara Millierei Mulsant et Rey.
Strachia picta H.-Schæffer.
 — *decorata* H.-Sch.
Phyllomorpha laciniata Will.
Enoplops cornuta H.-Sch.
Ceraleptus squalidus Costa.
Verlusia sulcicornis Fabr.
Lygæus militaris Fabr.
Melanocoryphus punctatoguttatus Fabr.
Plociomerus calcaratus Puton.
Lamprodema maurum Fabr.
Pachymerus delineatus Rambur. (N'avait encore été rencontré que dans l'Espagne méridionale. Capture très intéressante.)
Pyrrhocoris apterus Linné.
 — *Ægyptius* Linné.
Pirates hybridus Scopoli (larves).
Cerascopus domesticus Scopoli.
Plea minutissima Fabr.
Hysteropterum distinguendum Kirschb.

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX POUR LA FAUNE BELGE

OU DONT LA LOCALITÉ N'A PAS ENCORE ÉTÉ PRÉCISÉE.

Bothynotus pilosus Boheman. — Bois d'Angre, près la station de Roisin (ligne de Bavay à Dour), en fauchant, fin juin. (Lethierry.)

Figurait dans la collection Wesmael, mais sans indication de localité. N'a été trouvé qu'une seule fois dans le département du Nord.

Microphysa pselaphiformis Westwood. — Fin juin, sous

l'écorce d'un mélèze mort, sur les anciens remparts d'Ypres.
(Lethierry.)

Figurait sans indication de localité dans la collection Wesmael.
Département du Nord.

Salda C.-album Fieber. — Blankenberghe. (A. Duvivier.)

Espèce peu commune dans le département du Nord, et figurant
sans indication de localité dans la collection Wesmael.

Nabis lineatus Dahlbom. — Blankenberghe. (A. Duvivier.) Sans
indication de localité dans la collection Wesmael.

Cette espèce se rencontre principalement sur les plantes aquatiques, dans les marais d'eau douce bordant le littoral : j'en ai pris une certaine quantité dans les environs du Crotoy, à l'embouchure de la Somme ; cependant, on la trouve aussi, mais très rarement, dans les marais de l'intérieur (environs de Lille). La forme macroptère n'a encore été rencontrée qu'en Suède ou en Danemark.

Sigara Scholtzi Fieber. — Étang de Zillebeke, près d'Ypres (Lethierry), en immense quantité, fin de juin.

Se trouve aussi dans l'Escaut, à Valenciennes ; n'a encore été rencontrée, malgré de nombreuses recherches, ni dans la Scarpe, ni dans la Deule, ni dans la Lys.

Il est ensuite donné lecture d'une communication et d'une note que vient d'envoyer M. le professeur F. Plateau :

Notre confrère M. Weyers a soumis à mon examen deux Crustacés recueillis en juin 1883 dans l'île de Chypre, par M. Julien Deby.

Tous deux sont de formes assez communes. Le premier, capturé sur les bords d'une rivière, à 12 kilomètres de la côte et à 340 mètres d'altitude, est un jeune individu de la **Thelphusa fluvialtilis** Belon, Crustacé Brachyure, dont l'habitat spécial, dans l'eau douce et loin de la mer, est bien connu.

L'autre forme est la **Dromia vulgaris** Edw. D'après une note qui accompagne l'échantillon, l'animal aurait été trouvé aux sources de la Ballahusa, à 3 ou 4 kilomètres de la mer, courant avec rapidité d'une pierre à l'autre. Comme il ne peut y avoir aucun doute quant à la détermination du genre et de l'espèce, qui sont très facilement reconnaissables à des caractères tranchés, il faut supposer qu'il s'agit ici d'un individu transporté par un panier de pêcheur, par un oiseau ou de toute autre façon accidentelle, car les Dromies sont des crustacés essentiellement marins.

Des faits de ce genre sont moins rares qu'on ne le croit générale-

ment; je citerai, par exemple, un poisson lophobranche, le *Syngnatus acus* (individu adulte), frais, ramassé dans un fossé aux environs de Gand.

NOTE SUR DES CRUSTACÉS ET DES MYRIAPODES

RECUEILLIS PAR M. WEYERS AUX ENVIRONS D'AGUILAS
(SUD-OUEST DE CARTHAGÈNE), ESPAGNE.

1. *Porcellio ornatus* Milne Edwards. (Déjà indiqué à Carthagène par Edw.) 10 à 12 individus.
2. *Scutigera colcoptrata* Lin. (De toute l'Europe méridionale, d'Algérie, d'Égypte et de Madère.) 1 individu.
3. *Scolopendra hispanica* Newport. (C'est très probablement à cette forme propre au midi de l'Europe que répondent les *Scolopendra pulchra* et *Sc. nigrifrons* de Ch. Koch.) 3 individus.
4. *Himantarium mediterraneum* Fr. Meinert. La détermination des *Himantarium* est difficile. *H. mediterraneum* est la seule des neuf formes décrites par Meinert à laquelle se rapportent à peu près exactement les quatre individus soumis à mon examen. (Localités indiquées par Meinert : Bône, Constantine, Grenade.)
5. *Julus rubripes* C. Koch. (*Julus sabulosus* var. *rubripes*, Berlese. *Acari, Miriapodi e Scorpioni italici*, fascicolo XII.) 6 individus. Localités déjà indiquées : Nice, l'Italie, Pantelaria (1).

En consultant, pour ces déterminations, les *Miriapodi di Lombardia* de E. Cantoni, j'ai constaté, par l'examen des tableaux de distribution géographique, que jusqu'en 1880 les Myriapodes d'Espagne avaient été à peu près complètement négligés. Avis aux chercheurs.

M. Dietz a fait connaître à M. de Borre quelques captures intéressantes :

M. van der Hoop, un de ses amis, membre de la Société Entomologique des Pays-Bas, a pris à Calmpthout : *Dromius nigricentris* Thomson (= *notatus*), *Dr. angustus* et *Masoreus Wetterholii*, et à Anvers, le *Molorchus minor*.

(1) Un exemplaire de cette espèce a été pris en Portugal, à Caldas de la Reina, par C. Van Volxem, et les collections du Musée royal en renferment aussi quatre beaux exemplaires, des environs de Lisbonne, donnés par notre collègue M. le baron R. Bonaert. (A. DE BORRE.)

A Deurne, MM. Dietz et van der Hoop ont trouvé : *Soronia punctatissima*, *Cryptarcha strigata*, *Ips 4-guttatus*, *Epurea 10-guttata* et *obsoleta*, *Rhizophagus politus*. Toutes ces espèces se trouvaient en quantité dans la plaie d'un vieux chêne. Elles ont été déterminées par M. Everts, ainsi que les trois carabiques cités plus haut.

M. Dietz envoie, pour la collection de la Société, deux exemplaires du *Latheticum orizae* Waterh. Cet Ulomide, nouveau pour la Belgique, se rencontre communément à Anvers, dans les grains importés des Indes.

M. De Lafontaine montre une *Cicindela hybrida* dont les lunules marginales de l'élytre droite se sont fusionnées, tandis que les taches de l'élytre gauche sont restées parfaitement normales.

Aucun des membres présents n'a pris part à l'excursion du 13 juillet à Esschenbeek. Il paraît que, seul, M. le Dr Du Pré s'y est rendu, nonobstant une chaleur tropicale, et que cette excursion a été sans résultats.

Sur la proposition de M. le Dr Jacobs, l'assemblée décide que l'excursion du 14 septembre aura lieu dans les environs de Genappe et Bousval. Elle sera conduite par M. le Dr Jacobs. Départ de Bruxelles (Midi) à 7 h. 41 m. du matin, pour arriver à Genappe à 9 h. 21 m.

La séance est levée à neuf heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

.. —
SÉRIE III. — N° 49.

Assemblée mensuelle du 6 septembre 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Becker, Bergé, De Glain, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, Demoor, J. Devaux, H. Donckier de Donceel, Jacobs, Kerremans, L'Arbalestrier, Remy, Van Rossen et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. de Bormans, Dietz, Lameere, Van Segvelt et Weinmann font excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

M. Belon signale deux rectifications à faire dans les notes qu'il avait envoyées pour le compte-rendu de la séance du 5 juillet :

La première rectification est de beaucoup la plus importante. En rédigeant la note synonymique, page ccxxiv, j'ai nommé la *C. obesa* Broun comme devant tomber en synonymie de la *M. splendens* Reitter. C'est là une distraction tout à fait inexplicable. La *C. obesa* n'a aucun rapport avec l'espèce en question. J'ai voulu écrire *C. angusticollis* Broun (*Man. N. Z. Col.*, p. 235, n° 414), et une confusion de mémoire m'a fait mettre tout autre chose sur le manuscrit. Il faut donc lire ma note ainsi qu'il suit : « En ce qui concerne les sept autres, je ne vois que la *C. angusticollis* Broun (*Man. N. Z. Col.*, p. 235, n° 414) qui doit probablement tomber en synonymie de la *M. splendens* Reitter. »

La seconde rectification concerne un mot omis par le compositeur dans la diagnose du *Metophtalmus sinuosus*, page ccxxv, ligne 6. Au lieu de : *supra depressis, ciliis obtusangulis*, il faut

lire : *humæris supra depressis*, etc. ; sans cela, la phrase n'a plus de sens.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 2 août est ensuite approuvé.

Correspondance.

MM. Osten-Sacken, Ragusa et Rogenhofer se plaignent de nouvelles irrégularités dans la transmission de nos publications par la voie postale.

La Société des Sciences naturelles de Chemnitz nous annonce qu'elle célébrera le 18 octobre prochain le 25^e anniversaire de sa fondation. — Une adresse de félicitations lui sera envoyée.

M. Wood-Mason, conservateur de l'Indian Museum, à Calcutta, nous envoie des exemplaires de cinquante-six opuscules qu'il a publiés. — Une lettre de remerciements lui sera adressée, et le Secrétaire cherchera par la même occasion à établir des relations avec la Société Asiatique du Bengale.

M. H. de la Cuisine, membre de la Société Entomologique de France, à Dijon, fait hommage d'une aquarelle représentant une variété du *Pavonia Teucer*, de Colombie, et une très intéressante variété du *Papilio Alexanor*, prise dans les Basses-Alpes.

M. Casey (1125, Girard street, à Philadelphie) fait hommage à la Société, et à quelques-uns de ses membres, d'exemplaires d'une note qu'il vient de publier sur des coléoptères de l'Amérique du Nord.

M. l'Abbé Provancher nous envoie des parties qui nous manquaient du *Naturaliste Canadien*, revue dont la publication a cessé.

La Société Entomologique de France nous envoie ses Annales (1883).

La Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut nous envoie le programme de ses concours pour 1884. Aucune question n'est relative à l'entomologie.

M. Friedländer nous envoie les prospectus de divers ouvrages entomologiques.

Il a été reçu un numéro du *Mésos* et deux du journal allemand *Insekten-Börse*.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu lecture des rapports de MM. Candèze et de Borre, l'assemblée vote l'impression aux Annales de trois travaux de M. Lamcère : *Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et à La Plata; Matériaux pour la faune des Petites-Antilles : Longicornes recueillis par M. Purres à Anti-*

goa, et Longicornes des voyages du Dr E. Fromont au Brésil et à La Plata.

Un quatrième travail de M. Lameere : *Matériaux pour servir à la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus*, est présenté par le Secrétaire et également renvoyé à l'examen de MM. Candèze et de Borre.

M. Bergé présente un travail ayant pour titre : *Énumération des Cétonides décrits depuis la publication du Catalogue de MM. Gemminger et de Harold*. — Il est renvoyé à l'examen des mêmes commissaires.

Le Secrétaire donne ensuite lecture du travail suivant :

NOTE SUR L'HYPOCEPHALUS ARMATUS

par **Auguste Lameere**.

L'envoi fait par notre collègue, M. de Lacerda, d'un certain nombre d'exemplaires de ce rarissime et intéressant Coléoptère en Europe semble avoir de nouveau réveillé chez les naturalistes le désir d'expliquer sa bizarre organisation. Après M. Fairmaire, qui a décrit et figuré la femelle jusqu'ici inconnue (*Ann. Fr.*, 1883, *Bull.*, p. cXLVI; *Naturaliste*, 1884, p. 397), M. D. Sharp a publié chez nous (*Ann. Belg.*, 1884, *Bull.*, p. cvii) la remarquable notice dont j'ai eu l'honneur d'offrir une traduction à la Société (*Ann. Belg.*, 1884, *Bull.*, p. cCL).

Le Musée royal d'Histoire naturelle doit à M. de Lacerda la possession d'un bel exemplaire ♂ d'*Hypocephalus armatus*, que, grâce à l'obligeance de M. de Borre, j'ai pu examiner à loisir. La tête de l'insecte se trouve, comme chez tous les spécimens connus, dans sa position ordinaire de contraction, position que l'on ne peut mieux comparer, me semble-t-il (et M. Lewis m'exprimait dernièrement la même opinion), qu'à celle de la tête chez la plupart des nymphes de Longicornes. N'ayant point la permission de ramollir l'exemplaire du Musée, je n'aurais pu me rendre compte *de visu* des particularités vraiment extraordinaires découvertes par M. Sharp, si notre éminent collègue ne s'était pas spontanément offert à me communiquer un *Hypocephalus* dont la tête était ramenée dans sa position normale.

Que l'on me permette d'abord de remercier ici M. Sharp de son amabilité, qui me donne l'occasion de faire passer cet insecte sous les yeux de l'assemblée; et afin que ceux qui n'ont point d'*Hypocephalus* à leur disposition puissent se rendre compte exactement des observations de notre savant collègue, j'ai intercalé dans cette

note deux figures tirées de l'exemplaire de M. Sharp : l'une représente l'aspect qu'offre la tête de l'insecte lorsqu'elle est relevée; l'autre montre la forme si curieuse du grand espace membraneux que l'on voit alors en dessous entre la tête et le prothorax.



En plongeant son exemplaire dans l'eau, comme me l'avait conseillé M. Sharp, j'ai pu faire exécuter facilement à la tête ce mouvement de nutation si remarquable, dont la découverte a été le point de départ des observations du savant entomologiste.

J'engagerais, toutefois, ceux qui voudraient constater par eux-mêmes cette particularité, à faire plutôt usage du liquide de Wickersheimer (Vid. *Deutscher Reichs-Anzeiger*, 1879, n° 251), qui a la propriété de ramollir les ligaments et de leur conserver ensuite leur mobilité : son emploi,

qui a été reconnu excellent par notre collègue M. Kerremans, me semble tout indiqué dans le cas si spécial de l'*Hypocephalus*.

Comme on aura pu le voir par le second des dessins ci-dessus, l'espace membraneux du spécimen que m'a envoyé M. Sharp ne présente aucune blessure. Par suite d'une heureuse circonstance, la contraction que subissent les muscles abaisseurs de la tête après la mort de cet insecte a été poussée jusqu'à son extrême limite chez l'*Hypocephalus* que possède le Musée; de sorte que j'ai pu m'apercevoir immédiatement de l'existence d'un espace membraneux supérieur qui existe également entre la tête et le prothorax, et dont n'a point parlé M. Sharp. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au centre de cet espace se trouve une blessure qui répond tout à fait à la description que nous a donnée notre collègue de



celle existant sur l'espace membraneux inférieur chez l'exemplaire qu'il a pu disséquer. La figure ci-jointe permettra, je l'espère, de juger de la forme de l'espace, de l'emplacement de la blessure et de la manière dont se termine la tête postérieurement en dessus.

Je ne me permettrai pas de discuter l'ingénieuse hypothèse que M. Sharp a formulée sur la lésion de l'espace membraneux inférieur : ces blessures sont-elles le résultat des luttes que se livreraient les mâles pour la possession des femelles? C'est

ce que l'avenir nous apprendra, lorsque l'*Hypocephalus* aura été observé vivant, et M. de Lacerda est mieux que tout autre à même de rendre cet avenir le moins éloigné possible. Quoi qu'il en soit, les différences existant entre les deux sexes semblent apporter une nouvelle preuve à l'opinion de M. Sharp, d'après laquelle ces espaces membraneux seraient le fait d'une sélection sexuelle.

Nous pourrions cependant, me paraît-il, demander à la sélection naturelle une explication de la mystérieuse organisation de l'intéressant Coléoptère, et dans cette voie j'abonderai dans le sens de M. Sharp en le considérant comme un Longicorne voisin des *Cyrtognathinæ*; mais je serais, de plus, disposé à croire que l'*Hypocephalus armatus* est, comme ces derniers, un *Prionide souterrain*.

Les espaces membraneux supérieur et inférieur sont évidemment constitués par la membrane hypodermique existant sous le revêtement chitineux de tous les Arthropodes. Chez l'*Hypocephalus*, l'espace membraneux du dessus n'offre rien de bien remarquable, si ce n'est la blessure de l'exemplaire du Musée, prouvant que pendant la vie de l'insecte, cet espace peut arriver à être découvert, ce qui ne se présente pas dans les *Cyrtognathinæ*. Chez ceux-ci, en effet, ainsi que j'ai pu m'en assurer en disséquant le *Cyrtognathus forficatus* de ma collection, la tête se termine en arrière absolument comme chez l'*Hypocephalus*; seulement, la membrane hypodermique qui la relie au prothorax, et dont le développement est fonction de l'amplitude de la nutation, est moins exagérée. Les deux échancrures que présente le vertex existent, d'ailleurs, chez tous les Longicornes, mais nulle part cette échancrure n'est aussi prononcée que chez l'*Hypocephalus*, si ce n'est chez le *Cyrtognathus forficatus* Fab.; c'est dans ces échancrures que viennent s'attacher les muscles releveurs de la tête, et, la longueur de ceux-ci augmentant avec la profondeur de l'échancrure, le développement de cette dernière chez l'*Hypocephalus* et les *Cyrtognathinæ*, où les muscles antagonistes abaisseurs de la tête sont énormes, est tout expliqué.

En dessous, abstraction faite de la manière dont elle est rattachée au prothorax, la tête de l'*Hypocephalus* est parfaitement normale et semblable à celle de tous les Prionides. Mais le prosternum, échancré d'une manière inusitée, laisse entre cette échancrure et la tête un espace membraneux d'une constitution compliquée et dévoilant une bien curieuse disposition, pour permettre à la tête d'être entièrement ramenée sous le corps. On peut y distinguer deux régions, l'une postérieure, plane, ornée en avant de quelques cils, et rentrant sous la carapace thoracique dès que le mouvement de nutation commence à se produire; l'autre, formée de deux ma-

melons musculieux transversalement ridés et inclinés de manière à former entre eux un angle dièdre rentrant. La face antérieure en est convexe et présente en avant, sous le rebord céphalique, une rainure dans laquelle peut venir s'adapter une saillie du mamelon postérieur, qui est lui-même concave ; de sorte que toutes choses sont parfaitement disposées pour qu'au moment de la nutation, lorsque la partie postérieure de l'espace membraneux est rentrée dans le prothorax, les deux plans de l'angle dièdre se rapprochent à la façon d'une charnière jusqu'à coïncider, ce qui permet la flexion totale de la tête.

Nulle part dans l'ordre des Coléoptères, nous ne rencontrons une conformation aussi extraordinaire, mais aucun Coléoptère non plus ne nous présente, poussée aussi loin, la faculté de contracter la tête. Néanmoins, partout où la tête doit exécuter des mouvements un peu étendus dans le plan médian, il y a retrait du revêtement de chitine au profit de l'extension de la membrane hypodermique qui relie la tête au prothorax. Et, en effet, s'il n'existait pas d'espaces membraneux, l'extrémité solide du vertex et de la gorge viendrait butter sous la carapace formée par le prothorax, et le mouvement de la tête de haut en bas serait excessivement restreint : c'est ce que l'on peut observer chez un Carabe, par exemple, chez lequel ce mouvement est inutile. Mais il suffit de relever légèrement la tête d'un Nécrophore, essentiellement mobile dans le plan médian, pour apercevoir le grand espace membraneux qui la relie au prothorax. C'est aussi grâce à la mollesse des tissus que les nymphes des Longicornes peuvent avoir la tête rabaissée contre le sternum, et l'*Hypocephalus* semble tenir de sa nymphe la particularité qui lui a valu son nom. Enfin, dans les exemplaires du groupe des *Cyrtognathinae* de nos collections, la tête est aussi plus ou moins ramenée en dessous du corps, et en enlevant celle du *Cyrtognathus forficatus*, j'ai pu y voir également un espace membraneux. J'incline donc à penser que chez l'*Hypocephalus* le caractère extraordinaire découvert par M. Sharp n'est qu'une énorme exagération de ce qui s'observe chez d'autres Coléoptères, énorme exagération qui n'est qu'une adaptation spéciale pour permettre la flexion également très exagérée de la tête, mais qui s'observe déjà à un degré beaucoup moindre chez les *Cyrtognathinae*.

Absolument rien, d'ailleurs, n'empêche qu'en même temps que la sélection naturelle développait ces grands espaces membraneux, ils ne devinssent le point de mire des attaques que se livraient les mâles dans leurs combats sexuels ; c'est même extrêmement probable, et je suis tout disposé à admettre l'opinion de notre éminent collègue sous ce rapport. Mais, si la sélection sexuelle donne aux mâles des armes offensives contre leurs rivaux et les

perfectionne, nous n'avons dans toute l'animalité, et M. Sharp le reconnaît lui-même, aucun exemple dans lequel elle aurait développé un défaut de la cuirasse. Si les espaces membraneux existent, c'est qu'ils présentent un intérêt biologique d'ordre supérieur, et nous ne pouvons reconnaître comme le fait de la sélection sexuelle que quelques particularités destinées à en rendre la préservation plus efficace.

A quoi peut donc bien servir le mouvement de nutation de la tête de l'*Hypoccephalus*, étant donné le reste de son organisation, si ce n'est à se frayer un passage dans le sol? M. Fairmaire suggère que l'insecte vit probablement dans ce terreau formé de débris végétaux qui se trouve au pied des arbres dans les forêts des tropiques. Qu'on examine les deux paires de fourches que forment les mandibules dentées extérieurement et les crocs jugulaires, que l'on considère la partie supérieure de la tête, qui est plane, carrée, ressemblant à une pelle, qu'on jette un coup d'œil sur les pattes et surtout sur les membres postérieurs, ne sera-t-on pas amené à admettre cette opinion? L'*Hypoccephalus* n'est-il pas admirablement conformé pour fendre un terrain meuble, sa tête, grâce à son mouvement de nutation, écartant à l'aide de ses fourches et de sa pelle les fragments de végétaux qui le composent, et ses tibias postérieurs fortement arqués poussant en avant son corps en forme de fuseau, auquel les saillies des pattes auront déjà préparé un passage? Mais il était en même temps nécessaire qu'aucune des particules formant le sol où ce Coléoptère avait à se frayer un chemin, ne pût s'introduire entre le prothorax et les espaces membraneux : à cet effet, la rangée de cils qui, chez tous les Longicornes, borde le prothorax en avant et existe vraisemblablement pour défendre à tout corps étranger de pénétrer jusqu'à la membrane hypodermique, est ici renforcée, et elle forme, surtout en dessous, une véritable brosse qui balaye entièrement l'espace membraneux au moment où celui-ci rentre dans le prothorax.

Revenons-en maintenant aux *Cyrtognathine*. Nous savons par la lettre de Delessert, insérée dans la *Revue Zoologique* de Guérin (1840, p. 39), que l'un de ces Longicornes, le *Dorysthenes montanus* Guér., sort de terre sur le plateau des Nilgherries. Les mêmes mœurs sont sans aucun doute dévolues aux autres *Cyrtognathine* et peut être encore à d'autres Longicornes : leurs larves s'enfoncent probablement dans les racines, et la transformation en nymphe ayant lieu à une certaine profondeur, il serait de toute impossibilité à l'insecte parfait de se frayer une voie à travers le bois pour arriver à la lumière. Dès lors, il naît sous terre, et la sélection naturelle a nécessairement dû développer chez lui des caractères spéciaux pour lui permettre de traverser le sol : la tête

s'incline et devient plus mobile, les mandibules s'allongent, deviennent falciformes et dentées extérieurement, les joues s'avancent en forme de crocs, la tête s'aplatit en avant entre les antennes, toutes particularités que la figure du *Baladera Walkeri* Waterh. (*Trans. ent. Soc.*, vol. II, tab. XXI) montre parfaitement; enfin, les pattes elles-mêmes ne sont pas sans éprouver quelques modifications spéciales.

N'avons-nous pas là en germe ce qui est si extraordinairement développé chez l'*Hypocephalus*, et cet insecte n'est-il pas assez bien adapté à la vie souterraine pour que cette faculté lui permette non seulement d'arriver à la surface du sol après sa naissance, mais encore de se cacher et de circuler dans le terreau des forêts du Brésil?

Lacordaire a, le premier, reconnu toute l'importance de la vie souterraine présentée par quelques Prionides en en faisant un groupe spécial caractérisé par la saillie intercoxale de l'abdomen, arrondie au bout et très large chez les femelles. Par suite des analogies ou de leur vie manifestement souterraine, il a dû introduire dans ses *Prionides souterrains* les *Psalidocoptinæ* et les *Cyrtognathinæ*, dont les femelles auraient, d'après lui, la saillie intercoxale de l'abdomen normale. Je pense, cependant, que la femelle du *Psalidocoptus scaber* White est encore inconnue; quant aux *Cyrtognathinæ*, je n'ai qu'une seule femelle de ce groupe sous les yeux, celle du *Cyrtognathus chinensis* Thoms., et elle a la saillie intercoxale des Prionides souterrains. Que ceux qui possèderaient d'autres femelles de *Cyrtognathinæ* veuillent bien examiner si elles ne présentent point également ce caractère; dans ce cas, le groupe serait parfaitement homogène, et, comme on va le voir, on peut y introduire les *Hypocephalinæ*.

L'on sait que M. de Lacerda a offert à la Société deux photographies représentant la femelle de l'*Hypocephalus* vue par les faces dorsale et verticale; disons d'abord que cette femelle semble différer du mâle exactement de la même manière que les *Cyrtognathinæ* ♀ diffèrent de leurs ♂ : forme plus ramassée, pattes plus simples, enfin, raccourcissement de la partie antérieure du corps, qui, se portant sur la tête chez les *Cyrtognathinæ*, affecte le prothorax dans l'*Hypocephalus*. La tête est ramenée contre le prosternum, de sorte que les espaces membraneux existent également. La saillie intercoxale de l'*Hypocephalus* ♂ est une étroite lamelle rectangulaire, tronquée au bout : d'après la photographie de M. de Lacerda, il m'est impossible de distinguer nettement la manière dont cette saillie se termine antérieurement chez la ♀, mais on peut voir immédiatement qu'elle est très élargie, et que les hanches postérieures sont quatre ou cinq fois plus fortement séparées

qu'elles ne le sont chez le ♂. L'*Hypocephalus armatus* possède donc le caractère des Prionides souterrains, caractère sur la portée duquel, de même que sur la valeur des différences que présentent les deux sexes, je ne puis faire que des conjectures sans intérêt pour la science.

Il me reste à montrer comment il se fait que, par la sélection naturelle, ce Longicorne ne possède que des antennes très courtes, et ait le quatrième article des tarsi complètement développé : ce qui n'existe qu'à l'état de tendance chez les Prionides souterrains est devenu chez lui un fait accompli.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que de longues antennes seraient extrêmement gênantes pour un Longicorne aussi bien adapté à la vie souterraine que l'*Hypocephalus*, et qu'une fois à la surface du sol, elles lui seraient inutiles, puisqu'il est dépourvu d'ailes.

De même que chez les Mammifères les membres sont terminés primitivement par cinq doigts qui subissent une diminution par suite d'adaptations spéciales, de même, chez les Coléoptères, les tarsi semblent être à l'origine formés uniformément de cinq articles, mais suivant qu'ils doivent être des tarsi de course ou des tarsi de fixation, le nombre des articles varie. Si l'insecte doit être adapté à la marche ou à la course, il aura les tarsi le plus longs possible, et dès lors présentant la forme primitive à cinq articles. Si, au contraire, le tarse doit servir, comme chez les Longicornes, à fixer l'insecte sur les végétaux, il est nécessaire qu'il se raccourcisse pour diminuer le bras de levier de la résistance, et que son extrémité sur laquelle porte l'effort musculaire soit le plus rigide possible; à cet effet, le quatrième article s'atrophie, et le nodule qui le représente n'est plus articulé sur l'article unguéal, afin de donner plus de fixité à l'appareil. De sorte qu'au fur et à mesure que nous verrons les Longicornes vivre moins sur les arbres pour s'adapter à une vie souterraine et terrestre, le quatrième article des tarsi s'accroîtra de plus en plus, s'articulera sur le cinquième, et enfin reprendra son aspect primitif, comme chez l'*Hypocephalus*, toutes les transitions vers ce cas éloigné d'atavisme nous étant fournies par les autres Prionides souterrains. A l'appui de cette théorie, l'on peut encore invoquer la présence de cinq articles distincts aux tarsi des *Vesperus*, qui sont des Lepturiens souterrains, et la transformation que subissent les tarsi, en passant par les *Parandra*, de la forme Longicorne à la forme Lucanide, c'est-à-dire d'insectes arboricoles à des insectes souterrains.

Contrairement à ce que pensait l'illustre Le Conte, je ne puis donc considérer l'*Hypocephalus armatus* comme un ancien reste

d'une faune éteinte; il est plutôt, pour moi, d'apparition relativement récente, non pas la transition entre un certain nombre d'autres familles, mais, si je puis m'exprimer ainsi, l'extrémité actuelle de l'impasse formée dans le groupe des Longicornes par les Prionides souterrains. Et je résumerai mon opinion en disant que ce vivant témoignage de l'évolution est un Longicorne parfaitement adapté à la vie souterraine, et ayant une origine commune avec les Prionides souterrains du groupe des *Cyrtognathinæ*.

M. Dietz adresse la communication suivante :

A l'effet d'élucider, dans la mesure de mes pauvres moyens, les différentes questions soulevées par MM. Weyers et de Borre à propos de la *Cicindela maritima* de Calmpthout, je me suis, ainsi que plusieurs de mes collègues, du reste, rendu à différentes reprises, cette année, dans cette localité et j'ai réussi à en rapporter une centaine d'exemplaires de l'espèce litigieuse. J'ai été heureux de pouvoir en offrir quelques exemplaires à M. Fauvel d'abord, puis tout récemment à M. Everts, de La Haye. Ce dernier, en me faisant connaître son opinion, ajoutait qu'il en toucherait un mot à la séance que la *Nederlandsche Entomologische Vereeniging* allait tenir à Breda le lendemain (23 août). Et puisque je viens à parler ici incidemment de cette assemblée, à laquelle j'ai assisté, qu'il me soit permis d'ouvrir une large parenthèse pour en dire un mot. Quoique je ne connusse personnellement aucun des membres de cette Société, et quoique je fusse dépourvu de tout caractère officiel, mon seul titre de membre de la Société Entomologique de Belgique m'y fit recevoir avec une amabilité et une cordialité dont je les prie de recevoir ici encore une fois mes remerciements. Se réunissant si près de notre frontière, ces messieurs avaient espéré la visite de quelques-uns de nos membres, et surtout celle de M. de Borre, qui, j'ai pu m'en assurer pendant les deux jours que je suis resté au milieu d'eux, y jouit d'une autorité et surtout d'une estime dont j'ai largement bénéficié. Pendant la séance, j'ai pu constater plusieurs fois combien les entomologistes néerlandais suivent et apprécient les travaux publiés par notre Société. Je pense que ceux de nos collègues qui s'occupent de la faune de la Belgique auraient un grand intérêt à s'initier un peu plus aux publications de nos voisins. Il se publie là des travaux fauniques du plus haut intérêt pour nous, et les études de M. Everts sur les Nitidulaires, Apionides, Lathridiides, etc., et de M. Leesberg sur les Halticides néerlandais sont vraiment remarquables. Mais la langue néerlandaise, relativement peu répandue, restera toujours un grand obstacle, comme le leur disait pendant la séance le Dr Heylaerts, qui les engageait à

employer plus souvent les langues française ou allemande, surtout pour des travaux ne se rapportant pas exclusivement à la faune de leur patrie, conseil que leur donnait déjà, du reste, en 1880, le Dr Kriechbaumer, de Munich, dans les *Entomologische Nachrichten* du Dr Katter.

J'ai assisté aussi à l'excursion que la Société fit le lendemain au Liesbosch, à quelque distance de Breda. Quoique favorisée d'un temps superbe, cette excursion ne donna pas, que je sache, de beaux résultats, sauf un hémiptère nouveau pour la faune néerlandaise.

J'ai conservé de mon excursion à Breda le plus agréable souvenir et regrette de ne pas trouver ici assez de place pour un compte-rendu détaillé. Il peut, toutefois, ne pas être indifférent d'ajouter que durant cette séance et sur la proposition de M. Ritsema, l'assemblée vota une proposition à insérer dans leur *Tijdschrift* contre le bouleversement apporté dans la nomenclature des Coléoptères européens par les auteurs de la troisième édition du *Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasii*.

Pour en revenir à la *Cicindela maritima* de Calmphout, dont, comme je l'ai dit plus haut, j'ai réuni une centaine d'exemplaires et sur laquelle j'ai maintenant l'opinion de M. Fauvel et du Dr Everts, je dois dire que je partage entièrement leurs vues, à savoir que la *maritima* de Calmphout est identique à celle de nos côtes.

D'abord, pour ce qui regarde la distinction que MM. Weyers et de Borre veulent établir entre une petite et une grande *maritima* de Calmphout, il est impossible d'être de leur avis, quand on a devant soi un grand nombre d'exemplaires. Je les ai tous placés dans une boîte par rang de taille, et il est impossible de dire où finit la petite et où commence la grande. « Les différences notables » dont parle M. Weyers, à savoir : la taille plus petite, la forme plus parallèle, la couleur des élytres plus foncée, le dessin plus caractéristique franchement accusé et les ♂ un peu plus petits que les ♀, se réduisent à la petite taille seule. En effet, pour ce qui regarde la forme plus parallèle, j'ai remarqué que la plupart des petits exemplaires de Calmphout sont des ♂. Or, les ♂ dans cette espèce, de même que chez *hybrida*, sont tous plus parallèles que les ♀, et ces dernières ne diffèrent point sous ce rapport des ♀ du littoral. Pour la couleur, pas plus que M. Everts, je ne la vois plus foncée chez celles de Calmphout que chez celles du littoral : d'ailleurs, de *gestibus et colore*, etc. Et puis le liquide dans lequel on les plonge ne peut-il avoir une certaine influence? Schaum dit même que, par de fortes pluies, elles perdent leur brillant. Et quant au dessin des élytres franchement accusé, c'est un des traits distinctifs de toutes les *maritima*. Reste donc la taille seule, car c'est en vain que

j'ai cherché des caractères différentiels autres que ceux cités par M. Weyers.

Cette petitesse n'est pas à nier; un bon quart de mes exemplaires ne dépassent pas 11 millimètres, et un individu isolé pris à Boulogne-sur-Mer, " presque aussi petit que ceux de Calmpthout ", comme me l'écrit M. Fauvel, n'infirme pas la règle, qui est ici presque constante. L'habitat de cette espèce loin de la mer est aussi très intéressant. Schaum, toutefois, dit qu'elle se rencontre aussi en Sibérie, à l'intérieur des terres. L'isolement d'une espèce, loin de son centre d'habitat, par l'une ou l'autre cause, peut influencer sur celle-ci; cependant, l'explication des individus généralement plus petits de Calmpthout doit se trouver, selon moi, dans l'aridité désolante des dunes de Calmpthout, où les larves doivent avoir bien de la peine à trouver leur pitance et où elles n'ont pas la ressource que trouvent leurs congénères du littoral dans le vent de la mer, chassant constamment sur les dunes une foule de petits diptères et d'autres insectes. Ceci est d'autant plus probable qu'on trouve de nombreux exemplaires intermédiaires, rendant imperceptible la transition de la petite à la grande.

Mais dans cette même assemblée de Breda où M. le Dr Everts se prononçait pour l'identité des *maritima* de Calmpthout et du littoral, il ressuscita la question de la spécificité de cette forme, ne reconnaissant dans *maritima* qu'une variété d'*hybrida*, les caractères assignés à la *maritima* lui semblant bien trop élastiques, notamment le front non gibbeux en avant, la bande de soies blanches inter-oculaires et la fascie élytrale. Il aurait rencontré des *hybrida* avec front fuyant et une autre avec des lunules semblables à celles de *maritima* et qu'il fit circuler. Quant à la différence du pénis, signalée par le Dr Kraatz, il l'a étudiée sur deux individus de chaque forme chez qui cet appendice faisait saillie et, quoique à la rigueur et avec beaucoup de bonne volonté, disait-il, on pût trouver celui-ci plus court et plus acuminé chez *maritima*, cette différence lui semblait si subtile, qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

Ici je ne suis plus de son avis. Il est vrai qu'on ne peut assigner un caractère spécifique incontestable à *maritima*, mais combien d'espèces dont personne ne songe à révoquer en doute la validité sont dans ce cas! Du reste, dès qu'on touche à cette question de variété et d'espèce, il est bien difficile de s'entendre. Le front fuyant chez *maritima* et convexe chez *hybrida* signalé en dernier lieu par M. Bedel et que M. Fauvel regarde comme un caractère très réel et parfaitement spécifique, n'est pas facile à distinguer chez certains exemplaires et n'est pas en tous cas à l'abri de toute contestation. Très prononcé dans la généralité des cas, ce caractère

devient précaire dans d'autres, de telle sorte que chez certains individus on dirait tantôt que le front est bombé et tantôt qu'il est plan. Je possède cependant une *hybrida* prise à Merxem, tout près d'Anvers, offrant le front franchement fuyant tout comme chez *maritima*. Ce caractère ne tranche donc pas la question ; cependant, je dois ajouter que si j'ai vu des *hybrida* avec front fuyant, je n'ai pas rencontré jusqu'ici de *maritima* à front gibbeux. Mais nous sommes ici en présence de tout un ensemble de caractères secondaires dont il est impossible de ne pas tenir compte et qui fait qu'on ne peut jamais se tromper sur l'une ou l'autre espèce, car pour ma part, je n'ai jamais rencontré un seul intermédiaire, et celui que M. Everts exhiba à l'assemblée de la Société Entomologique Néerlandaise était tout simplement une *hybrida* ; c'était aussi, je crois, l'opinion de mon voisin, M. le Dr Heylaerts. Ces différents caractères pour la *maritima* sont : le front non gibbeux en avant, une série de soies blanches occupant l'intervalle oculaire, la fascie médiane brisée à angle droit et plus allongée en arrière, le sommet des cuisses et les tibias plutôt verdâtres que bleus. Elle est aussi plus velue sur le corselet et en général un peu plus petite qu'*hybrida* (celle de Calmthout comme celle du littoral). Le caractère tiré du pénis ne peut non plus être oublié, puisque, de l'aveu même de M. Everts, il y a une légère différence. Si l'un de ces caractères est en défaut, ou s'il se rencontre également chez *hybrida*, on a toujours la ressource des autres pour la distinguer sûrement. Ainsi, chez mon *hybrida* de Merxem à front fuyant, la bande du centre de l'élytre est simplement sinueuse, la série de soies blanches fait défaut et le corselet est presque glabre.

Pour me résumer :

1° La *Cicindela maritima* du littoral ne diffère en rien de celle de Calmthout. Il est vrai qu'on rencontre dans cette localité un plus grand nombre d'individus de petite taille que sur le littoral, mais c'est une simple affaire de pitance chez la larve.

M. de Borre identifiant les petits exemplaires de Calmthout à ceux des bords de la Baltique, il est plus que probable que là-bas comme ici, il y a tous les passages de la petite à la grande et qu'elles doivent donc être rattachées aussi à la seule *maritima* existante.

2° La *maritima* et l'*hybrida* sont bien deux espèces distinctes.

Maintenant, pourquoi MM. von Heyden, Reitter et Weise ont-ils indiqué dans leur catalogue une *maritima* variété d'*hybrida* et une *maritima* Dejean ? Je n'en sais rien, et le plus simple serait de le leur demander. C'est ce que j'ai fait, mais jusqu'ici, je n'ai pas reçu de réponse.

Le Secrétaire donne lecture de la communication suivante, envoyée par M. de Bormans :

NOTES SUR QUELQUES ODONATES.

Pourquoi donc les amateurs de Névroptères (et moi tout le premier) vont-ils d'abord chercher bien loin et à grands frais les insectes rares? Ne serait-il pas mieux de commencer par explorer Bruxelles même et ses environs immédiats? On y trouverait certainement beaucoup d'excellentes espèces dont le hasard m'a fait, ainsi qu'il suit, découvrir quelques-unes.

Ayant eu l'occasion de longer les étangs d'Ixelles, dans les premiers jours de juillet de cette année, je fus frappé de voir resplendir sur le chemin une multitude de *Diplax Fonscolombii* ♂, dont l'admirable éclat de rubis enthousiasmait nombre d'amateurs aussi jeunes que naïfs. Hélas! ces entomologistes de l'avenir réussissaient beaucoup moins à saisir la rusée bestiole qu'à mettre dans un état vraiment regrettable leurs chapeaux neufs, seul engin de chasse qu'ils eussent à leur disposition.

Cet exemple m'induisait en tentation si violente, que je n'y pus résister.

Toutefois, j'avoue que l'idée de poursuivre les Odonates, le filet à la main, dans un lieu aussi fréquenté, m'inspirait quelque répugnance. Que je connaissais mal les habitants de Bruxelles, leur instruction, leur cordialité! Bien loin de manifester un étonnement railleur, c'était à qui, parmi les passants, s'intéresserait au succès de ma chasse, m'indiquant les *bons endroits*, m'avertissant dès qu'une Libellule s'était posée.

Ainsi mis à mon aise, je vins presque chaque jour me promener autour des étangs, en plein soleil, il est vrai, et par une température qui me rappelait délicieusement mes belles excursions dans l'Italie méridionale; mais baste! qu'importent 40 degrés centigrades à l'entomologiste vraiment épris de notre chère science! Je fus de suite largement récompensé de mes peines.

Outre une quantité de *D. Fonscolombii* ♂ et ♀, je pris, du 16 juillet au 1^{er} août, quelques couples du rare *Agrion scitulum*, personne distinguée, à la robe d'un beau bleu lamée de vert bronzé, au milieu d'une foule d'*Agrions puella*, *pulchellum*, *cyathigerum* et *elegans*, petites gens qu'on rencontre partout.

Vers le 1^{er} août, la *D. Fonscolombii* devient de moins en moins commune, pour disparaître complètement vers le 15; elle est remplacée par la *D. meridionalis*, bonne espèce, d'un rouge moins éclatant, qui disparut elle-même au bout de quelques jours.

A partir du 1^{er} août, je vois éclore en abondance le gracieux *Agrion Lindeni*, qui jusqu'ici passait pour rare en Belgique; à l'extrémité de l'étang la plus proche de l'École militaire, les ♂ et ♀ accouplés pullulent sur les herbes et buissons, qu'ils bigarrent de leurs singuliers entrelacements en arabesques mi-partie bleues et jaunes. (J'en ai pris plus de 300 en quelques jours.)

J'aperçois au même endroit une sorte de petit tourbillon rougeâtre : c'est la belle *Eischna rufescens*, que je ne puis saisir et qui disparaît sans retour; j'y prends quelques *Agrion Najas* et une *Lestes sponsa*; mais... attention! A quelques pieds du bord, sur la surface étincelante au soleil de l'éclat sombre du mercure, je distingue un frémissement clair d'ailes argentées; il cesse, et sur une tige à fleur d'eau brillent une petite tête rouge et l'autre extrémité d'un joli bleu de ciel.

Lançons notre coup de filet un peu au-dessous de l'eau, et dans la poche de soie ruisselante nous trouvons, avec des herbes et des coquilles, le svelte et mignon *Agrion viridulum*, auprès duquel son proche parent *A. Najas* semble un lourdaud paysan. Cette espèce très localisée ne dure guère qu'une dizaine de jours.

Les *Libellula 4-maculata*, *depressa*, *cancellata* ♂ traversent l'étang en tous sens, se posant très souvent sur les chemins, où leur corps bleu cendré trahit de suite leur présence. Les ♂, au vêtement brunâtre, sont beaucoup plus rares et aussi plus farouches.

Soudain, l'une d'elles fuit affolée; elle est serrée de près par son redoutable ennemi, l'*Anax formosus*, aussi féroce que le tigre, dont il a la beauté. Sa proie saisie, l'*Anax formosus* revient planer majestueusement au large, faisant miroiter à nos yeux la soie de sa longue jupe bleue rayée de velours noir.

Armons-nous de patience si nous voulons le prendre; attendons le moment où, se précipitant sur une femelle en quête d'aventures galantes, ou sur un gibier s'ébattant près de la rive, il viendra passer à portée de notre filet...; l'y voici, pas d'hésitation, un seul coup sec... la poche retombe, il est pris. Hâtons-nous de le piquer solidement de côté et d'assujettir ses ailes au fond de la boîte, avec une bande de papier; c'est ainsi que nous le rapporterons intact et vivant. La femelle ne se laisse guère approcher que lorsqu'elle pond; guettons l'instant où elle vient déposer ses œufs près du bord, laissons-la s'installer commodément, bien immerger le bout de son abdomen; puis, vivement, pêchons-la d'un rapide mouvement de filet; si celui-ci est mouillé, le soleil l'aura séché en quelques secondes.

Mais... quelle est donc cette belle étrangère qui nous arrive? Elle a le port de l'*Anax formosus*, se met à planer comme lui, toutefois, d'un vol moins sûr. Sa parure est diverse, ses épaules sont

couvertes d'un mantelet roux olivâtre, son corsage très écourté brille seul de l'éclat du saphir, tandis que sa jupe est d'étoffe obscure et terne, comme il convient pour un long voyage. O surprise ! c'est une demoiselle provençale, c'est l'*Anax Parthenope* !

Pécaïré ! elle est bien fatiguée, *la pauvre* ; la gaze de ses ailes est effiloquée sur les bords, comme le bas du pantalon d'un mendiant qui vient de loin. Aussi va-t-elle bientôt se reposer sur un buisson ; je m'approche, ma main tremble, je la manque deux fois... Deux fois, elle se repose tristement à quelques pas. Enfin, je la tiens, je l'admire, quelle joie !... mais, un instant. D'où viens-tu, belle voyageuse ? tu n'as certes pas subi de quarantaine ; quelque microbe suspect n'est-il pas ton compagnon de route ? Vite, dans le flacon à cyanure, où l'étrangère et ses microbes (si microbes il y a) sont foudroyés en une seconde.

Voilà de belles captures, n'est-ce pas ? mais tout n'est pas dit : il faudrait conserver après la mort de l'insecte l'éclat des couleurs de ces bijoux vivants. Je crois y avoir réussi en grande partie par la dessiccation presque instantanée dans le vide, en présence de l'acide sulfurique.

Sans allonger par la description détaillée du procédé ces notes, qui déjà, sans doute, sembleront trop longues, j'attendrai d'avoir apporté à la méthode tous les perfectionnements désirables pour la soumettre ici à mes honorables collègues.

Je vais donner seulement, pour terminer, le résumé des captures faites aux étangs d'Ixelles, du 16 juillet au 25 août 1884 ; on remarquera que cet ensemble constitue une petite faune étrangement méridionale.

1. **Libellula quadrimaculata** L. — Rare et déjà passée.
2. **L. depressa** L. — Idem.
3. **L. cancellata** L. — Commune surtout à partir du 15 août ; c'est seulement à cette époque qu'apparaissent les ♀.
4. **Diplax Fonscolombii** de Selys. — Des plus communes sur les chemins, du 15 juillet au 1^{er} août.
5. **D. meridionalis** de Selys. — Rare, premiers jours d'août.
6. **Anax formosus** Vanderlinden. — Commun du 15 juillet au 25 août (j'ai pris 14 ♂ et 4 ♀).
7. **A. Parthenope** de Selys. — Un seul ♂ pris le 22 août, à deux heures du soir.
8. **Æschna rufescens** Vanderlinden. — Vu la ♀ le 3, le 7 et le 18 août.
9. **Lestes sponsa** Hansem. — Un seul ♂ très adulte le 8 août.
10. **Erythromma viridulum** Charp. — Assez commun du 4 au 20 août, accouplement vers le 15 août, très localisé.

11. **E. najas** Hansem. — Assez rare, du 1^{er} au 25 août.
12. **Ischnura elegans** Vanderl. — Extrêmement commun pendant toute la belle saison, avec ses variétés.
13. **Agrion pulchellum** Vanderl. — Rare, du 16 au 20 juillet, déjà passé.
14. **A. puella** Vanderl. — (Idem.)
15. **A. cyathigerum** Charp. — Commun du 16 au 24 août. — La forme de la tache noire du 2^e segment abdominal varie beaucoup.
16. **A. scitulum** Ramb. — Pris quelques couples du 16 au 25 juillet, et un ♂ retardataire le 8 août (sa véritable époque devait être passée).
17. **A. Lindeni** de Selys. — De beaucoup le plus commun des Odonates qui fréquentent les étangs d'Ixelles. Paraît dès le 16 juillet, abonde surtout vers la fin d'août.

Ces lignes sans aucune prétention scientifique n'ont pour but que de faire naître des vocations parmi nos entomologistes. S'ils daignaient jeter leurs regards sur les Névroptères, ils verraient quelle source inépuisable de découvertes leur fournirait l'étude de cet ordre; quelles originales et charmantes collections ils formeraient avec ces insectes si différents des Coléoptères, Lépidoptères, etc., mais non moins richement parés.

Il ne nous reste qu'à émettre un vœu : nous supplions notre aimé et vénéré Président de publier bientôt le *Catalogue des Névroptères de Belgique*, dont le manuscrit est presque achevé. Je comprends qu'il lui en coûte d'abandonner un instant ses études si savantes et si profondes pour terminer un travail de vulgarisation fastidieux et ingrat, mais combien il s'assurerait notre reconnaissance s'il voulait bien mettre les éléments de la science à la portée de tous et *laisser venir à lui les petits enfants* !

M. de Selys-Longchamps, après quelques remarques sur les espèces rares signalées à Ixelles par M. de Bormans, dit que cette année les Odonates ont été extrêmement rares aux étangs de Longchamps, d'où plusieurs bonnes espèces semblent avoir temporairement disparu. L'*Anax Parthenope*, espèce d'ailleurs de passage accidentel, n'avait jamais été signalée en Belgique.

M. Van Segvelt envoie les trois notes suivantes :

Le 13 août dernier est décédé à Aix-la-Chapelle le Dr Förster. Il naquit en cette ville le 21 janvier 1810 et passa ses examens au Gymnase en 1832. Vers Pâques de cette même année, il se rendit

à l'université de Bonn, où il étudia d'abord la médecine et ensuite les sciences naturelles.

Au mois d'avril 1836, il fut nommé Lehrer au Realgymnasium d'Aix-la-Chapelle. Il devint Oberlehrer le 10 avril 1850 et obtint le titre de Professor en avril 1855, en récompense de ses remarquables travaux entomologiques. A la même époque, l'université de Bonn lui conféra le titre de docteur *honoris causa*. Il publia bon nombre d'ouvrages et d'opuscules d'histoire naturelle. Son dernier travail fut sa *Flora excursoria* de la circonscription d'Aix-la-Chapelle et des provinces limitrophes de la Belgique et du Limbourg hollandais.

L'illustre entomologiste laisse une remarquable collection de micro-hyménoptères, fruit de quarante années de travaux et de chasses. Il serait à désirer que la Direction du Musée pût acquérir cette collection. Elle comblerait une lacune assez considérable dans les richesses scientifiques de cet établissement.

Le Dr Arn. Förster était membre actif ou honoraire d'un grand nombre de sociétés savantes.

Le savant naturaliste eut quelques déboires à l'occasion de ses opinions politiques, mais le ministre Falk le protégea puissamment contre ses adversaires.

Les journaux d'Aix-la-Chapelle sont unanimes à dire que le Dr Förster laisse à ses concitoyens le grand exemple d'une vie toute d'honneur et de travail.

Il semble assez généralement admis que l'*Acronycta psi* L. passe l'hiver sous forme de chrysalide et n'a conséquemment qu'une génération par an. Tel est l'avis exprimé par notre collègue M. Dubois, dans son ouvrage sur les Lépidoptères de Belgique, et par Röscl, dans ses *Insecten Belustigungen*. Une observation faite dans le courant de cet été me permet d'affirmer que, dans certains cas au moins, cette Noctuelle a deux générations.

Le 12 juillet dernier, je capturai deux chenilles de ce papillon montant sur des ormes. Elles ne tardèrent pas à entrer dans un morceau de tourbe que je leur présentai et s'y chrysalidèrent. Le 2 et le 3 août suivant, j'obtins l'insecte parfait.

Il est évident, puisque l'époque d'apparition de la chenille de cette espèce s'étend de juillet à septembre, que j'aurais pu obtenir encore des chenilles en état de se chrysalider avant l'hiver et de donner leurs papillons au commencement de la prochaine saison.

Le 7 août dernier, j'ai capturé dans une clairière du bois de Buggenhout un exemplaire, non caudé aux ailes inférieures, mais ayant les deux paires d'ailes très nigrescentes, du *Polyommatus Phlaeas*. Staudinger désigne cette variété par le nom d'*Eleus*. Il dit

cependant que c'est une variété caudée. Peut-on, dans le cas présent, considérer l'individu capturé comme un véritable *Eleus*?

M. de Selys ajoute que la variété *Eleus*, d'ailleurs fort rare en Belgique, peut se présenter avec des ailes caudées ou non caudées.

M. E. Lefèvre adresse les descriptions suivantes :

Titubæa vivicola. — Oblonga, parallela, subtus atra ibique pube flavo-argentea obsita, supra rufo-brunnea, parum nitida, capite, antennis (basi excepta fulva), scutello, femoribus tarsisque nigris, tibiis totis fulvis; prothorace sat dense punctulato, puncto medio basali duabusque maculis lateralibus magnis nigris insignito; elytris subtilissime alutaceis, subopacis, juxta marginem lateralem utrinque longitudinaliter subcanaliculatis, margine laterali ipso, præsertim basi, elevato, singulo maculis quinque (una humerali, quatuor pone medium bifariam et oblique digestis) nigris. — Long., 6 1/2-7 mill.; lat., 3-3 1/3 mill.

♂. Capite magno, epistomate subtriangulariter emarginato, mandibulis validis forcipatis, sinistra majore, apice acuta; pedibus duobus anticis elongatis, tibiis ejusdem paris arcuatis.

♀. Capite minore, mandibulis pedibusque duobus anticis multo brevioribus, tibiis subrectis.

Hab. : Vivi (Congo). — Communiqué par M. le Dr Tosquinet.

Clytra Zaïrica. — ♀. Oblongo-elongata, parallela, subtus atra ibique pilis albidis modice vestita, capite, antennis omnino, scutello pedibusque nigris; prothorace nigro, lævi, utrinque macula transversa flavo-fulva antice notato; elytris nigris, dense fortiter punctatis, punctis hic illic subconfluentibus, singulo fasciis transversis tribus (una basali, altera media, tertia paulo ante apicem) flavo-fulvis. — Long., 8 mill.; lat., 3 1/2 mill.

Hab. : Vivi (Congo). — Un seul exemplaire, communiqué par M. le Dr Tosquinet.

Pseudocolaspis pedestris. — Viridi-cyanea, capite, punctulato, epistomate rotundatim emarginato, antennis nigris, articulis quatuor basalibus rufescentibus, prothorace valde convexo, antice quam basi angustiore, creberrime sat fortiter punctato, punctis subaciculatis; scutello lato, subpentagono, crebre punctulato; elytris basi prothorace multo latioribus, humeris prominentibus, densissime undique punctatis, infra callum humeralem subtiliter arcuatim impressis, pilis albidis setiformibus, præsertim versus apicem et lineatim dispositis, instructis; femoribus viridi-cyaneis, totis dente valida acuta subtus armatis, tibiis tarsisque brunneo-

rufescentibus, illis apice dilatato-angulatis. — Long., 3 mill.; lat., 2 mill.

Hab. : Vivi (Congo). — Un seul exemplaire, communiqué par M. le Dr Tosquinet.

Lamprosphærus histrionalis. — Subrotundato-ovalis, convexus, subtus cum capite piceo-niger, antennis flavis, prothorace subtilissime punctulato nigro, macula magna rotundata utrinque versus latera insignito; elytris dorso lineatim punctatis, versus apicem substriatis, juxta marginem lateralem utrinque stria impressa instructis, nigris, singulo maculis tribus (unâ humerali rotundata, altera longitudinali prope suturam, tertia magna arcuata infra medium et præcedenti intus connexa) fulvo-rufis; pedibus rufo-brunneis. — Long., 3 mill.; lat., 2 1/2 mill.

Bogota.

Lamprosphærus apicipennis. — Subrotundato-ovatus, rufo-fulvus, antennis pedibusque flavis, prothorace dense subtilissime punctulato, elytris dorso lineatim subtiliter punctatis, versus apicem substriatis, juxta marginem lateralem utrinque stria impressa longitudinaliter instructis, rufo-fulvis, singulo macula magna apicali cyaneo-violacea, oblique posita, insignitis. — Long., 3 1/2 mill.; lat., 2 3/4 mill.

Bogota.

M. Ernest André, ayant examiné les Formicides recueillis à Aguilas par M. Weyers, écrit qu'il n'y a rencontré que quatre espèces :

Camponotus sylvaticus Ol.

Aphaenogaster barbara L.

A. testaceo-pilosa Lucas.

Crematogaster scutellaris Ol.

Ces quatre espèces sont très communes dans toute l'Europe méridionale.

Le Secrétaire lit l'extrait suivant d'une lettre de M. le Dr Eug. Dugès :

Il a été à plusieurs reprises, autrefois, question dans vos séances du vol apparent des araignées. En cherchant quelques indications sur la locomotion des insectes, j'ai lu ce qui suit : « Quant aux araignées, elles offrent à l'observateur des remarques non moins curieuses; nous les *avons* vues lancer aux vents un faisceau de fils d'une extrême délicatesse et d'une longueur considérable, le tirer

de temps à autre avec leurs pattes de devant pour s'assurer s'ils s'étaient agglutiné à quelque corps solide, puis, en ayant acquis la certitude, s'élancer sur ce câble presque invisible en le renforçant d'un nouveau fil et traverser ainsi les airs avec vitesse : elles semblent alors ramer dans l'espace, et c'est là ce qui a trompé quelques naturalistes quand ils ont *crû les voir voler* sans guides et par la seule agilité de leurs pieds, etc., etc.» (ANTOINE DUGÈS, *Traité de Physiologie comparée de l'homme et des animaux*, tome II, p. 161 [1838].) Je n'ai pas tout cité, mais je crois qu'avec cela vous pouvez, en mon nom, revendiquer pour mon père le droit de *priorité* sur l'explication du *vol* des araignées. Si par hasard vous en avez le temps, lisez les trois volumes de cet ouvrage malheureusement inachevé, et vous y trouverez *bien des idées neuves* *aujourd'hui*.

M. Becker donne lecture du travail suivant :

CATALOGUE

DES

ARACHNIDES DE BELGIQUE

par **Léon Becker.**

CINQUIÈME PARTIE.

CHERNETES.

Ces Arachnides étaient jadis désignés sous les noms de *Pincees* ou de *Four-Scorpions*; ils existent en plus grand nombre dans le midi de l'Europe et sont, du reste, répandus dans le monde entier.

Cet ordre est représenté en Belgique par quatre genres contenant dix espèces.

FAMILLE DES CHELIFERIDÆ.

SOUS-FAMILLE. — CHELIFERINÆ.

GENRE CHELIFER Geoffroy (1763).

Chelifer De Geeri C. Koch (1837).

Rencontré rarement dans les bois; très commun au premier printemps dans les dunes, à la base des plantes.

Chelifer cancroïdes Linné (1761).

Je l'ai rencontré assez fréquemment dans les coins obscurs d'appartements inhabités.

Chelifer nodosus Schrank (1803).

Cette espèce se fixe parfois sur les mouches; je l'ai observée dans ces conditions une fois à Bruxelles et M. de Borre l'a trouvée également à Grammont; elle est rare en Belgique.

Chelifer cimicoides Fabricius (1793).

Assez commun sous les écorces, même dans les jardins de la ville; il file à la fin de l'automne une petite toile ronde sous laquelle il se tient.

SOUS-FAMILLE. — GARYPINÆ.

GENRE CHIRIDIUM Menge (1855).

Chiridium museorum Leach (1817).

Rare en Belgique; je l'ai trouvé chez moi et deux fois sous les écorces d'un sapin, à Boitsfort.

GENRE OBISIUM Leach (1817).

Obisium Simoni L. Koch (1873).

Je l'ai rencontré assez communément, mais toujours isolé, à Boitsfort et à Groenendael, en soulevant les mousses au pied des arbres.

Obisium muscorum Leach (1817).

Très rare; je l'ai observé à Boitsfort et dans les Ardennes.

Obisium simile L. Koch (1873).

Assez fréquent dans les bois de presque toutes nos provinces.

GENRE CHTHONIUS C. Koch (1843).

Chthonius orthodactylus Leach (1817).

Rare en Belgique; je l'ai rencontré dans une vallée de Modave en soulevant des pierres.

Chthonius Rayi L. Koch (1873).

Je l'ai observé assez fréquemment à Modave, à Han-sur-Lesse et à Groenendael. Une fois, je l'ai vu dans les dunes d'Ostende.

MM. Jacobs et Lamocere s'étant trouvés seuls au départ pour l'excursion à Clabecq, le 10 août, ont préféré se rendre de nouveau à la forêt de la Houssière, mais les résultats de leur chasse ont été insignifiants.

L'ordre du jour appelle le choix d'une localité pour l'excursion du 11 octobre, dernière de l'année. Sur la proposition de M. de Borre, qui en sera le guide, l'assemblée choisit les environs d'Argenteuil, près Waterloo. Départ de la gare de Bruxelles Midi par le train de 10 h. 29 m. du matin.

La séance est levée à 9 1/4 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 50.

Assemblée mensuelle du 4 octobre 1884.

PRÉSIDENTE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Arnold, Bergé, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, J. Devaux, Duvivier, Fologne, Fondu, Jacobs, Lameere, L'Arbalestrier, Remy, Vanden Branden, Van Rossen, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

M. H. Donckier de Donceel a fait excuser son absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle de 6 septembre est approuvé.

Le Président annonce que le Conseil d'administration vient d'admettre comme membre effectif M. Albert Willems, de Bruges, présenté par MM. Preudhomme de Borre et Fologne.

Correspondance.

M. M. des Gozis remercie pour son admission comme membre effectif.

La Société Helvétique des Sciences naturelles nous adresse ses publications et remercie pour l'envoi de nos Annales.

La Société des Naturalistes de Berne, la Société Hessoise des Sciences naturelles et médicales de Giessen et le Geological Survey des États-Unis nous annoncent l'envoi de leurs publications.

La Rédaction de la revue *Science* remercie pour l'envoi de nos Comptes-rendus.

Le Commissariat général du gouvernement à l'Exposition universelle d'Anvers nous adresse une liasse de circulaires et prospectus.

La Société a reçu un catalogue d'Hyménoptères européens, en vente chez M. Schmiedeknecht (Gumperda près Kahla, Thuringe), deux numéros du journal *Insekten-Börse* et un catalogue de livres de la librairie Wesley, à Londres.

Rapports, lectures, communications.

M. de Borre donne lecture du rapport de M. le Dr Candèze et du sien sur les deux manuscrits présentés à la séance précédente : *Matériaux pour servir à la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus*, par M. Lameere; et *Énumération des Cétonides décrits depuis la publication du Catalogue de MM. Gemminger et de Harold*, par M. Bergé. Conformément aux conclusions des rapports, l'impression de ces deux mémoires aux Annales est votée.

Le Secrétaire dépose un manuscrit accompagné de nombreuses figures : *Notes pour servir à une Monographie des Météloïdes du Mexique*, par M. le Dr Eug. Dugès. L'assemblée désigne, pour examiner ce travail, MM. Fairmaire et de Borre. Les commissaires sont invités à s'assurer si les espèces figurées par l'auteur ne l'ont pas été auparavant ailleurs.

M. van der Wulp adresse le travail suivant :

QUELQUES DIPTÈRES EXOTIQUES

par F.-M. van der Wulp.

Parmi les Diptères exotiques du Musée Royal d'Histoire naturelle à Bruxelles, que le zélé conservateur, M. Preudhomme de Borre, a bien voulu me confier dans le but de les examiner et de les déterminer, j'en ai trouvé quelques-uns, mentionnés ci-après, qui ont donné lieu à des observations ou qui doivent être décrits comme espèces nouvelles.

1. *Sciara* sp.

Un seul exemplaire femelle de la côte de Guinée (L. Petit).

L'espèce est voisine de celle de l'île de Sumatra que j'ai décrite et figurée sous le nom de *Sc. rufithorax* (*Diptera Sumatra-expectitie*, p. 6, n° 1, pl. I, fig. 1). Elle lui ressemble par la disposition des couleurs et les nervures des ailes, mais elle est un peu plus grande, le thorax est très luisant et les ailes sont plus obscures. Je regrette que l'exemplaire ne soit pas assez bien conservé pour être décrit.

2. *Odontomyia tritæniata* Bell.

Bell., Sagg. Ditterol. messic., I, 38.9, pl. I, fig. 17.

Un ex. ♀ de Guanaxuato, Mexique (E. Dugès).

Les caractères frappants qui distinguent cette espèce se retrouvent dans cet exemplaire, avec l'exception que Bellardi décrit l'abdomen comme ayant quelques taches dorsales irrégulières, tandis que l'individu du Musée y laisse voir une large bande noire commençant au 2^e segment et se dilatant au 3^e et au 4^e, à peu près comme dans notre *O. viridula*. Peut-être l'espèce varie-t-elle sur ce point.

3. *Tabanus thoracinus* Pal.

Pal. de Beauvois, Ins., 55, pl. I, fig. 44; Wied., Aussereur. Zweifl., I, 147.57.

La description de Wiedemann convient à deux mâles et deux femelles de Landana et de Condé, en Afrique (L. Petit).

L'espèce n'est pas mentionnée par Löw dans sa *Dipteren-Fauna Süd-Afrika's*. Les yeux sont nus et d'un vert clair, sans lignes transversales.

4. *Tabanus luteolus* Löw.

Löw., Dipt. Fauna Süd-Afrika's, p. (117), 45, n° 18.

Quelques femelles de l'Afrique australe (de Selys-Fanson).

Les yeux sont verts, sans lignes transversales.

5. *Chrysops crassicornis* v. d. Wulp.

(= *Chr. geminatus* Macq., non Wied.)

Un seul ex. ♀ de Guanaxuato (E. Dugès). Voyez mon annotation sur cette espèce dans le *Wiener Entomol. Zeitung*, 1884, p. 139.

6. *Laparus oralis* n. sp.

Testaceus; thorace opaco; facie pallida; setis duabus subalbis ad oris marginem; abdomine castaneo, segmentis ultimis nigris nitidis, utrinque albo-maculatis; tibiæ antice spinæ nigra; tarsis fuscis; alis rufescentibus; ramo superiori nervi cubitalis ad basin angulato et nervulo recurrente munito. — ♀ long. 19 mill.

Épistome d'un jaune grisâtre soyeux, blanc au bord des yeux, proéminent vers la bouche et y formant en profil une petite projection triangulaire; moustache ne consistant qu'en deux fortes soies blanchâtres; front d'un noir grisâtre, avec une ligne transversale blanchâtre en devant. Les deux premiers articles des

antennes fauves, de la même longueur; le deuxième avec quelques poils noirs au bout (troisième article manque). Suçoir assez fort, d'un noir luisant; palpes noirs à soies noires à l'extrémité. Dos du thorax d'un fauve grisâtre, opaque, presque sans aucun vestige de stries; côtés du thorax plus clairs et tendant plus à la couleur grise. Abdomen grêle, trois fois aussi long que le thorax; les trois premiers segments d'un brun châtain luisant et ligne latérale noire; les segments suivants noirs avec des taches châtaines et les incisions blanchâtres, se dilatant de chaque côté en forme de taches; anus avec quelques petites pointes noires. Pieds testacé luisant; extrémité des cuisses et des jambes plus obscure; tarses brun foncé; à la base des jambes postérieures un anneau plus clair; soies des pieds jaunâtres; ergot des jambes antérieures court, épais et d'un noir luisant; ongles des tarses noirs. Balanciers jaunâtres. Ailes légèrement brunâtres: la côte d'un fauve pâle; bras supérieur de la cellule sous-marginale courbé angulairement près de sa base et muni d'une petite nervure récurrente; première cellule postérieure non rétrécie.

Un seul ex. ♀ de la côte de Guinée (L. Petit).

7. *Maira lauta* n. sp.

Chalybea; thoracis dorso pilis erectis vestito; facie, maculis humeralibus pleurisque cinereis; alis nigricantibus, basi subhyalina. — ♀ long. 15 mill.

Cette espèce a des rapports avec *M. hispidella* v. d. Wulp (*Tijdschr. voor Entomol.*, XV, 213, 13), mais elle est plus grande, l'épistome est cendré au lieu d'être jaune, et les ailes sont plus obscures.

D'un bleu d'acier; les pieds de la même couleur. Tête plus large que le thorax; moitié inférieure de l'épistome proéminente et d'un cendré soyeux; moustache assez touffue, formée dans sa partie supérieure de soies longues et noires, dans sa partie inférieure de soies plus courtes et jaunes. Front profondément enfoncé, noirâtre, à soies noires aux orbites et une paire de soies plus longues sur le tubercule ocellaire; menton et occiput à villosité jaune. Antennes noires; les deux premiers articles à soies noires; troisième article presque aussi long que les deux précédents et assez grêle. Suçoir d'un noir luisant, plus long que la tête; palpes noirs à poils noirs. Épaules et côtés du thorax gris cendré; poitrine et hanches antérieures à villosité grise; dos du thorax à poils noirâtres; les poils dressés devant les balanciers sont noirs. Abdomen à taches latérales grises aux incisions; pas de soies latérales; premier segment à poils noirs de chaque côté; ventre à poils blancs; tarière courte,

noire. Villosité des pieds noire, à l'exception de celle des cuisses antérieures et d'une partie du devant des jambes postérieures, qui est blanche; jambes postérieures à peine un peu recourbées, munies en arrière de quelques soies allongées. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes noirâtres, la partie basale moins foncée; la couleur noire s'étend sur une partie des deux cellules basales supérieures (chez *M. hispidella* la cellule basale supérieure est entièrement claire).

Un individu ♀ de la Nouvelle-Calédonie (Hanckar).

8. *Eristalis nitidus* n. sp.

Cyaneo-niger nitidus; thorace lineis albicantibus; oculis nudis; antennis rufis, seta nuda; pedibus nigris, geniculis tarsisque pallidis; alis hyalinis. — ♀ long. 9.5 mill.

Cette espèce est voisine de l'*E. arorum* Fabr. Comme dans celle-ci, la tête est renflée et l'occiput pressé contre le prothorax; de plus, on y retrouve la petite nervure transverse surabondante, qui joint la nervure subcostale au bord antérieur de l'aile, au delà de l'issue de la nervure auxiliaire.

Corps large, comprimé. D'un noir bleuâtre luisant. Front à peine aussi large que la moitié du diamètre des yeux, plus étroit encore en arrière, couvert d'un duvet cendré aux côtés; au-dessus des antennes, une tache triangulaire fauve et luisante; face cendrée, la callosité du milieu et le rebord de la bouche d'un noir luisant. Yeux nus, grands, cachant le menton, qui est couvert de poils blanchâtres. Antennes ferrugineuses, à style nu. Suçoir brun noirâtre; palpes fauves. Thorax à cinq lignes blanchâtres, celle du milieu plus prononcée; le bord postérieur devant l'écusson également blanchâtre; côtés du thorax avec deux taches ou bandes gris pâle; écusson d'un bleu d'acier. L'abdomen ne montre la peinture propre aux Eristales que par une faible modification de la couleur noir bleuâtre. Pieds d'un noir luisant; genoux et base des jambes ainsi que les tarses fauve pâle; les derniers articles des tarses rembrunis; cuisses grêles, les postérieures à poils blancs. Balanciers testacés. Ailes hyalines et très luisantes.

Une femelle de Java (van Lansberge).

9. *Hystricia cyaneiventris* n. sp.

Nigra; thorace antico cinereo, lineis quatuor nigris; abdomine cyaneo, nitido; capite pallide cinereo; palpis rufis; alarum nervo transverso discoidali obliquo. — ♂ long. 12 mill.

Les yeux velus, la forme allongée du troisième article des antennes et les soies rigides de l'abdomen assignent à cette espèce

une place dans le genre *Hystricia*; les soies, cependant, ne sont ni aussi fortes ni aussi émoussées que dans *H. testacea* Macq.

Tête cendré pâle et soyeux; front un peu saillant, rétréci en arrière, à bande longitudinale noirâtre plus étroite que les côtés; soies frontales descendant en série simple jusqu'au second article des antennes; macrochètes orales assez éloignées de l'ouverture buccale; en dessus encore quelques soies moins fortes; menton large; occiput à poils touffus jaunâtres et de petites soies noires sur le bord des yeux. Yeux velus. Antennes noires; deuxième article à duvet blanc; troisième deux fois aussi long que le précédent. Suçoir d'un brun foncé; palpes fauves. Thorax d'un vert métallique, à duvet cendré et quatre bandes noires sur la moitié antérieure; côtés du thorax cendrés; écusson et abdomen d'un bleu d'acier foncé; l'abdomen ovalaire, à poils et macrochètes noires. Pieds noirs; côté extérieur des cuisses à reflets blanchâtres; macrochètes des pieds nombreuses, quelques-unes plus allongées au côté extérieur des jambes intermédiaires. Cuillerons d'un brun cendré. Ailes grisâtres; nervure transverse discoïdale oblique et un peu courbée inférieurement (dans *H. testacea*, elle est droite et presque perpendiculaire).

Un ♂ de Guanaxuato (E. Dugès).

10. *Calliphora floccosa* n. sp.

Capite, abdominis segmentis duobus primis, tibiis, tarsis alarumque basi testaceis; scutelli margine postico rufo; tibiis posticis hirsutis. — ♀ long. 9.5 mill.

Afin d'éviter l'établissement d'un nouveau genre, je range cette espèce provisoirement dans le genre *Calliphora*, dont elle reproduit les principaux caractères. Cependant la forme plus allongée et l'absence totale de reflets métalliques à l'abdomen, ainsi que la pilosité particulière des jambes postérieures, pourraient autoriser à la séparer génériquement.

Tête testacée, de la largeur du thorax; front aussi large que les yeux, avec quelques soies latérales; quatre macrochètes au bord du vertex; face à reflets blancs au côté des yeux; joues nues, menton étroit. Antennes plus courtes que l'épistome; les deux premiers articles et la base du troisième ferrugineux; ce dernier pour le reste d'un brun foncé; style roussâtre à la base, à longs poils. Palpes fauves, leur extrémité un peu élargie et garnie de petites soies noires. Thorax et écusson d'un brun grisâtre foncé; partie antérieure du thorax avec des vestiges de lignes longitudinales; épaules rougeâtres, ainsi que le bord postérieur de l'écusson. Abdomen elliptique, un peu plus long que le thorax; les deux

premiers segments testacés à bord postérieur noir; les autres noirs, à reflets blanchâtres surtout à la moitié antérieure des segments; ventre d'un brun rougeâtre. Pieds fauves à cuisses noires; jambes postérieures hérissées de longs poils au côté extérieur. Cuillerons et base des ailes testacés; le reste des ailes cendré; nervure discoïdale à coude arrondi; cellule apicale assez largement ouverte; nervure transverse médiane très oblique, située sous l'issue de la nervure subcostale et sur le milieu de la cellule discoïdale.

Deux exemplaires femelles de l'Afrique australe (de Selys-Fanson).


TRICYCLEA nov. gen. *Muscinarum*.

Parva, ovata; frons et carinæ faciales setulosæ; macrochetæ duo mystacinæ et nonnullæ supra verticem; oculi late remoti (♀), nudi; antennæ incumbentes, epistomate paullo breviores; articulo ultimo præcedente quadruplo longiori; seta dorsalis supra plumata, infra pilis paucis munita, apice nuda. Thorax latus, macrochetis pluribus munitus; abdomen breviter ovatum, subdepressum, inerme; segmentum primum brevissimum, unde segmenta tria sola conspicua. Pedes parce setulosæ. Alæ abdomine longiores; spinula costa parva; nervi cubitalis pars basalis setulosa; nervus discoïdalis arcuatim flexuosus; cellula apicalis aperta.

Corps assez petit, ovalaire, peu bombé, ferrugineux. Tête pressée contre le prothorax; front (♀) plus large que les yeux, avec des soies sur les côtés; vertex à macrochètes; épistome perpendiculaire; deux fortes macrochètes sur le bord oral et en dessus une rangée de petites soies sur les carènes faciales. Antennes un peu plus courtes que l'épistome; les deux premiers articles assez petits; troisième article quatre fois aussi long que le second; style largement plumeux en dessus, avec quelques soies en dessous, nu à l'extrémité. Suçoir épais; palpes cylindriques. Thorax plus large que long, muni de beaucoup de macrochètes. Abdomen large, ovalaire, un peu déprimé, à poils courts; composé, à ce qu'il paraît,




de trois segments, le premier segment étant excessivement court, peu distinct et caché sous l'écusson et les cuillerons. Pieds assez longs et forts, à soies éparses; les cuisses un peu épaissies. Cuillerons grands. Ailes plus longues que l'abdomen, avec une petite



épine costale; nervure cubitale hérissée de petites soies jusqu'à la nervure transverse médiane; sa dernière partie recourbée; cellule apicale entr'ouverte; nervure discoïdale à coude arrondi; nervure transverse médiane située sur le milieu de la cellule discoïdale; la nervure qui termine cette cellule, distinctement fléchie.

11. *Tricyclea ferruginea* n. sp.

Ferruginea; antennis, palpis pedibusque concoloribus; thorace vitta media nigricante; abdominis segmentis puncto fusco in marginis posterioris medio et utrinque linea fusca. — ♀ long. 5 mill.



Ferrugineuse, y compris les antennes, les parties buccales et les pieds; des reflets blancs aux joues et sur les côtés du front; un point brun sur le vertex. Partie antérieure du thorax à duvet blanc et des vestiges de bandes; une bande longitudinale noirâtre

plus distincte sur le dos. Abdomen un peu luisant; bord postérieur du deuxième segment (en apparence du premier) avec un point brun au milieu et une ligne brune de chaque côté; une peinture semblable se trouve au segment suivant, mais les lignes latérales sont un peu plus courtes; anus à deux points bruns. Cuillerons et base des ailes fauves; le reste des ailes grisâtre.

Un exemplaire femelle de l'Afrique australe (de Selys-Fanson).

12. *Epicausta* (1) *metallica* n. sp.

Nigro-corrulea, nitida; capite rufescente; epistomatis parte inferiori et vertice nigris, nitidis; pedibus nigris, femoribus anticis rufis; alis hyalinis, macula apicali fusca infra nervum discoidalem attingente. — ♀ long. 5.5 mill.

D'un noir bleuâtre métallique. Tête d'un rouge brunâtre; la partie inférieure de la face, y compris le labre, d'un noir luisant; cette couleur noire s'élève en forme de deux lignes le long des fosses antennales; de plus, le vertex est noir. Antennes d'un rouge brunâtre, au moins les deux premiers articles (le troisième manque). Thorax allongé; abdomen convexe, rétréci vers l'extrémité; tarière noire, large, de la longueur du quatrième segment. Pieds noirs; cuisses antérieures fauves. Balanciers blanchâtres. Ailes plus longues que l'abdomen, hyalines; une tache apicale triangulaire d'un brun foncé, ne dépassant pas la nervure discoidale; nervures auxiliaire et sous-costale situées tout près l'une de l'autre; nervure discoidale recourbée en haut à son extrémité, sa partie postérieure un peu plus longue que l'avant-dernière; nervure transverse médiane située sur le milieu de la cellule discoidale; la nervure qui termine cette cellule est convexe.

Un exemplaire femelle de l'Afrique australe (de Selys-Fanson).

13. *Epicausta nigra* n. sp.

Nigra; humeris abdominisque segmento ultimo subchalybeis; antennis maculaque in epistomate rufescentibus, femoribus anticis rufis; alis hyalinis, macula apicali fusca infra nervum discoidalem superante. — ♂ long. 7 mill.

Cette espèce ressemble à la précédente, mais elle est un peu plus grande et d'un noir luisant, sans reflets métalliques; seulement les tubercules huméraux et le dernier segment de l'abdomen offrent plus ou moins une teinte de bleu d'acier. Ce front est d'un noir opaque; le vertex et un espace semi-lunaire et convexe au-dessus de l'insertion des antennes sont d'un noir luisant; la face est noire, avec une tache ferrugineuse triangulaire; le labre d'un noir très luisant. Antennes d'un rouge brunâtre; le troisième article elliptique, à style nu, implanté près de la base. Thorax déprimé, à lignes longitudinales peu distinctes; dernier segment de l'abdomen tronqué obliquement et muni en dessous d'une paire d'appendices

(1) Voyez pour le genre *Epicausta*: Löw., *Monographs of the Diptera of North America*, Part. III, p. 46. Je soupçonne que les *Stenopterina femorata* Macq. et *immaculata* Macq., toutes deux de l'île Bourbon, sont aussi des *Epicausta*.

filiformes. Pieds, balanciers et ailes comme dans l'espèce précédente; seulement les ailes sont plus courtes que l'abdomen et la tache apicale dépasse un peu la nervure discoïdale.

Un ♂ de Zanzibar (Deville).

14. *Dacus ferrugineus* Fabr.

Musca ferruginea Fabr., Ent. Syst., IV, 342.127; *Dacus ferrugineus* Fabr., Syst. Antl., 274.5; Wied., Auss. Zweifl., II, 515.5; Macq., Dipt. exot., supp. 3.64; supp. 4.2; *Bactrocera maculipennis* Dol., Nat. Tijdschr. v. Ned. Ind., X, 412.36, pl. I, fig. 4; *Bactrocera conformis* Dol., l. c., XVII, 122.79.

Ardjoeno, Java (van Lansberge).

Les descriptions de Doleschall de la *Bactrocera maculipennis* et *B. conformis*, ainsi que la figure qu'il donne de la première, ne laissent aucun doute sur ces deux espèces : ce ne sont que des synonymes du *Dacus ferrugineus* Fabr. Quant à la *B. conformis*, cette synonymie est confirmée par un dessin inédit de l'auteur (1).

15. *Paracelyphus sumatrensis* n. sp.

Corpore laevi, toto violaceo nitido; antennis pedibusque nigris, tarsis pallidis. — (♂?) long. 6.5 mill.

D'un noir violet très luisant. Thorax et écusson sans sillons ni points enfoncés, à l'exception seulement des côtés de l'écusson; le thorax est plus large que long, antérieurement anguleux, à tubercules huméraux assez saillants. Le front et l'épistome sont d'un bleu d'acier; le dernier offre un sillon profond et en dessus de ce sillon, sous les antennes, il est un peu rougeâtre; le menton est testacé et assez large; l'occiput noir opaque. Antennes noires; le troisième article aplati, ovale, à peine deux fois aussi long que le précédent; style long et menu, non épaissi à la base; palpes noirs. Abdomen d'un noir métallique; ventre testacé. Pieds d'un noir métallique; les tarses fauve pâle, le dernier ou les deux derniers articles brunâtres. Ailes un peu brunâtres; la nervure qui termine la cellule discoïdale est fléchie (dans le *Celyphus oblectus*, elle est toute droite).

Le Musée de Bruxelles contient deux exemplaires rapportés

(1) Une série de dessins originaux, tous relatifs aux descriptions que Doleschall a publiées dans le XVII^e volume du *Natuurk. Tijdschrift voor Nederl. Indië*, se trouve dans la bibliothèque de M. J. Puls, à Gand, qui a eu la bienveillance de les prêter pour en faire deux copies. Une de ces copies fait partie de la bibliothèque de la Société Entomologique Néerlandaise à Leide; l'autre se trouve dans les mains de M. le baron Osten-Sacken à Heidelberg.

d'Atjeh à Sumatra par M. van Lansberge; deux autres, également de Sumatra, se trouvent dans ma collection.

Cette espèce diffère du *P. hyacinthus* Big. (*Revue et Mag. de Zool.*, 1859, p. 315, pl. XI, fig. 3) par la couleur noire des antennes; du reste, la structure de ces organes est exactement conforme à la description et à la figure que M. Bigot, l. c., en a données, et se distingue, en effet, de celle du *Celyphus oblectus* Dalm. au point de justifier l'établissement du genre *Paracelyphus*.

Le *P. sumatrensis* a des rapports avec le *Celyphus levis* van der Wulp (*Diptera Sumatra-expeditie*, p. 53, n° 1), qui probablement doit être rangé également dans le genre *Paracelyphus*; mais dans cette espèce, la tête, les antennes et les jambes sont ferrugineuses et le thorax est aussi large que long.

M. Eug. Simon adresse trois notes :

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE FAMILLE DE L'ORDRE DES ARANEÆ (BRADYSTICHIDÆ).

Les quelques espèces que nous décrivons ci-dessous ne peuvent rentrer dans aucune des familles actuellement admises dans l'ordre des *Araneæ*. Elles se rapprochent à la fois des *Drassidae* et des *Thomisidae* (principalement des *Stephanopsis*), elles tiennent aux premiers par la direction des pattes et leur proportion, la seconde paire étant beaucoup plus courte que la première et à peine égale à la quatrième, souvent même plus courte; leurs lames-maxillaires droites et sans impressions les rapprochent surtout des *Clubioninae*; ils en diffèrent néanmoins beaucoup par leurs yeux diurnes et homogènes, leur bandeau élevé et vertical, leurs filières disposées comme chez les *Thomisidae*. Ils s'éloignent de ces derniers, indépendamment de la proportion des pattes, par la disposition toute différente des pièces buccales, les denticulations de la rainure des chélicères, etc.

Les téguments des *Bradystichides* sont très épais et fortement coriacés; ceux de la face dorsale sont, de plus, rugueux et pourvus de côtes ou de tubercules; ils sont garnis soit de squames aplaties lancéolées, soit de poils épais recourbés ayant un aspect frisé; le plus souvent les poils frisés garnissent les parties saillantes, les côtes et les tubercules, tandis que les squames garnissent les dépressions; enfin il se mêle à cette épaisse vestiture des épines tronquées élevées sur de petites saillies et des épines larges et aplaties analogues à celles des *Oxyptila*.

Ces téguments rappellent beaucoup ceux de certains *Stephano-*

psis et surtout ceux des *Cryptothele* L. Koch, avec lesquels les *Bradystichides* ont une frappante ressemblance de facies; ils en diffèrent cependant grandement par le nombre des griffes tarsales, la structure des filières, l'armature des pattes, etc.

FAMILLE DES BRADYSTICHIDÆ.

Céphalothorax plus long que large, tronqué en arrière, atténué en avant, à front médiocre, tronqué ou obtus. Yeux huit, diurnes homogènes, peu inégaux. Bandeau large vertical. Chélicères robustes et verticales, crochet long, arqué, bord supérieur de la rainure pourvu de trois ou quatre dents fortes isolées, bord inférieur de deux ou trois petites. Pièce labiale parallèle, tronquée non rebordée. Lames-maxillaires droites non inclinées. Pattes 1, 4, 2, 3, ou 1, 2, 4, 3 très robustes, surtout les antérieures, pourvues d'épines; deux griffes pourvues de quelques dents isolées, accompagnées en dessous de fascicules de scopulas. Filières six, courtes, comme chez les *Thomisidæ*.

GENERA.

Oculi 4 antici æqui lineam rectam formantes. 4 postici lineam parum recurvam formantes. Pars labialis longior quam latior. Laminæ sat angustæ. Metatarsi pedum crassi et depressi.

BORBOROPACTUS.

Oculi 4 antici lineam valde procurvam, 4 postici lineam validissime recurvam formantes. Medii antici et postici majores quam laterales. Pars labialis latior quam longior. Laminæ latæ. Metatarsi pedum sat angusti atque fere cylindrici. BRADYSTICHUS.

GENUS BRADYSTICHUS nov. gen.

Céphalothorax peu élevé et fortement caniculé en arrière, abaissé presque verticalement au bord postérieur. Front assez large obtusément tronqué. Yeux quatre antérieurs en ligne très fortement courbée en arrière; médians plus gros et plus resserrés. Yeux quatre postérieurs en ligne très fortement courbée en avant en demi-ellipse; médians plus gros et resserrés, latéraux très largement séparés des médians placés aux angles frontaux sur la face externe de tubercules angulaires obtus. Plastron ovale, très large, non ou à peine atténué en avant. Pièce labiale convexe, plus large que longue, parallèle, obtusément tronquée, n'atteignant pas le milieu des lames. Lames droites, larges, obliquement tronquées et divergentes à l'angle supéro-interne. Pattes 1, 4, 2, 3, excessivement

robustes, mais avec les tarses et métatarses relativement grêles et presque cylindriques; patellas et tibias subanguleux. Téguments de la face dorsale très fortement coriacés, tuberculeux et mamelonnés.

SPECIES.

Sternum coxæ venterque fusca, fulvo alboque pilosa. Metatarsi crassi. Tibiæ utrinque aculeis claviformibus instructæ.

crispatus.

Sternum coxæque fusca rufo squamulata, abdomen infra nigrum albo marginatum et in medio quadripunctatum. Metatarsi sat graciles. Aculei tibiæ omnes acuti. . . . *calligaster.*

Bradystichus calligaster sp. nov.

♀) long. 11.5 mill.

Supra fusco opacus. Cephalothorax valde inæqualis et obsolete costatus, pilis fulvis hamatis parce vestitus, antice pone oculos squamulis rufis paucis et setis longis et acutis ornatus. Abdomen paulo longius quam latius, antice profunde emarginatum, postice sensim dilatatum et truncatum, valde plicatum et foveolatum, pilis fulvis crassis et hamatis vestitum. Sternum coxæque fusco rufescentia squamulis læte rufis ornata. Abdomen infra profunde nigrum, antice flavo in lateribus anguste albo marginatum, in medio punctis albis minutissimis quatuor ornatum. Pedes fusci crasse fulvo pilosi, femoribus, præsertim anticis, crassissimis et tuberculatis, spinis fulvis et truncatis armatis, patellis tibiisque supra costatis, tibiis I et II infra 4-4 longissime aculeatis, metatarsis longis et gracilibus infra 3-3 in lateralibus 3-3 aculeatis, aculeis cunctis acutis, metatarsis cunctis sat gracilibus supra pone apicem macula fusca in medio fulva minute squamulosa ornatis. Vulvæ area magna rotundata postice rufulo marginata, plaga media longitudinali antice olivacea postice nigra plicata et valde attenuata notata.

Nouvelle-Calédonie : Canala (coll. E. Simon, reçu de M. Bornier).

Bradystichus crispatus sp. nov.

♀) long. 8 mill.

Supra fusco opacus. Cephalothorax valde inæqualis et obsolete costatus fulvo crasse et parce pubescens, costis cephalicis et tuberculis oculiferis pilis albis hamatis ornatis. Abdomen paulo longius quam latius, antice truncatum, postice sensim dilatatum truncatum et obtuse emarginatum, valde plicatum et foveolatum, pilis albis et fulvis hamatis dense vestitum. Sternum coxæ venterque obscure fusca, crasse albo fulvoque pubescentia. Pedes fusci crasse fulvo alboque pilosi, femoribus crassissimis supra dilatatis

et valde tuberculatis, spinis fulvis crassis bacilliformibus ad apicem dilatatis instructis, patellis tibiisque supra costatis, tibiis I et II infra aculeis 3-3 acutis et utrinque pone medium aculeo claviformi et divaricato armatis, metatarsis I et II crassis et brevibus infra 3-3 in lateribus 2-2 aculeatis, metatarsis tarsisque cunctis supra macula nigra squamulata ornatis.

Nouvelle-Calédonie : Canala (coll. E. Simon, reçu de M. Bornier).

GENUS BORBOROPACTUS nov. gen.

Céphalothorax non canaliculé en arrière, élevé et abaissé verticalement au bord postérieur. Front assez étroit, tronqué. Yeux quatre antérieurs subégaux, en ligne presque droite; médians plus resserrés. Yeux quatre postérieurs subégaux en ligne à peine plus large, un peu arquée en avant; médians plus resserrés, latéraux élevés sur une saillie commune basse. Bandeau aussi large que l'aire oculaire, vertical, plan. Plastron ovale assez étroit, atténué en avant et en arrière. Pièce labiale grande, plus longue que large, parallèle, tronquée, dépassant le milieu des lames. Lames assez étroites, droites, presque parallèles, obtuses. Pattes I, 4, 2, 3, I plus longue et beaucoup plus robuste, II et IV subégales, tibias et métatarses anguleux en dessus, déprimés en dessous, I et II offrant en dessous deux séries continues de très fortes épines soulevées. Téguments fortement coriacés.

Borboropactus cinerascens Doleschall.

? *Thomisus cinerascens* Dolsch., Tweed. Bijdr. etc., in Acta Soc. Sc. Ind. Neerl., V, 1859, p. 58, pl. XII, fig. 11 (1).

♀ long. 8 mill.

Céphalothorax obscure fusco rufescens in medio late longitudinaliter infuscatus, coriaceus, pilis crassis subsquamiformibus albis in medio fulvis omnino obtectus, postice elevatus et bituberculatus tuberculo 1° minutissimo, 2° validiore et obtuso. Oculi antici æqui, intervallo mediorum diametro oculi latiore. Abdomen paulo longius quam latius, antice truncatum, postice paulo incrassatum et rotundatum, albo cinereo fulvoque squamulatum, spinis nigris claviformibus parce ornatum. Pedes fulvo fuscoque variegati postici subannulati, femore I intus incrassato spinis brevibus et acutis 4-5 instructo, patellis tibiis metatarsisque depressis supra subcostatis, tibia I 4-5, tibia II 3-3, metatarsis I et II 3-3 spinis validissimis et elevatis infra instructis.

Java (coll. E. Simon).

(1) Le *Thomisus vulcanicus* du même auteur, l. c., p. 57, pl. XIII, fig. 6, également de Java, rentre probablement aussi dans le genre *Borboropactus*.

Borboropactus bituberculatus sp. nov.

♀) long. 9.5 mill.

Cephalothorax obscure fuscus, pilis crassis et obtusis fulvo cinereis omnino obiectus, postice elevatus et bituberculatus, tuberculo 1^o minutissimo subobsoleto, 2^o validiore et obtuso. Oculi medii antici lateralibus paulo majores, intervallo mediorum diametro oculi vix latiore. Abdomen longius quam latius, antice recte truncatum, postice sensim incrassatum et truncatum, fuscum fulvo cinereo crasse et dense squamulatum, postice setis validis et longis albidis aculeis nigris clavatis paucis intermixtis parce ornatum. Pedes fuscii fulvo squamulati et pilosi, femore I in parte secunda validissime incrassato, in medio intus dilatato atque aculeis brevibus et acutis 3 vel 4 instructo, patellis tibiis metatarsisque depressis supra subangulatis; tibia I 5-5, tibia II 3-4, metatarsis I et II, 3-3 spinis validissimis et elevatis infra armatis. Area vulvæ plana elongata, in parte prima fulva fere parallela, in parte secunda paulo dilatata et ovata.

Molques : Ternate (coll. E. Simon); Nouvelle-Guinée : Dorey (coll. E. Simon).

Borboropactus squalidus sp. nov.

♀) long., 8 mill.

Cephalothorax obscure fuscus, coriaceus, pilis fulvo cinereis crassis omnino obiectus, postice elevatus et in medio obtuse tuberculatus. Oculi antici aequi, intervallo mediorum diametro oculi haud vel vix latiore. Abdomen paulo longius quam latius, antice obtuse emarginatum, postice sensim incrassatum et truncatum, fuscum, dense et minute cinereo squamulatum, postice spinis claviformibus fulvis brevibus paucis instructum. Pedes fuscii squamulosi, femoribus, præsertim anticis, ad basin dilutioribus, femore I in parte secunda validissime incrassato spinis validis sat brevibus et acutis ad basin tuberculatis 5 vel 7 intus instructo, patellis tibiis metatarsisque depressis supra subcostatis, tibiis I et II 4-5, metatarsis 3-3 spinis validissimis et elevatis infra armatis. Area vulvæ plana nigra, antice anguste parallela, postice abrupte dilatata et cordiformi.

Afrique australe : Zambèze (coll. E. Simon).

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE CRYPTOTHELE

L. KOCH.

Le genre *Cryptothele* ne renferme jusqu'ici que deux espèces : *C. verrucosa* L. Koch, *Ar. Austr.*, p. 240, pl. XX, fig. 2 des îles Samoa et de Nouvelle-Guinée et *C. ceylonica* Camb., *Proceed. Zool.*

Soc. Lond., 1877, p. 563, pl. LVI, fig. 3, de Ceylan, nous ajoutons une troisième espèce appartenant à la faune américaine.

Cryptothele cristata sp. nov.

♂ (pullus) long., 5 mill.

Cephalothorax antice valde attenuatus, obscure fuscus, rugosus parce flavo pilosus, pilis flavis crassis et divaricatis biserialim dispositis in medio cristam longitudinalem formantibus. Oculi fere ut in *C. verrucosa* sed medii postici a sese fere contigui et 4 antici trapezium antice multo latius dispositi. Abdomen breve antice paulo emarginatum, postice paulo dilatatum et truncatum, fuscum fulvo squamosum, spinis claviformibus fulvis fasciculatis parce ornatum. Pedes breves, fusci, metatarsis tarsisque dilutioribus et rufescentibus. Femoribus crassissimis, nodosis et subangulatis, tibiis ad basin valde inflatis infra deplanatis atque spinis claviformibus marginatis, metatarsis tarsisque gracilibus et acuminatis.

Mexique (coll. E. Simon).

NOTE SYNONYMIQUE SUR LES GENRES *PRODIDOMUS* HENTZ
ET *MILTIA* E. SIMON.

En étudiant avec soin la description et surtout les figures du genre *Prodidomus* de Hentz (in *Journ. Bost. Nat. Hist.*, t. V, 1847, et in *Occas. Pap. Bost. Soc.*, etc., 1875, p. 105), je suis arrivé à la conviction que ce genre est identique au genre *Miltia* E. Simon ; la description de Hentz est cependant incomplète, elle ne mentionne ni la structure remarquable des flières, ni la longueur insolite des trochanters de la quatrième paire, mais elle ne renferme rien qui ne convienne entièrement aux *Miltia*, et tous les doutes sont levés par l'examen des figures, principalement de celle des yeux (pl. XVIII, fig. 9), et de celle des chélicères (pl. XII, fig. 3). *P. rufus* Hentz, des États-Unis (Alabama), paraît voisin de *Miltia gulosa* E. Sim., de Nouvelle-Calédonie ; le nom de *Prodidomus* ayant la priorité, doit être restitué.

Le genre *Trochanteria* Karsch (*Zeitschr. f. d. Ges. Naturw.*, t. LI, 1879 ; p. 817, et *Id.*, t. LII, 1880 ; p. 526, pl. VII, fig. 3) nous paraît voisin des *Prodidomus* ; il en diffère cependant par les yeux en deux lignes transverses et la longueur encore plus exagérée des trochanters postérieurs.

Le groupe des *Prodidomides* renferme donc actuellement trois genres :

Prodidomus Hentz, 1847.

= *Miltia* E. Simon, 1868.

Zimiris E. Simon, 1882.

Trochanteria Karsch, 1878.

M. H. Donckier fait présenter le travail suivant :

Je compte présenter successivement à la Société Entomologique la liste des insectes appartenant aux différentes familles de Rhynchophores décrites postérieurement au catalogue de MM. Gemminger et von Harold. Je donne aujourd'hui les Brenthides. J'aurais pu y joindre les listes des Anthribides, Bruchides et Scolytides, qui sont prêtes; malheureusement pour moi, les Annales de la Société sont déjà tellement remplies, que je dois me borner à présenter l'énumération des insectes d'une seule famille.

Je désire remercier ici publiquement MM. Dohrn, Faust, Jekel, Kirsch, Pascoe, Preudhomme de Borre, Ritsema et Roelofs de l'aide qu'ils ont bien voulu me prêter, et sans laquelle jamais je n'aurais osé entreprendre ce long travail. Que tous ils veuillent bien accepter l'expression de ma reconnaissance.

LISTE DES BRENTHIDES

DÉCRITS POSTÉRIEUREMENT

AU CATALOGUE DE MM. GEMMINGER & VON HAROLD

par H. Donckier de Donceel.

Zemioses Pascoe.

cellis Lewis, Journ. of Linn. Soc., XVII, p. 296, Japon.
t. XII, fig. 1, 7 et 8.

Cyphagogus Parry.

Eichhorni Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., 1, Malacca.
p. 45 (21).

planifrons Kirsch, l. c., p. 46 (21). Malacca.

signipes Lewis, Journ. of Linn. Soc., XVII, Japon.
p. 297, t. XII, fig. 2, 3 et 4.

Anisognathus Lacordaire.

anaticeps Kolbe, Stett. Ent. Zeit., 1883, p. 235. Cuango.

Mechowi Kolbe, l. c., p. 234. —

Taphroderes Schönherr.

filiformis Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), Amazones.
X, 1872, p. 319.

obtus Pasc., l. c., p. 320. —

Aprostoma Guérin.

Auberti Fairm., Bull. Soc. Ent. France, 1882, Gabon.
p. xxx.

integriceps Fairm., l. c., p. xii.

Jonthocerus.

nigripes Lewis, Journ. of Linn. Soc., XVII, Japon.
p. 298, t. XII, fig. 5 et 6.

ophthalmicus Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist. Queensland.
(4), X, p. 320, t. XV, fig. 4.

Anchisteus Kolbe (nov. gen.).

Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 185.

peregrinus Kolbe, l. c., p. 186.

Madagascar.

Higonius Lewis (nov. gen.).

Journ. of Linn. Soc., XVII, p. 299.

cilo Lew., l. c., p. 300, fig. 9 et 10.

Japon.

cruæ Oliff., l. c., p. 300, note.

I. Andaman.

Poweri Lew., l. c., p. 299, note.

Penang.

Cerobates Schönherr.

australasiæ Fairm., Ann. Soc. Ent. France, Australie.
1881, p. 463.

vitiensis Fairm., Le Natur., III, p. 422; Ann. I. Fiji.
Soc. Ent. France, 1881, p. 463.

Stereodermus Lacordaire.

pilosus Kirsch, Deutsch. Ent. Zeit., 1875, Pérou.
p. 281.

Trachelizus Schönherr.

cylindriiformis Power, Not. Leyd. Mus., II, Sumatra.
p. 187.

Howitti Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), X, Melbourne.
p. 320.

Cordus Schönherr.

- acutipennis* Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 483. Australie.
elongatus Pow., l. c., p. 484. Sénégal.
latirostris Pow., l. c., p. 484. —
Pascoei Pow., l. c., p. 484. Australie.
puncticollis Pow., l. c., p. 484. Natal.
Schönherr Pow., l. c., p. 483. Australie.

Pericordus Kolbe (nov. gen.).

Stett. Ent. Zeit., 1883, p. 237.

- latipes* Kolbe, l. c., p. 238. Cuango.

Bothriorrhinus Fairmaire (nov. gen.).

Le Natur., III, p. 424; Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, 2, p. 42.

- costulipennis* Fairm., ll. cc. I. du Duc d'York.

Amorphocephalus Schönherr.

- Calvei* Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 485. Sénégal.
diadematus Pow., l. c., p. 486. —
Jickeli Schaufuss, Nunq. ot., II, p. 402, 1876; Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 487. Nubie.
lævis Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 486. Inde.
Mniszechi Pow., l. c., p. 487. Cap York.
senegalensis Pow., l. c., p. 486. Sénégal.
sulcicollis Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 321, t. XV, fig. 9a, 9b. O. Australie.
variolosus Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 485. Malacca.

Symmorphocerus Schönherr.

- Beloni* Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 488. Mossoul.
minutus Pow., l. c., p. 488. Nubie.
Piochardi Bedel, Soc. Ent. France, 1877, Bull., p. CLXXXIV. Syrie.
semipunctatus Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 321, t. XV, fig. 7. Natal.

Prophthalmus Lacordaire.

- Bourgeoisi* Pow., Soc. Ent. France, 1878, Bull., Ceylan.
p. xxxviii.
- brevis* Pow., l. c., p. xlv. Malacca.
- Delesserti* Pow., l. c., p. xxxvii. Indes or.
- obscurus* Pow., l. c., p. xlv. —
- planipennis* Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., Célèbes.
1872 (4), X, p. 322, t. XV, fig. 5.
- pugnator* Pow., Soc. Ent. France, 1878, Bull., Java.
p. xlv.
- sanguinalis* Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., Inde.
1872 (4), X, p. 322, t. XV, fig. 6.
- tricolor* Pow., Soc. Ent. France, 1878, Bull., Moluques.
p. xxxviii.

Baryrrhynchus Lacordaire.

- andamanicus* Pow., Pet. Nouv. Ent., II, 1^{er} fé- Andaman.
vrier 1879, p. 298.
- Deyrollei* Pow., l. c., p. 298. Menado.
- indocilis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, I. du Duc
2, p. 41. d'York.
- lineicollis* Pow., Pet. Nouv. Ent., II, 1^{er} février Moluques.
1879, p. 297.
- Poweri* Roelofs, Soc. Ent. Belg., XXII, Bull., Japon.
p. liv; Lew., Journ. of Linn. Soc., XVII,
p. 300, t. XII, fig. 11.
- rugosicollis* Pow., Pet. Nouv. Ent., II, 1^{er} février Malacca.
1879, p. 298.

Agriorrhynchus Power (nov. gen.).

Pet. Nouv. Ent., II, 1^{er} juillet 1878, p. 244.

- Borrei* Pow., l. c. Java.
- undulatus* Pow., l. c. Malacca.

Debora Power (nov. gen.).

Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 490.

- Bocandei* Pow., l. c. Guinée.
- Thomsoni* Pow., l. c., p. 491. —

Spatherinus Power (nov. gen.).

Ann. Soc. Ent. France, 1878, p. 493.

- gabonicus* Thoms., Archiv. Ent., II, 1858, p. 116 Gabon.
 (sub *Arrhenodes*).
medioximus Thoms., l. c., p. 117 (sub *Arrhenodes*). —
opacus Thoms., l. c., p. 116 (sub *Arrhenodes*). —

Eupsalis Lacordaire.

- forficata* Thoms., Archiv. Ent., II, 1858, p. 118 Gabon.
 (sub *Arrhenodes*).
gentilis Thoms., l. c., p. 117 (sub *Arrhenodes*). —
Lecomtei Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, Amérique bor.
 p. 494.
promissa Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872, Moluques,
 (4), X, p. 323, t. XV, fig. 8. Nouv.-Guinée.
Reichei Fairm., Ann. Soc. Ent. France, 1859, Palestine.
 Bull., p. 164 (sub *Arrhenodes*).
sycomori Atkinson, i. litt. —
Sallei Pow., Ann. Soc. Ent. France, 1878, Amérique bor.
 p. 494.
sub maculata Kolbe, Stett. Ent. Zeit., 1883, Cuango.
 p. 238.
truncata Bohem., Nouv. Mém. Mosc., I, 1829, Bengale.
 p. 103; Schh. Gen. Curc., I, p. 326; V,
 p. 479 (sub *Baryrrhynchus*).

Stratiorrhina Pascoe (nov. gen.).

Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 322.

- Pascoei* Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 48 Malacca.
 (24).
Xiphias Westw., The Cabin. of Or. Ent., 1848, Penang.
 t. XV, fig. 1 ♂ (sub *Estenorrhinus*).

Episphales Kirsch.

- interruptolineatus* Gylh., Schh. Gen. Curc., V, Mexique.
 p. 477 (sub *Arrhenodes*).
Lacordairei Pow., Pet. Nouv. Ent., II, 1^{er} juillet —
 1878, p. 241.

Orychodes Pascoe.

- digramma* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, I. du Duc
2, p. 43. d'York.
indus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 51 Siam.
(27), note.
insignis Lew., Journ. Lin. Soc., XVII, p. 301, Japon.
t. XII, fig. 12.
lincolatus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 49 Malacca.
(25).
splendens Kirsch, l. c., p. 50 (26), note. Philippines.
striolatus Kirsch, l. c., p. 51 (27). —

Anomobrenthus Fairmaire (nov. gen.).

Le Natur., III, p. 349; Ann. Soc. Ent. France, 1881, p. 464.

- hamatirostris* Fairm., ll. cc., p. 349 et 465. Fiji.

Megacerus Montrouzier.

- Badeni* Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 48 Philippines,
(24), note. Moluques.
conciliator Kirsch, l. c., p. 46 (22). Malacca.
granulirostris Gestro, Ann. Mus. Genov., VIII, Halmahira.
p. 519.
pogonocerus Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., I. du Duc
XXVII, 2, p. 43. d'York.
pterygorhinus Gestro, Ann. Mus. Genov., VIII, Somerset.
p. 519.
pubescens Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 47 Malacca.
(23) = *spathulirostris* du Cat. Gemminger
et Harold, p. 2710.
pulchellus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, Moluques.
p. 49 (25), note.
ruficauda H. W. Bates, Proc. Zool. Soc., 1877, I. du Duc
p. 156, t. XXV, fig. 5. d'York.
spinipennis Fairm., Le Natur., III, p. 349. —

Blysmia Pascoe (nov. gen.).

Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 323.

- ruficollis* Pasc., l. c., p. 324, t. XV, fig. 1. Batchian.

Eutrachelus Latreille.

sumatrensis Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond., Sumatra.
1881, p. 489.

Brenthus Fabricius.

lucanus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc., IV, Californie.
p. 129.

peninsularis Horn, l. c., p. 128. —

Ceocephalus Schönherr.

Georgi Karsch, Sitzungsab. Gesellsch. Naturforsch. Freunde, Berlin, 1881, p. 61. Guinée.

internatus Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., Queensland.
1872 (4), X, p. 324.

tenuilarsis Pasc., l. c., p. 324. Sydney.

Centrophorus Chevrolat.

aneolus Kolbe, Stettin. Ent. Zeit., 1883, p. 387. Madagascar.

assiduus Kolbe, l. c., p. 382. —

dives Lacord.,
var. *cylindricus* Kolbe, l. c., p. 388. —

var. *striatopunctatus* Kolbe, l. c., p. 388. —

rectirostris Kolbe, l. c., p. 385. Madagascar.

validirostris Kolbe, l. c., p. 383. —

Schizotrachelus Lacordaire.

Schmeltzi Fairm., Le Natur., III, p. 421; Ann. I. du Duc
Soc. Ent. Belg., XXVII, 2, p. 44. d'York.

Eubactrus Lacordaire.

fuscojanthinus Fairm., Le Natur., 1881, III, Fiji.
p. 373; Ann. Soc. Ent. France, 1881,
p. 461.

metallicollis Fairm., ll. cc., p. 421 et 462. —

spissicornis Fairm., Le Natur., 1881, III, p. 373; I. du Duc
Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, 2, p. 44. d'York.

Bolbogaster Lacordaire.

hebridarum Fairm., Pet. Nouv., II, p. 282. Nouv.-Hébrides.

Leptorrhynchus Guérin.

nigrosulcatus Fairm., Le Natur., III, 1881, Fiji.
p. 421; Ann. Soc. Ent. France, 1881, p. 462.

Achrionata Pascoe (nov. gen.).

Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 325.

bilineata Pasc., l. c., p. 325, t. XV, fig. 4. Sarawak.

Phocylides Pascoe (nov. gen.).

Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872 (4), X, p. 324.

bicolor Guér., voy. Coquille, p. 109, t. VI, fig. 11; Dorey.
Boisd., voy. Astrol., II, p. 312 (sub. *Lep-
torrhynchus*).

collaris Pasc., Ann. and Mag. Nat. Hist., 1872, Batchian.
(4), X, p. 325, t. XV, fig. 2.

ebeninus Pasc., l. c., p. 325. Amboine.

Diurus Pascoe.

antennatus Ritsema, Not. Leyd. Mus., IV, p. 214. Java.

erythropus Ritsema, l. c., p. 210. Sumatra.

tarsatus Ritsema, l. c., p. 212. Borneo.

M. Duvivier demande ensuite la parole pour donner lecture du travail suivant :

DESCRIPTION DE QUELQUES PHYTOPHAGES NOUVEAUX

ET NOTES RECTIFICATIVES.

par **A. Duvivier.**

FAM. CRIOCERIDÆ.

G. CRIOCERIS GEOFFR.

Crioceris chamelus n. sp.

Voisin de C. dromedarius Baly et C. gibba Baly. Brièvement oblong, convexe, d'un fauve brunâtre, brillant. Yeux et ongles

des tarses noirs (ces derniers très longs). Antennes (sauf les quatre premiers articles), dessous et base des fémurs postérieurs d'un brun de poix très clair. Élytres testacées avec le tiers postérieur rembruni, marquées de profondes fossettes, à région scutellaire très relevée. Pronotum très allongé, étroit, antennes robustes.

Long. 9 mill. — Australie.

Corps brièvement oblong, convexe, d'un fauve brunâtre variable, très brillant. Parties de la bouche d'un brun de poix foncé, labre testacé; tête d'un testacé rougeâtre plus foncé sur le vertex, terminée en avant par un museau subquadrangulaire, marquée en arrière de trois sillons très profonds; yeux subglobuleux, très saillants, profondément échancrés du côté interne, noirs; les deux sillons latéraux et l'échancrure des yeux sont couverts d'une pubescence jaune assez brillante; antennes de la moitié de la longueur du corps, très robustes, d'un brun de poix foncé (sauf les quatre premiers articles, qui sont d'un testacé rougeâtre et brillant), à premier article subglobuleux, renflé, 2-4 submoniliformes, courts, 5-11 subquadrangulaires, mats, très élargis et comprimés. Prothorax convexe, subcylindrique, très allongé, très étroit antérieurement, impressionné sur les côtés un peu au delà du milieu, à surface irrégulière, testacé, lisse, brillant; écusson en triangle allongé, d'un testacé rougeâtre. Élytres beaucoup plus larges que le corselet, courtes, subparallèles, à région scutellaire très fortement relevée, très brillantes, testacées, d'un brun de poix au tiers postérieur, impressionnées en dedans des épaules, qui sont saillantes, marquées chacune de dix rangées de points enfoncés, visibles seulement à la loupe, et ornées en outre de fossettes profondes, confusément distribuées vers l'angle apical, le long du bord latéral, près de l'écusson et autour de la gibbosité juxta-scutellaire. Dessous d'un brun de poix clair, hanches testacées, segments de l'abdomen ornés sur les côtés de grandes taches presque noires; cuisses testacées grossissant et rembrunissant graduellement de la première paire à la dernière, très étroites à leur base, très renflées à leur extrémité; tibias testacés, les quatre postérieurs arqués; cuisses de la même paire un peu plus courtes que l'abdomen, tarses testacés, terminés par des crochets noirs très longs et très robustes.

Cette espèce, très voisine des *C. dromedarius* Baly et *C. gibba* Baly, s'en distingue aisément par sa coloration, la disposition des fossettes de ses élytres, la longueur relative de son corselet, etc.

FAM. GALERUCIDÆ.

SUB FAM. : HALTICINÆ.

G. NOTOZONA CLARK.

Notozona guatemalensis n. sp.

Oblong-ovalaire, convexe, testacé, assez brillant. Yeux, antennes (la base exceptée), tibias, tarses, cinq taches (2, 2, 1) sur chaque élytre, noirs; corselet, tête, parapleures métasternales et fémurs rouges; élytres marquées de stries ponctuées geminées.

Long. 8 mill. — Guatémala.

Corps en ovale allongé, convexe, testacé, assez brillant. Tête rouge avec les parties de la bouche plus pâles et l'extrémité des mandibules noire; front impressionné entre les yeux, qui sont ovales, très allongés, noirs et entourés d'une ponctuation assez dense; antennes de la moitié de la longueur du corps, à articles 1-4 et une partie de 5 testacés (1 et 4 avec le dessus noir), les suivants tout à fait noirs: 1 courbé et renflé, 2 plus court, oblong, 3-4 sub-égaux, un peu plus longs, 5 égal à 1, tous deux plus longs que les autres, les derniers plus courts et légèrement dilatés. Prothorax $2\frac{1}{3}$ fois aussi large que long, à angles antérieurs saillants et un peu en dehors, les postérieurs arrondis; surface convexe, très brillante, finement ponctuée, rouge avec les côtés bordés de testacé; écusson en triangle curviligne arrondi au sommet, testacé. Élytres un peu plus larges que le corselet, convexes, finement rebordées, oblongues-ovales, marquées de dix séries geminées de points enfoncés, à intervalles plans et très légèrement ridés transversalement, d'un testacé jaunâtre, ornées chacune de cinq taches noires, une près de l'écusson, grande, arrondie, une seconde allongée, sur le calus huméral, deux taches transversales occupant le milieu de chaque élytre, et une cinquième, la plus grande, ronde, placée un peu avant le sommet; épipleures d'un testacé jaunâtre. Dessous très pubescent, testacé, avec les fémurs et les parapleures métasternales rouges, le métasternum rougeâtre, les tibias et les tarses noirs; crochets tarsiens bifides.

Cette belle espèce est voisine de *N. histrionica* Baly; elle en diffère par la ponctuation sériale geminée des élytres, par son corselet moins transversal, à côtés plus régulièrement arqués, par sa forme plus allongée, moins robuste, par sa taille plus petite et sa coloration.

SUB FAM. : GALERUCINÆ.

G. AULACOPHORA CHVT.

Parmi les noms employés par le Dr Chapuis dans son travail : *Diagnoses des espèces du genre Aulacophora recueillies aux îles Philippines par le Dr Sempér* (Bull. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. xcix), il s'en trouve quelques-uns qui font double emploi et que je propose de remplacer par les suivants :

A. Chapuisi pour

flavescens Chp., Bull. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. c.

A. smaragdipennis pour

viridipennis Chp., l. c., p. c.

A. cinctipennis pour

limbata Chp., l. c., p. c.

A. philippinensis pour

nigripennis Chp., l. c., p. ci.

G. LAETANA BALY.

Laetana pallida n. sp.

Allongé, testacé, convexe; articles des antennes (les deux premiers exceptés), yeux, palpes maxillaires, extrémité des mandibules, genoux, tibias et tarses noirs.

Long. 7 1/2 mill. — Port Natal.

♂. Corps allongé, légèrement dilaté en arrière, convexe, d'un testacé pâle, un peu rougeâtre sur le corselet. Bouche testacée, sauf l'extrémité des mandibules, qui est d'un noir brillant, et les palpes maxillaires, qui sont noirâtres; yeux noirs, arrondis; antennes presque aussi longues que le corps chez le mâle (la femelle me manque), noires, avec les deux premiers articles testacés ainsi que le troisième en dessous; les articles 3-7 sont larges et comprimés (3-4 triangulaires, 5-7 subquadrangulaires), les suivants très étroits, subcylindriques. Pronotum à peine une demi-fois plus large que long, d'une teinte un peu plus rougeâtre que les autres parties du corps, à surface convexe, bi-impressionnée, couverte d'une très fine ponctuation; les bords antérieur et postérieur presque parallèles, les côtés arrondis; écusson triangulaire, testacé. Élytres un peu plus larges que le corselet, légèrement dilatées vers l'extrémité, convexes, testacées, densément ponctuées, marquées vers le tiers antérieur d'une légère dépression déterminant une légère

gibbosité de la région juxta-scutellaire; épipleures très courtes et très étroites. Dessous et pattes d'un testacé pâle, sauf les genoux et les tarses, qui sont noirs, et les tibias, noirâtres; poitrine légèrement rembrunie; dernier segment de l'abdomen marqué d'une fossette arrondie.

Un exemplaire ♂ provenant de Port Natal.

Cette espèce diffère de *L. histrio* Baly par sa taille plus petite, moins robuste, par sa coloration, sa gibbosité juxta-scutellaire, par les angles du corselet, qui sont moins saillants.

G. MALACOSOMA CHVT.

Le *Calomicrus flaviventris* Mots., indiqué par M. Baly comme devant appartenir au genre *Monolepta* Er., dans lequel il est inscrit au *Cat. Gem. Har.*, XII, p. 3594, appartient, suivant M. Harold (*Deut. Ent. Zeit.*, 1877, p. 366), au genre *Malacosoma* Chvt.

Le *Malacosoma flaviventre* Baly (*Cist. Ent.*, II, p. 379) fait donc double emploi, et je propose de changer ce dernier nom en celui de **M. Balyi**.

G. PROCALUS CLARK.

Procalus viridis Philipp.

Cet insecte, décrit par Philippi dans la *Stett. Ent. Zeit.*, 1864, p. 393, et classé dans le *Cat. Gem. Har.*, XII, p. 3582, parmi le genre *Calomera* Chvt., appartient au genre *Procalus* Clark. Son prosternum distinct entre les hanches, ses antennes à articles basilaires comprimés, son écusson en triangle équilatéral, et le manque de sillon à la partie externe des tibias, sont, me semble-t-il, des caractères suffisants pour nécessiter ce transfert.

G. MOMÆA BALY.

Momæa gracilis n. sp.

Allongé, testacé, assez brillant: bouche, antennes, yeux, métasternum et pattes noirs: élytres profondément et densément ponctués, d'un violet brillant, avec les épipleures d'un noir verdâtre.

Long. 8 1/2 mill. — Nouv.-Guinée.

Corps allongé, subparallèle, testacé, brillant. Parties de la bouche d'un noir brillant; tête testacée, légèrement sillonnée sur le vertex, ainsi que sur le front entre les antennes. Ces dernières de la longueur du corps, filiformes, grêles, noires avec l'extrémité du dernier article testacée et le dessous des articles 1-2 rougeâtre. Prothorax 1 1/2 fois aussi large que long, testacé, assez

brillant, à côtés dilatés en avant, sinués en arrière, marqué de deux impressions latérales obliques et d'une fossette longitudinale, occupant presque toute la largeur du corselet en son milieu; angles assez saillants, occupés par un petit tubercule sétifère; surface éparsément ponctuée; écusson subquadrangulaire, testacé. Élytres une fois aussi larges que le corselet à la base, légèrement dilatées vers le tiers postérieur, d'un beau violet pourpre brillant, à surface diversement impressionnée, couverte d'une ponctuation dense et profonde, plus faible au sommet; épipleures allongées, d'un noir verdâtre. Dessous testacé, avec le métasternum noir; parapleures métasternales finement ridées et couvertes de points pilifères; pattes allongées, grêles, d'un noir brillant; crochets tarsiens bifides, tibias bisillonnés en dehors.

La taille plus petite, la forme plus grêle, le prothorax moins transversal, les antennes plus longues, la coloration générale séparent cette espèce de *M. viridipennis* Baly.

G. MENIPPUS CLARK.

Menippus viridis n. sp.

Oblong, convexe, ponctué, revêtu d'une pubescence veloutée, d'un testacé brunâtre, avec les mandibules et les yeux noirs; antennes brunes. Tête, corselet, élytres, genoux, tibias et tarses d'un vert métallique foncé.

Long. 8 à 9 1/2 mill. — I. Philippines.

Corps oblong, convexe, revêtu d'une pubescence veloutée et dorée, très courte. Bouche et front testacés, sauf une tache noire entourant la base des antennes. Tête d'un vert métallique foncé, sauf le pourtour des yeux en arrière, qui est testacé; yeux noirs, tachetés de roux; antennes dépassant un peu la moitié de la longueur du corps, à derniers articles atténués, brunes avec la base plus claire et le dessus orné d'un reflet métallique. Pronotum irrégulièrement convexe, d'un vert métallique, bordé de rougeâtre, ponctué et revêtu d'une pubescence dorée, transversal, deux fois aussi large que long, à côtés s'élargissant jusque vers le milieu, puis se rétrécissant brusquement vers la base; écusson rougeâtre, densément pubescent. Élytres un peu plus larges que le corselet, à pubescence veloutée, subparallèles, convexes, rugueusement ponctuées, de la même couleur que le corselet; épipleures brunâtres. Dessous brunâtre, pubescent, avec les cuisses plus claires, les genoux, les tibias et les tarses de la même nuance métallique que le dessus.

Cette espèce se reconnaît aisément à sa coloration, à sa forme plus parallèle, plus courte et à sa pubescence veloutée.

G. BUPHONIDA Baly.

Buphonida punctata n. sp.

Oblong, peu convexe, flave, pubescent; antennes (sauf leur base), tibias et tarses fortement rembrunis; tête noire, ainsi que les yeux; élytres fortement ponctuées, d'un brun grisâtre comme le disque du corselet.

Long. 6 1/2 mill. — Océanie.

Corps oblong, presque parallèle, peu convexe, flave. Parties de la bouche (sauf les mandibules, qui sont noires), labre et front testacés, ces derniers légèrement rembrunis; tête noire en dessus, rugueusement ponctuée, couverte d'une pubescence grisâtre couchée, avec une impression arrondie sur le vertex et une ligne médiane assez marquée; yeux noirs; antennes dépassant la moitié de la longueur du corps, filiformes, brunâtres, sauf la base des articles, qui est jaune. Pronotum fortement transversal, à bords subparallèles, un peu convexe en avant, marqué sur les côtés de deux larges impressions obliques qui font paraître les angles relevés, couvert d'une ponctuation assez dense et d'une pubescence roussâtre couchée, d'une teinte brunâtre avec le pourtour jaunâtre. Élytres à peine plus larges que le corselet, subparallèles, peu convexes, couvertes d'une ponctuation forte et dense, rugueuse, et d'une pubescence grisâtre et couchée; épipleures d'une nuance plus claire. Dessous flave, pubescent; pattes jaunâtres, sauf les 2-3 supérieurs des tibias, qui sont brunâtres, ainsi que les tarses.

Très distincte de *B. exanida* Baly par ses divers caractères.

G. PSEUDAPLOSONYX n. g.

Voisin du genre *Haplosonyx* Chvt. Forme oblongue, robuste. Tête forte, oblongue, dégagée du prothorax, front peu convexe; palpes maxillaires à 3^e article fortement renflé, obconique, 4^e aussi large que le 3^e, de moitié moins long, de forme semi-globuleuse. Yeux subovalaires, assez convexes. Antennes filiformes, assez robustes, atteignant les deux tiers chez le ♂, la moitié de la longueur du corps chez la ♀, à 1^{er} article renflé, le 2^e très court, obconique, le 3^e un peu plus long que le 1^{er} et égal au 5^e, les 2-3 réunis de même longueur que le 4^e, les suivants diminuant graduellement de longueur. Prothorax deux fois aussi large

que long, à bord antérieur légèrement échancré en arc de cercle; le postérieur arrondi et subsinué, les côtes droits à la base, un peu élargis au milieu, puis brusquement rétrécis vers le sommet; les angles antérieurs sont obtus, légèrement renflés, et les postérieurs, aigus et saillants: surface peu convexe, aplanie en arrière, marquée en son milieu d'un sillon transversal assez large, moins profond à son centre; densément ponctuée; écusson en triangle allongé, arrondi au sommet. Élytres assez larges, à côtés parallèles, impressionnées en dedans des épaules et vers la partie discoïdale en avant du milieu, confusément ponctuées, couvertes d'une longue pubescence hérissée, très dense; épipleures assez larges se prolongeant jusqu'à l'angle apical. Prosternum très étroit et invisible entre les hanches; cavités cotyloïdes complètes: parapleures métasternales larges et brusquement rétrécies. Pattes assez fortes, allongées, tibias subcylindriques, les intermédiaires et les postérieurs armés d'une épine; 1^{er} article des tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis; crochets tarsiens appendiculés et divariqués. — Type: *P. cœruleipennis*.

Ce genre vient se placer à côté du genre *Haplosomyx* Chvt. Le faciès est le même; les différences existent dans la forme des palpes maxillaires et dans la pubescence hérissée dont sont couvertes les élytres. J'ai cru que ce dernier caractère, qui, parmi les Galérucides, ne se rencontre, à ma connaissance, que dans le genre *Goniopleura* Westw., était suffisant pour séparer cette espèce du genre *Haplosomyx*, auquel je la rapportais tout d'abord.

***Pseudaplosomyx cœruleipennis* n. sp.**

Oblong, testacé, convexe. Corcelet et élytres fortement ponctués, ces dernières d'un bleu violacé et couvertes d'une longue pubescence roussâtre hérissée.

Long. 9 1/2 à 11 mill. — Sumatra.

Corps oblong, subparallèle, convexe, entièrement testacé. Extrémité des mandibules rembrunie; tête marquée, derrière la base des antennes, d'une fossette arrondie dont les bords sont légèrement et finement ridés. Corcelet transversal, profondément et con-

lusément ponctué, avec des parties plus lisses sur le disque et aux extrémités du sillon transversal, orné de quelques soies sur la bordure latérale; écusson convexe, testacé. Élytres bleues, à reflets violacés, à côtés parallèles, couvertes d'une pubescence roussâtre assez longue et hérissée. Dessous et pattes testacés, avec les crochets tarsiens plus obscurs.

2 ex. provenant de l'île de Sumatra.

G. EMATHEA BALY.

Emathea Jacobyi n. sp.

Ovalaire, convexe, d'un rouge clair et brillant, avec les antennes, les tibias et les tarses plus clairs; tête et yeux noirs. Élytres ponctuées, noires, avec la base, le sommet et une large fascie, au milieu, n'atteignant ni la suture, ni la marge de l'élytre, rouges.

Long. 6 mill. — Java.

Corps ovalaire, convexe, de forme moins robuste et plus allongée que *E. concipennis* Baly, et entièrement d'un rouge clair et brillant, avec le dessous recouvert d'une pubescence courte et roussâtre. Tête et yeux noirs, parties de la bouche rougeâtres; antennes testacées, à premier article rembruni, légèrement dilatées en leur milieu, à article 3 une demi-fois plus long que le 2^e. Prothorax transversal, 2 1/2 fois aussi large que long, médiocrement convexe, rouge, brillant, très finement et éparsément ponctué, marqué de quelques gros points enfoncés vers les angles antérieurs, qui sont obtus et fortement avancés; les angles postérieurs saillants; écusson triangulaire, rouge, lisse. Élytres un peu plus larges que le corselet, convexes, dilatées en arrière, à épaules saillantes dont le contour est déterminé par quelques gros points enfoncés; à ponctuation confuse, forte et dense, plus fine autour de l'écusson et sur les épaules; d'un beau noir brillant, sauf la base et le sommet, qui sont rouges, ainsi qu'une fascie large, de même couleur, parfois plus claire, n'atteignant ni la suture ni la bordure marginale; épipleures rouges. Dessous et pattes rouges, avec les tibias et les tarses plus clairs, recouverts d'une pubescence roussâtre, courte.

Par sa forme assez robuste, son corselet fortement transversal, ses antennes légèrement renflées en leur milieu, son prosternum assez large, cette espèce me paraît devoir se ranger dans le genre *Emathea*.

G. PLATYXANTHA BALY.

Platyxantha basalis n. sp.

Allongé, d'un testacé jaunâtre; yeux noirs, corselet oblique-

ment bi-impressionné; élytres rougeâtres sur le tiers antérieur, d'un noir mat sur les deux tiers postérieurs.

Long. 7 1/2 mill. — Manille.

Corps allongé, à peine dilaté vers le sommet, d'un testacé jaunâtre. Extrémité des mandibules d'un noir brillant; carènes frontales peu saillantes; yeux très gros, hémisphériques, noirs; antennes à 2^e article très court, d'un testacé pâle. Prothorax subquadrangulaire, légèrement élargi en avant, médiocrement convexe, obliquement et largement bi-impressionné, lisse, à angles antérieurs un peu renflés; écusson en triangle arrondi au sommet. Élytres un peu plus larges que le corselet, déprimées en dessus, à peine dilatées vers le sommet, très finement ponctuées, ayant quelques points plus visibles en avant le long de la suture; d'un testacé rougeâtre sur le tiers antérieur, d'un noir mat sur les deux autres tiers; épipleures rouges en avant, noires en arrière. Dessous et pattes d'un testacé jaunâtre, pubescents, avec les crochets tarsiens rembrunis.

Un seul exemplaire ♀ provenant de Manille. Reconnaissable à ses antennes filiformes, sans un seul article de forme anormale.

Platyxantha rubripennis n. sp.

Allongé, d'un testacé jaunâtre avec l'abdomen rembruni; yeux noirs; carène frontale très saillante; élytres visiblement ponctuées, d'un rouge vermillonné clair, avec la base d'un testacé pâle.

Long., 8 mill. — Borneo.

Corps allongé, subparallèle, déprimé en dessus, d'un testacé jaunâtre. Extrémité des mandibules d'un noir brillant; yeux noirs; carène frontale très saillante, surmontée d'une petite touffe de poils blancs; antennes à 2^e article très court: l'article 1 testacé, 2-5 rougeâtres, les suivants blanchâtres, le dernier acuminé. Prothorax subquadrangulaire, convexe, visiblement ponctué à impressions latérales se joignant pour former un sillon transversal large, testacé et orné de deux petites taches linéaires rougeâtres au milieu et au-dessus du sillon. Élytres un peu plus larges que le corselet, visiblement ponctuées, plus fortement le long de la suture, d'un rouge vermillonné clair avec la base d'un testacé pâle. Dessous pubescent, d'un testacé pâle avec la poitrine légèrement rougeâtre et l'abdomen rembruni.

Un seul exemplaire ♀ à antennes filiformes, provenant de l'île Borneo.

Cette espèce à carène frontale saillante, à ponctuation visible sur le corselet et les élytres, à région scutellaire moins convexe, de forme plus parallèle, se distingue par ces caractères de l'espèce précédente.

G. DORIDEA BALY.

Doridea? smaragdina n. sp.

Allongé, subparallèle, d'un vert émeraude brillant en dessus, d'un beau bleu violacé en dessous; tête noire en dessus; bouche, antennes, hanches et pattes d'un testacé livide; élytres fortement et subsérialement ponctuées, ornées de côtes longitudinales obtuses.

Long. 7 1/2 mill. — Sarawak.

Allongé, à peine dilaté en arrière, très brillant. Parties de la bouche et labre testacés; tête noire à carène frontale bien marquée; antennes à 2^e article très court, testacées, sauf les articles 2-3, qui sont rembrunis. Prothorax subquadrangulaire finement ponctué, convexe, marqué de deux impressions arrondies, au fond desquelles se trouvent quelques gros points enfoncés, d'un beau vert légèrement bleuâtre; écusson de même couleur que le corselet. Élytres un peu plus larges que le corselet, subparallèles, d'un vert émeraude brillant, bleuâtre sur la bordure, ornées de nombreuses côtes longitudinales peu élevées, et dont les intervalles sont couverts d'une ponctuation dense et profonde, finement ridées transversalement; épipleures de même couleur, ridées, larges jusque vers les 2/3 de leur longueur. Dessous d'un bleu violacé, verdâtre sur la poitrine, avec les hanches et les pattes d'un testacé livide; tibias antérieurs rembrunis.

Un exemplaire ♀ capturé à Sarawak.

L'absence du mâle ne me permet pas d'affirmer que cette espèce appartienne au genre *Doridea*; ses épipleures longues et larges, sa ponctuation subsériale, ses vestiges de côtes l'y rapportent, tandis que sa forme subparallèle, son corselet subquadrangulaire la classent parmi les *Platygantha*. La disposition des articles anormaux du ♂ peut seule élucider cette question.

M. Dietz adresse la communication suivante :

J'ai dit dans ma note publiée au Compte-rendu précédent que j'avais demandé une explication aux auteurs du *Catalogus Coleopt. Europ.*, etc. Je m'étais adressé avec raison à M. von Heyden, pensant que c'était lui qui avait rédigé cette partie du Catalogue. Il vient de me répondre que ma lettre ne lui est parvenue que ces derniers jours, étant nommé commissaire du gouvernement pour la destruction du Phylloxera et absent de chez lui, qu'il n'a donc pas à sa disposition sa collection ni sa bibliothèque et qu'il me répond seulement de mémoire. Voici en note le passage de sa lettre

concernant la *Cicindela maritima* (1). Il ressort de cette lettre :

1^o Qu'il n'a jamais été fait de distinction entre la *maritima* du littoral de la Baltique et celle du littoral français, belge ou hollandais, qui est et reste la véritable *maritima* Dejean, qu'elle soit grande ou petite ;

2^o Que la *maritima*, variété d'*hybrida*, s'applique à des individus que des auteurs russes ont rencontrée dans l'intérieur et qu'ils ont cru pouvoir rattacher à la véritable *maritima*, mais bien à tort (la *maritima* citée de l'intérieur de la Sibérie par Schaum, *Naturg. d. Ins. D.*, p. 26, d'après Gebler, serait donc dans ce cas).

Notre *maritima* de Calmthout en deviendrait d'autant plus intéressante qu'elle serait la seule de son espèce se trouvant à l'intérieur.

M. L. Errera, professeur à l'Université de Bruxelles, écrit qu'il a observé auprès du Bois de la Cambre, vers le milieu du mois de septembre, une invasion de très petites mouches en nombre incalculable. Le plafond d'une chambre en était notamment *tout noir*.

Il adresse en même temps quelques-uns de ces Diptères, qui sont remis, pour examen, à M. le Dr Jacobs.

M. Demoor a pris à Etterbeck un exemplaire du *Carabus auratus*, qu'il met sous les yeux de l'assemblée ; le tibia antérieur gauche s'y est déformé au sommet pour l'insertion de deux tarsi ; l'un de ces tarsi est normal, quoique réduit de longueur ; l'autre s'est malheureusement brisé et il n'en reste de témoignage qu'un premier article normal.

M. de Borre fait voir trois articulés dont il expérimente la conservation dans la liqueur de Wickersheimer, préparée par M. Kerremans. Un *Julus sabulosus* pris à l'excursion d'Arlon, au mois de juin, un *Lithobius* pris à Bouillon au mois d'août et une Épéire diadème prise dans le mois de septembre, y sont restés plongés, conservant leur forme et leur couleur naturelle jusqu'à présent. Le liquide s'est un peu coloré depuis que l'araignée y a été introduite vivante ; les deux Myriapodes avaient été préalablement tués par un séjour de quelques jours dans l'alcool.

Lorsqu'on pense combien l'emploi de l'alcool est coûteux ensuite

(1) « In dem *Catalogus Coleopterorum Europæ* habe ich die nur am Meeresufer vorkommende Art *maritima* Dej. (= *baltica* Motsch.) von der *hybrida* getrennt, weil sie nach Koltze (*Deutsch. Entomol. Zeit.*, Notiz in einer der letzten Jahrgänge von Dr. Kraatz oder Koltze) soweit ich mich erinnere, sichere Merkmale in der Bildung und Behaarung der Stirn, etc., bietet. Alle ähnlich gebildeten Thiere aus dem Inneren der Länder, auch die der russischen Entomologen (Gebler, Fischer, Solsky), führen mit Unrecht den Namen *maritima* und gehören zu *hybrida* als Form und sind identisch mit *restricta* Fischer, aus dem Innern von Sibirien. »

du fréquent renouvellement qu'il exige, sans parler d'autres inconvénients, il est évident que la science a tout à gagner à la découverte d'un liquide fixe préservatif et répondant autant que possible aux nécessités de l'étude. L'avenir nous apprendra si la liqueur de Wickersheimer, telle qu'elle est ou avec des modifications éventuelles, peut être appelée à souvent remplacer l'alcool.

M. Laneere annonce que M. le Dr Fromont, notre collègue, est revenu d'un nouveau voyage au Brésil et à Buenos-Ayres, retour par New-York. Il demande à ajouter deux espèces de ce voyage aux Longicornes brésiliens des premiers voyages, en ce moment sous presse dans nos Annales, et lit ensuite la petite note suivante :

LONGICORNES

CAPTURÉS AUX ÉTATS-UNIS PAR LE D^r E. FROMONT.

PRIONIDÆ.

Prionus laticollis Drury. — Brooklyn (Flatbush Avenue, 20 juillet 1884; 1 ex. dans l'herbe.

Parandra brunnea Fab. — Idem, 21 juillet 1884; 1 ex. mort dans un tronc abattu.

CERAMBYCIDÆ.

Typocerus velutinus Oliv., — Idem, 19 juillet 1884; 1 ex. pris sur des fleurs.

LAMIIDÆ.

Oberea bimaculata Oliv. var. *tripunctata* Fab. — Idem; 1 ex. pris au vol.

O. tripunctata Swed., var. *mandarina* Fab. — Idem.

Il ne semble pas qu'aucun de nos collègues ait pris part à l'excursion qui devait avoir lieu à Genappe le 14 septembre. D'après plusieurs membres, la situation politique rend en ce moment les excursions entomologiques assez difficiles, les paysans de beaucoup de localités de nos environs paraissant disposés à se venger sur les citadins, même inoffensifs, des coups qu'ils ont sans doute reçus à Bruxelles dans les bagarres politiques du 7 septembre. Certains de nos membres ont été l'objet d'agressions et il devient imprudent de s'aventurer sans armes défensives dans les bois et dans certains villages.

La séance est levée à 8 3/4 heures.



COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 51.

Assemblée mensuelle du 8 novembre 1884.

PRÉSIDENTE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergé, Capronnier, Degouve de Nuncques, De Lafontaine, De Le Court, Demoor, J. Devaux, Dubois, Duvivier, Fologne, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lallemand, Meunier, Remy, Richard, Willain et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. H. Donckier de Donceel, Lameere, Roelofs, Van Nerom et Weinmann font excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de la séance mensuelle du 4 octobre est approuvé.

Le Président annonce la perte que la Société vient de faire d'un de ses membres effectifs indigènes, M. Th. Le Comte, de Lessines, qui, par ses relations en Autriche, avait autrefois établi nos rapports avec les sociétés savantes et les naturalistes de cet empire. Un de nos membres effectifs étrangers, M. Finez, de Maubeuge, est également décédé récemment.

Le Conseil a reçu la démission pour 1885 de trois membres effectifs, MM. Bovie, Katter et Quaadvlieg.

Correspondance.

M. Willems remercie pour son admission comme membre effectif.

La Société Royale des Sciences de Bohême, à Prague, nous invite à nous faire représenter à la fête du centième anniversaire de sa fondation, le 6 décembre prochain. — Aucun de nos membres n'habitant la Bohême, l'assemblée charge le Secrétaire d'envoyer une adresse de félicitations.

La Société Entomologique de Silésie et la Société Royale des Sciences d'Upsal nous adressent leurs publications, tout en accusant réception des nôtres.

Le Musée national de Rio-de-Janeiro et la rédaction de la revue *Science*, à Cambridge, remercient pour l'envoi de nos publications.

La Société Royale Hongroise des Sciences nous adresse diverses publications.

M. Th. Broun demande à obtenir deux années de nos Annales en échange des parties I à III de son *Manual of New Zealand Coleoptera*. — Accepté.

La librairie Friedländer, de Berlin, ayant repris la publication des *Entomologische Nachrichten*, avec M. le Dr Karsch pour rédacteur, se déclare disposée à rétablir avec notre Société les relations d'échanges interrompues depuis quelque temps. — Accepté.

M. de Borre informe ses collègues qu'aussitôt qu'il aura reçu les demandes d'une dizaine de loupes de Göttingen, il en fera revenir de nouveau, n'en ayant plus du premier achat. M. de Selys et M. le Dr Jacobs, qui en ont acquis, les recommandent particulièrement.

La Société a reçu deux numéros du journal *Insekten-Börse*, un numéro d'une autre feuille analogue publiée à Neudamm (Brandebourg), le catalogue n° 5 de la bibliothèque entomologique de M. E. André et plusieurs catalogues de coléoptères d'Europe à vendre chez M. Desbrochers des Loges.

Rapports, lectures, communications.

Les rapports de MM. Fairmaire et de Borre sur un mémoire de M. le Dr Dugès n'ont pas encore été déposés.

M. H. Donckier adresse le travail suivant :

LISTE DES ANTHRIBIDES

DÉCRITS POSTÉRIEUREMENT

AU CATALOGUE DE MM. GEMMINGER & VON HAROLD

par H. Donckier de Donceel.

Macrotrichius (nov. gen.).

Motschulsky, Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 231.

niveinasus Motsch., l. c., p. 232.

N. Australie.

scabratus Motsch., l. c., p. 232.

I. de la Sonde.

Mecocerus Schönherr.

annulipes Karsch, Berl. Ent. Zeit., 1882, XXVI, Chinchoxo.
p. 402.

plintheroides Karsch, l. c., p. 402.

sulphureus Ch. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond., I. Andaman.
1876, p. 24.

Pachygenia (nov. gen.).

Motschulsky, Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 233.

guttulata Motsch., l. c., p. 234.

Sumatra.

impluviata Motsch., l. c., p. 234.

Indes or.

Tophoderes Schönherr.

annulatus Ch. Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist., Madagascar.
sér. 4, XV, p. 412.

Sintor Schönherr.

guttatus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 51 Malacca.
(27).

vittatus Kirsch, l. c., p. 50 (26).

Acorynus Schönherr.

anthriboides Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Sumatra.
2, p. 234.

bimaculatus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, Malacca.
p. 52 (28).

Litocerus Schönherr.

japonicus Roel., Ann. Soc. Ent. Belg., XXII, Japon.
Bull., p. LV; XXIV, p. 27.

multilineatus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, Malacca.
p. 52 (28).

Roelofsi Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist., 5^e sér., 4, Iponmatzu
1879, p. 465. (Japon).

rufescens Roel., Ann. Soc. Ent. Belg., XXII, Japon.
Bull., p. LV; XXIV, p. 28.

Sympactor (nov. gen.).

Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 53 (29).

vittifrons Kirsch, l. c.

Malacca.

Cedus Pascoe.

nigropictus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, Malacca.
p. 53 (29).

Diastatropis Lacordaire.

crassicornis Ch. Waterh., Ann. Nat. Hist. (5), Fianarantsoa.
X, p. 43.

nitidipennis Ch. Waterh., l. c., p. 45. —

olivaceus Ch. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond., Madagascar.
1877, p. 11.

planifrons Ch. Waterh., Ann. Nat. Hist. (5), X, Fianarantsoa.
p. 44.

Stenocerus Schönherr.

variegatus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Nicaragua.
2, p. 234.

Vidali Reed, Ent. Month. Mag., IX, p. 209; Chili.
Ann. Univ. Chil., XLI, p. 354.

Gymnognathus Schönherr.

nebulosus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Brésil.
2, p. 235.

Eurymecter (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 394.

fasciatus Oliv., Ent., IV, 80, p. 9, t. 1, fig. 9; Géorgie d'Amé-
Kirby, Fn. Bor. Am., p. 206 (sub *Tropi-* rique.
doderes).

Rhinotropis (nov. gen.).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1884, p. 467.

cristiferus Fairm., l. c. Fiji.

Phloeops Lacordaire.

planeta Pasc., Journ. of Ent., I, p. 60, t. 2, Batchian.
fig. 1; Lacord., Gen. Col., VII, p. 538,
note 1 (sub *Nessiara*).

Straboscopus Lacordaire.

planipennis Kirsch, Berl. Ent. Zeit., 1873, Pérou.
p. 417.

Tropidoderes Schönherr.

- Coquereli* Fairm., Le Natur., II, n° 38, 15 octobre 1880, p. 300 = *tessellatus* Coq. Bourbon.
lateralis Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 235. Indes or.
Munieri Bedel, Ann. Soc. Ent. France, 1882; Rhynch., p. 8, note. Algérie, Espagne.
neglectus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 235. Cap de Bonne-Esp.
rectus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 395. Floride.
Reyi Des Gozis, Feuille d. J. Natur., 1881, p. 67. France.
verrucosus Karsch, Berl. Ent. Zeit., 1882, XXVI, p. 388. Columbo.

Gonotropis (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 393. •

- gibbosus* Lec., l. c., p. 394. Colorado.

Allandrus (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 396.

- bifasciatus* Lec., l. c., p. 396. Illinois, Canada.

Nausicus (nov. gen.).

Pascoe, Ann. Nat. Hist. (5), X, p. 455.

- cephalotes* Pasc., l. c., p. 456, t. XVIII, fig. 10. Java.

Nessiara Pascoe.

- deplanata* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, 2, p. 45. I. du Duc d'York.
N-lineola Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 54 (30). Malacca.

Apatenia Pascoe.

- tessellata* Kirsch, Mittheil., Mus. Dresd., I, p. 54 (30). Malacca.

Zygænodes Pascoe.

- diopsideus* Westw., Thesaur. Ent. Oxon., p. 205, t. 5, fig. 5. Borneo.

Phænithon Schönherr.

- nodosus* Motsch., Bull. Mosc., XLVIII, 2, p. 239. Surinam.
Philippinensis Motsch., l. c., p. 240. I. Philippines.

Toxotropis (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 397.

- approximatus* Lec., l. c., p. 398. Californie.
pusillus Lec., l. c., p. 398. Floride.

Gonops (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 398.

- fissunguis* Lec., l. c., p. 398. Californie.

Hormiscus Waterhouse.

- saltator* Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, États-Unis.
 p. 397.

Apolecta Pascoe.

- aspericollis* Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, Malacca.
 p. 55 (34).

Deuterochrates Labram et Imhoff.

- cavicornis* Har., Coleopt. Heft., XVI, p. 153. Angola.

Xenocerus Schönherr.

- albotriangularis* Motsch., Bull. Mosc., 1874, I. de la Sonde.
 XLVIII, 2, p. 237.
barbicornis Gestro, Ann. Mus. Genov., VII, Ramoi.
 p. 1018.
Coræ Gestro, l. c., p. 1017. Andai, Arou.
fastuosus Gestro, l. c., p. 1012. Korido.
humeralis Gestro, l. c., p. 1014. —
leucogrammus Motsch., Bull. Mosc., 1874, N. Australia.
 XLVIII, 2, p. 238.
luctificus Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., XXVII, I. du Duc
 2, p. 45. d'York.
nireofasciatus Gestro, Ann. Mus. Genov., Mafor.
 VII, p. 1015.

- olivaceus* Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 237. Nouv. Guinée.
pictus Kirsch, Mittheil. Mus. Dresd., I, p. 55 (31). Malacca.
seminiveus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 237. I. de la Sonde.
velulinus Gestro, Ann. Mus. Genov., VII, p. 1012. Korido.

Xylinades Latreille.

- marmoratus* Roel., Not. Mus. Leyd., II, p. 237. Sumatra, Java.
Roelofsi Rits., l. c., IV, p. 190. Sumatra.
rufopictus Fairm., Le Natur., II, p. 192; Ann. Soc. Ent. France, 1883, p. 109. Abyssinie.
tuberculosus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 236. Natal.

Rawasia (nov. gen.).

Roelofs, Not. Leyd. Mus., II, p. 203.

- Diardi* Roel., l. c., III, p. 161. O. Java.
Ritsemæ Roel., l. c., II, p. 204. Sumatra.

Eucorynus Schönherr.

- variolosus* Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 231. Siam.

Litotropis (nov. gen.).

Fairmaire, Le Natur., 1880, II, p. 346; Ann. Soc. Ent. France, 1880, p. 337.

- lateritius* Fairm., ll. cc. Nossi-Bé.

Phænisor (nov. gen.).

Motschulsky, Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 240.

- albofasciatus* Motsch., l. c., p. 241. Amérique centr.

Polycorynus Schönherr.

- minor* Karsch, Berl. Ent. Zeit., 1882, XXVI, p. 403. Chinchoxo.

Rhinanthribus (nov. gen.).

Motschulsky, Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 241.

- dispar* Motsch., l. c., p. 242. I. de la Sonde.

Etnalis (nov. gen.).

Sharp, Ent. Monthl. Mag., X, p. 32.

conulus Broun, Man. N. Z. Col., p. 555. Nouv. Zélande.

proximus Broun, l. c. —

spini-collis Sharp, Ent. Monthl. Mag., X, p. 32. —

Eugonus Schönherr.

orientalis Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Indes or.
2, p. 231.

Anthribidus Fähræus.

sellatus Roel., Deutsche Ent. Zeit., XXIII, 1879, Tokio.
p. 302.

Phlæobius Schönherr.

gibbosus Roel., Ann. Soc. Ent. Belg., XXII, Japon.
Bull., p. LV.

Cratoparis Schönherr.

altus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 430.

ferruginosus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Brésil.
2, p. 236.

fuscomaculatus Motsch., l. c., p. 236. Panama.

Huttoni Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 431.

Targioni Piccioli, Bull. Ent. Ital., IX, p. 214, Florence.
t. VII, fig. I.

tessellatus Motsch., Bull. Mosc., 1874, XLVIII, Indes or.
2, p. 236.

Piezocorynus Schönherr.

mixtus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, États-Unis.
p. 402.

mæstus Lec., Ann. Lyc., I, p. 172 (sub *Aræoce-* Amer. bor.
rus); Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 402.

Exillis Pascoe.

Lawsonia Sharp (nov. gen.), Ent. Monthl. Mag., X, p. 30.

longicornis Sharp, l. c. = *longicornis* Pascoe. Nouv. Zélande.

spectabilis Broun, Man. N. Zeal. Col., p. 558. —

variabilis Sharp, Ent. Monthl. Mag., X, p. 31. —

Parablops Schönherr.

oculatus Baudi, Bull. Ent. Ital., IX, p. 135. Sicile.

Anthribulus (nov. gen.).

Lecoute, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 406.

rotundatus Lec., l. c., p. 407. Massach., Louisiane.

Anthribus Geoffroy.

atomus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 433.

Brouni Sharp, l. c., p. 426. —

bullatus Sharp, l. c., p. 427. —

crassus Sharp, l. c., p. 432. —

discedens Sharp, l. c., p. 429. —

fallax Perris, L'Abeille, XIII, p. 13. Mont de Marsan.

griseus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, Colorado.
p. 405.

heterus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 429.

inflatus Sharp, l. c., p. 434. —

lanuginosus Broun, Man. N. Zeal. Col., p. 549. —

lividus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 403. Floride.

nanus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 433.

nigrescens Broun, Man. N. Zeal. Col., II, p. 743. —

ornatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII,
p. 437. —

picipictus Broun, Man. N. Zeal. Col., II, p. 742. —

plumbeus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, États-Unis.
p. 406.

rudis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, N. Zélande.
p. 438.

rugosus Sharp, l. c., p. 435. —

Sharpi Broun, Man. N. Zeal. Col., p. 546. —

spinifer Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII,
p. 436. —

torulosus Broun, Man. N. Zeal., Col. II, p. 743. —

vates Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII,
p. 428. —

vestitus Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, Louisiane.
p. 406.

Anthrimecus (nov. gen.).

Motschulsky, Bull. Mosc., 1874, XLVIII, 2, p. 238.

alternans Motsch., l. c., p. 239. Brésil.

Eusphyrus (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 399.

Walshi Lec., l. c., p. 400. Illinois.

Phœnicobius (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 400.

chamæropis Lec., l. c., p. 401. Floride.

Balanodes (nov. gen.).

Ch.-O. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVIII, p. 118.

tomentosus Ch.-O. Waterh., l. c., p. 119. I. Rodriguez.

Caranistes Schönherr.

annulipes Ch.-O. Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVIII, p. 119. I. Rodriguez.

Aræocerus Schönherr.

<i>dignus</i> Broun, Man. N. Zeal. Col., p. 563.	N. Zélande.
<i>fuscipictus</i> Broun, l. c., p. 564.	—
<i>Meinertzhageni</i> Broun, l. c., p. 563.	—
<i>pardalis</i> Pasc., Ann. Mag. Nat. Hist. (4), XVII, p. 58.	Auckland Ceylan.
<i>purpureus</i> Broun, Man. N. Zeal. Col., p. 559.	Nouv. Zélande.

Doticus (nov. gen.).

Pascoe, Ann. Nat. Hist. (5), IX, p. 27.

palmaris Pasc., l. c., p. 27; Ch.-O. Waterh., Queensland. Aid., II, t. civ.

Choragus Kirby.

Harrisi Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XVII, p. 626. Détroit.
lineicollis Chevr., Le Natur., II, n° 25, 1^{er} avril 1880, p. 198. Martinique.

- niceorariigatus* Roel., Soc. Ent. Belg., XXII, Japon.
 Bull., p. LV.
Sayi Lec., Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 408. Washington.
Zimmermanni Lec., l. c., p. 408. N. Caroline.

Homœodera Wollaston.

- asteris* Wollast., Col. St-Helen., 1877, p. 202. St-Hélène.
compositarum Wollast., l. c., p. 197. —
edithia Wollast., l. c., p. 195. —
elateroides Wollast., l. c., p. 193. —
globulosa Wollast., l. c., p. 205. —
major Wollast., l. c., p. 197. —
nodulipennis Wollast., l. c., p. 193. —
Paivæ Wollast., l. c., p. 203. —
pumilio Wollast., l. c., p. 199. —

Notioxenus Wollaston.

- æneus* Wollast., Col. St-Helen., p. 187. St-Hélène.
congener Wollast., l. c., p. 188. —
Dalii Wollast., l. c., p. 185. —
Grayi Wollast., l. c., p. 186. —
Janischi Wollast., l. c., p. 184. —
rotundatus Wollast., l. c., p. 190. —
fasciatus Wollast., l. c., p. 179. —

Euxenes (nov. gen.).

Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc., XV, p. 409.

- piceus* Lec., l. c., XVII, p. 434. Floride.
punctatus Lec., l. c., XV, p. 409. Michigan, Canada.

Acarodes (nov. gen.).

Wollaston, Col. S. Helen., p. 205.

- gutta* Wollast., l. c., p. 206. St-Hélène.

Xenorchestes Wollaston.

- americanus* Motsch., Bull. Mus., 1873, XLVI, 2, Mobile (Amer.
 p. 251. bor.).

Phænotherion (nov. gen.).

Frivaldsky, Magy. Tud. Akad. math. Kösl., XIII, p. 331.

- Pulzkyi* Frivalds, l. c., p. 331, t. I. Hongrie.

M. Kerremans demande ensuite la parole et lit la note suivante :

En parcourant, l'année dernière, un excellent petit traité qui venait de paraître, intitulé : *Guide du naturaliste préparateur et du voyageur scientifique*, par G. Capus (édition Baillière, 1883), mon attention fut attirée par le passage suivant :

« *Méthode de Wickersheimer.* — Wickersheimer prépare un liquide de sa composition qui, pour la conservation des pièces anatomiques, semble présenter des avantages considérables...

« Les animaux et les végétaux se conservent simplement dans le liquide lui-même, ainsi que les pièces dont il importe de conserver les couleurs.

« Mais si l'on se propose d'obtenir des pièces sèches, on les fait préalablement macérer dans le liquide de six à douze jours, suivant leur volume, puis on les retire et on les fait sécher à l'air. Les ligaments, les muscles, les *Insectes*, les *Crustacés*, etc., restent alors à tout jamais mobiles, en sorte qu'on peut leur faire exécuter à chaque instant leurs mouvements naturels...

« Les organes creux, tels que l'intestin, le poumon, que l'on veut conserver à sec, sont d'abord remplis du liquide conservateur, puis ils y sont plongés pendant plusieurs jours. On les vide ensuite et on les laisse sécher. Dans ces conditions, le poumon conserve toute son élasticité...

« Les cadavres d'hommes et d'animaux conservés dans ce liquide ne perdent ni leur forme, ni leur couleur, ni leur flexibilité. Au bout de plusieurs années, on peut même les soumettre aux recherches anatomiques les plus délicates ou à des expériences médico-légales. La putréfaction ne se produit jamais, non plus que l'odeur nauséabonde qui l'accompagne...

« Les *Insectes*, les *Crustacés*, les *Vers*, après avoir macéré quelque temps dans ce liquide, conservent tous leurs mouvements sans qu'il soit besoin de retirer leurs organes internes.

« Enfin, leurs couleurs demeurent intactes, aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. »

Voici la formule de ce liquide :

Eau bouillante	1000	grammes.
Alun	33 1/3	—
Chlorure de calcium	33 1/3	—
Nitrate de potasse	4	—
Potasse	33 1/3	—
Acide arsénieux	3 1/3	—

On laisse refroidir, puis on filtre. Le liquide doit être neutre, incolore et inodore. On ajoute alors :

Glycérine. 4 décilitres.
Alcool méthylique. 1 —

Ayant composé la liqueur suivant cette formule, je fis différentes expériences.

Je pus constater que les insectes à corps mou, les larves, les chenilles et surtout les araignées conservés dans ce liquide ne se déforment pas et que leurs couleurs, bien qu'un peu noircies, se maintiennent mieux que dans l'alcool pur.

Les insectes plongés pendant une huitaine de jours dans la liqueur de Wickersheimer et séchés ensuite à l'air, conservent, comme l'affirme le docteur G. Capus, la faculté précieuse de pouvoir être maniés sans crainte d'accidents. Les parties de la bouche, si difficiles à étudier sur un insecte desséché, demeurent flexibles suivant leurs mouvements naturels, les antennes perdent cette rigidité qui les rend si fragiles, les pattes peuvent se mouvoir dans tous les sens, et les élytres mêmes peuvent être soulevées pour déployer les ailes inférieures et replacées dans leur position normale.

Chose précieuse pour l'étude des types, ces résultats peuvent être obtenus sur des insectes desséchés depuis longtemps. J'en ai fait l'expérience sur un Blaps de grande taille, mort depuis nombre d'années. Ce Blaps a été plongé, il y a environ sept mois, dans le liquide pendant une courte période de huit jours et ensuite séché à l'air libre. Aujourd'hui encore, il a conservé sa flexibilité du premier jour.

J'ai malheureusement quelques réserves à faire quant à la conservation des couleurs. Un Chrysochroa, d'une grande fraîcheur avant son immersion, paraît avoir faiblement perdu son éclat ; mais on peut affirmer que, telle qu'elle se comporte actuellement, la liqueur de Wickersheimer constitue un progrès et peut rendre des services inappréciables. Je la conseille, notamment, pour tous les Coléoptères à teintes uniformes et foncées, et je recommande surtout d'y conserver les larves et les araignées.

M. de Borre donne lecture d'une longue lettre de notre collègue M. Weyers, datée de Padang (Sumatra), le 20 août 1884.

M. Weyers y donne d'intéressants détails sur les chasses qu'il a déjà faites en diverses localités de ce point de la Malaisie. à Padang, au Fort-de-Kock, dans les Bovenlanden (Hautes Terres), à Païnan et surtout à l'île Bodjo (Poeloe Bodjo), « la plus méridionale de l'archipel des îles Batoe, au sud de la grande île de Nias. J'ai pro-

fité de l'offre obligeante du capitaine d'un petit vapeur transportant à Bodjo des matériaux pour la construction d'un phare, et j'ai pu ainsi séjourner et chasser pendant quatre jours sur cette petite île si pittoresque de 7 kilomètres de longueur sur 5 de largeur, toute couverte d'une forêt vierge admirable et qui, jusqu'à présent, n'a jamais été visitée par un naturaliste. Je me propose de faire une courte relation de cette excursion... Comme il est peu probable que je retourne encore à l'île Bodjo, je crois que l'on ferait bien d'étudier sans tarder les insectes de cette provenance, afin de pouvoir en ajouter la liste et la description des espèces nouvelles, s'il y en a, à la suite de la petite narration ».

Après quelques détails sur ces récoltes, en route pour l'Europe, M. Weyers ajoute :

« Je retournerai dans quelques jours à Fort-de-Kock; de là je ferai quelques excursions en rayonnant; j'irai d'abord à Paja Kombo et j'y séjournerai quelques jours pour explorer le Cloof d'Aroe, ainsi que les quelques cavernes qu'on y a découvertes récemment; puis, dans une autre direction, j'irai visiter le lac de Manindjoe, situé dans le cratère gigantesque d'un ancien volcan.

« Je me propose ensuite de séjourner à Padang-Pandjang, où je ferai l'ascension du grand volcan Merapi (en malais : feu rouge), qui est encore en activité, et je visiterai les bords du lac de Singkarrah, plus important que celui de Manindjoe, et qui a une longueur de 23 kilomètres. Ensuite, j'irai peut-être m'établir pour un mois sur une grande plantation de café, dans le district de Solok. Toutes ces excursions me prendront deux mois et demi environ. Après quoi, je reviendrai à Padang, d'où je ferai mon deuxième envoi, qui, je l'espère, sera réellement important et intéressant.

« Je retournerai ensuite à Païnan et j'irai immédiatement m'établir aux mines de Salidah, situées dans les montagnes, à environ 9 kilomètres de la côte, où l'on va effectuer des défrichements considérables dans les forêts vierges qui les entourent et dont la végétation est très variée et luxuriante. Je crois que c'est une excellente localité, car, pendant les quelques heures que j'y ai passées, j'ai pu observer une faune sensiblement différente de celle des autres localités que j'ai visitées jusqu'ici. Si ce terrain de chasse justifie la bonne opinion que j'ai de lui en ce moment, j'y ferai un long séjour de quelques mois, et, comme j'y ai une bonne maison commode à ma disposition, je pourrai faire une récolte dans d'excellentes conditions, beaucoup mieux qu'en me déplaçant continuellement.

« Je vois, en lisant vos Comptes-rendus, que notre *Cicindela maritima* fait un bruit terrible dans le monde entomologique. Certes, je ne m'attendais pas à lever un pareil lièvre en vous écri-

vant amicalement à ce sujet une lettre que je ne croyais pas assez importante pour être publiée et dans laquelle je voulais tout simplement attirer votre attention sur un sujet qui me paraissait intéressant et qui l'est véritablement. Si j'avais pu prévoir la publication de ma lettre, j'aurais soigné davantage ma communication, mais, privé des livres et des matériaux nécessaires, je devais laisser parler mes souvenirs, qui se rapportaient à une dizaine d'années en arrière. Je suis heureux de voir que nos collègues complètent peu à peu notre communication et la rendent plus exacte. L'observation de M. Devaux me paraît justifiée, mais je me permettrai de lui faire observer que, dans ma lettre, je n'ai point prétendu d'une manière absolue que la *C. maritima* Dej. ne se trouvait à Calmthout qu'après que la saison de l'*hybrida* était passée; j'ai dit que, *personnellement*, je ne l'avais rencontrée à Calmthout que sur les bords d'une seule mare, que j'ai essayé de décrire le plus exactement possible, afin de la faire reconnaître au besoin, et cela à l'époque où la *C. hybrida* avait disparu ou *presque complètement disparu*. J'ai observé, en effet, que l'apparition de la *maritima* Dej. avait lieu après que l'*hybrida*, qui, comme la *campestris*, est une espèce printanière, avait déjà eu le temps d'accomplir en grande partie son rôle d'insecte parfait; les exemplaires de l'*hybrida* que je voyais alors mêlés à la *maritima* ne pouvaient être comparés, comme abondance, aux nombreux individus qui pullulaient quelque temps auparavant. Je pouvais donc, en toute confiance, considérer la *maritima* comme plus tardive que l'*hybrida* et remplaçant graduellement cette dernière dans la localité. Je ne chassais ordinairement à Calmthout que jusque vers la fin juin, et je n'y retournais que rarement pendant les mois suivants jusqu'à l'hiver, recherchant parfois d'autres espèces sur d'autres points de cette commune. Pour ma part, je n'ai jamais trouvé l'*hybrida* plus tard que la mi-juin, tandis que la *maritima* se montrait encore fréquemment plus tard. Du reste, pour autant que mes souvenirs me servent bien, l'apparition de la *C. maritima* coïncidait assez exactement avec celles de la *C. sylvatica* et du *Bembidium argenteolum*. »

M. Weyers entre ensuite dans quelques détails pour démontrer l'utilité de continuer à explorer avec soin la localité de Calmthout, de chercher à établir les causes probables de l'apparition et de la disparition momentanée de plusieurs espèces que nous y prenons, et enfin d'étendre les chasses aux marais de Wuestwesel, situés à peu de distance à l'ouest de Calmthout.

Une carte postale du Dr Candèze annonce qu'il a reçu à Liège le

premier envoi indiqué par la lettre de M. Weyers. Il a adressé ensuite sur cet envoi la notice préliminaire suivante :

LES PREMIÈRES CHASSES DE M. WEYERS A SUMATRA.

Le résultat des premières chasses entomologiques de notre collègue M. J. Weyers, aux environs de Padang, m'est parvenu l'un des jours derniers.

Il consiste en quelques centaines d'insectes de tous les ordres, en arachnides, myriopodes, mollusques terrestres et d'eau douce, sans compter un petit nombre de reptiles.

M. Weyers a chassé aux environs immédiats de Padang, au Fort-de-Kock, entre les volcans de Singalang et Merapi, à Païnan (20 lieues au sud), et dans une petite île du nom de Bodjo, peu éloignée de la côte.

La saison n'étant guère favorable, la récolte n'a pas encore été bien fructueuse.

Rien de saillant dans les grandes espèces. Mais parmi les minuscules il se trouvera assez bien de nouveautés, si j'en juge par les Élatérides, les seuls que j'aie pu examiner avec soin.

En effet, sur les dix espèces récoltées — toutes petites — de cette famille, cinq sont inédites.

En voici l'énumération sommaire :

- Cardiophorus anaticus* Cand. Padang.
- *javanus* Cand. Païnan.
- *rubiginosus* Cand. Païnan.
- *sp. precedentis vicina, aut nova, minor.*
- Megapenthes* sp. nov. Bodjo.
- Monocrepidius* sp. nov. Padang.
- Agonischius pectoralis* Cand. Païnan.
- sp. nov. Bodjo.
- Heteroderes* sp. ? Padang.
- Silesis* sp. nov. Bodjo.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, c'est à Bodjo que Weyers a opéré les meilleures captures. Cette île n'a encore été visitée par aucun entomologiste.

Parmi les Lamellicornes, les inévitables et énormes *Lepidiota bimaculata* et *Euchlora cupripes* brillent au premier rang. Nombre d'*Anomala* déjà connues, le *Catharsius Molossus* répandu dans toute la Malaisie, l'*Oryctes Rhinoceros*, une *Ancylonycha*, une seule Cétonide, *Protelia acuminata*, des *Series*, le *Melolontha Argus*, deux *Apogonia*, le *Phaeochrous sumatrensis* Westw., etc.; rien de notable, en somme, dans cette famille.

M. Weyers annonce que ceci n'est qu'un commencement et qu'il va seulement s'occuper avec ardeur de la chasse entomologique.

Son habileté bien connue nous donne la certitude que ses prochains envois nous fourniront une multitude de nouveautés.

M. O. Lamarche, qui a examiné les Lépidoptères de l'envoi, en a fait l'objet de l'énumération préliminaire ci-après :

LÉPIDOPTÈRES

RÉCOLTÉS PAR M. WEYERS A SUMATRA, A FORT-DE-KOCK, ETC.

Ideopsis Daos ♂.

Danais Aspasia (Var. *Crocea*). -

— *Chrysippus*.

— *Melanippus* (Var. *Hegesippus*).

Danais Citrina?

Melanitis Leda, plusieurs variétés.

Ypthima Hübneri.

Mycalesis Blasius.

2 — species.

1 *Acrea* species.

Argynnis Niphe ♂ ♀. Très belle variété nouvelle, je pense.

Vanessa Cardui, moins colorée que le type ordinaire.

Junonia Attila.

Precis Iphita.

Hypolimnias Bolina ♂ ♀.

Adolias Nesimachus.

Papilio Pamnon ♂.

— *Sarpedon* ♂.

— *Polymnestor* ♀.

Delias Hypparte ♂. Variété bien caractérisée, diffère beaucoup du type ordinaire.

— species, très bel insecte, voisin de *Delias Belisama*, offrant cependant des différences notables. Je l'ai comparé avec une trentaine d'individus du type *Belisama* de Java et de Sumatra, mais il en diffère sensiblement. Je le décrirai pour notre séance de décembre.

Neptis Eurynome.

— *Peraka*.

Doleschallia Pratipa ♀. M. Weyers l'avait confondue avec *Kallima Paralekta*. A première vue, il y a certaine ressemblance.

Terias Hecabe.

Terias Simulata.

— *Hecabeoides.*

2 — species.

2 *Catopsilia* non déterminés.

L'envoi se compose d'une centaine de Lépidoptères.

M. de Borre fait voir une *Nebria* qu'il a rencontrée parmi les récoltes faites à Neffe près Dinant, en 1883, par M. Remy, et qui, par sa taille surtout, est différente de notre vulgaire *Nebria brevicollis*, dont elle n'est apparemment qu'une race ou variété.

A première vue, je l'avais prise pour une *Nebria Gyllenhalli*, espèce alpine et de l'Europe boréale, qu'il eût été assez étrange de rencontrer chez nous sur le bord de la Meuse. Mais un examen soigneux de la forme des côtés du corselet, qui ne présentent pas le petit espace franchement redressé auprès des angles de la base, caractère essentiel de celui de la *N. Gyllenhalli*, m'a détrompé. J'avais été aussi influencé par la circonstance qu'un exemplaire de l'île de Skye (Écosse), capturé par M. Roelofs, avait été placé dans la collection Putzeys en tête des *Gyllenhalli*, notre savant et regretté confrère ayant sans doute été abusé par la mauvaise vue de ses dernières années. Mais la place de l'un et de l'autre exemplaire, pour ceux qui ont le bonheur de conserver de bons yeux, eût été au milieu d'une série d'exemplaires sibériens, étiquetés *dubia* Sahlb., et que Putzeys avait mis à la suite de ses *N. andalusiaca*, sans leur attribuer une étiquette spécifique. La capture de cette forme en Belgique, où sa présence est peut-être bien accidentelle, est assez intéressante, moins toutefois que ne l'eût été celle de la *N. Gyllenhalli*.

Cette *Nebria dubia* Sahlb. (in litteris, ou décrite, j'ignore dans quel ouvrage) est-elle une véritable espèce, ou n'y faut-il voir qu'une sous-espèce ou race de la *brevicollis*? c'est un point sur lequel il y aurait fort à controverser sans doute et qui, pour les partisans de l'évolution spécifique, n'a pas une extrême importance.

M. de Borre indique ensuite une capture de l'*Osmoderma eremita* à Maeseyck, par M. Verheggen, directeur de l'école moyenne. Il semble que la province de Limbourg soit celle où l'on a le plus d'occasions de rencontrer ce grand et assez rare Lamellicorne.

M. Willain fait voir plusieurs bonnes espèces de Carabiques capturées dans le Hainaut. Il a encore repris à Trivières l'*Amphigynus piceus* et pris à Papignies l'*Anchomenus atratus*, l'*A. micans* et l'*A. livens* (sept exemplaires); cette dernière espèce a déjà été

rencontrée par lui à Strépy, Maurage et Boussoit, et par M. le Dr Hallez à Merbes-Sainte-Marie.

M. le Dr Jacobs dit que le Diptère remis à la dernière séance, au nom de M. Errera, est le *Chlorops larva* Meigen (nr 6), espèce assez commune et présentant beaucoup de variétés.

Le mauvais temps a empêché l'excursion que la Société aurait dû faire le deuxième dimanche d'octobre.

La séance est levée à 8 3/4 heures. . .

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 52.

Assemblée mensuelle du 6 décembre 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Bergè, De Glain, De Le Court, Demoor, J. Devaux, Jacobs, Lameere, L'Arbalestrier, Meunier, Remy, Vardervelde, Van Rossen, Weinmann, Willain et Preudhomme de Borre, secrétaire.

MM. Roelofs et Van Nerom ont fait excuser leur absence.

La séance est ouverte à 8 heures.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 8 novembre est approuvé.

Le Président annonce que les démissions de trois membres effectifs, MM. Chevrolat, Lemonnier et Vanden Broeck, ont été adressées au Conseil.

Le Conseil, d'accord avec la Commission de vérification des comptes, vient de rayer trois membres effectifs qui avaient refusé itérativement de payer la cotisation.

Un membre associé, M. Gernaert, a donné sa démission.

Trois présentations de membres effectifs sont, d'autre part, annoncées pour le mois prochain.

Le Président donne connaissance de la liste de présentation que le Conseil fait de trois candidats pour la place de membre honoraire vacante depuis la mort de M. J.-L. Le Conte.

Séance tenante, un quatrième nom, appuyé par cinq membres présents, est ajouté à cette liste.

Le Président demande si des membres ont des propositions à faire porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 décembre.

Une seule proposition est formulée par M. Bergé et appuyée par six des membres présents :

« La Société peut organiser chaque hiver une série de conférences ayant pour but de vulgariser l'entomologie.

« Les dispositions à prendre à cet effet sont laissées à l'initiative du Conseil. »

Elle figurera à l'ordre du jour.

Correspondance.

La Société Entomologique de Russie nous invite à nous faire représenter à la solennité du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. — M. Köppen, de Saint-Petersbourg, membre correspondant, est délégué dans ce but.

Une invitation semblable nous est adressée par la Société Toscane des Sciences pour la remise d'une médaille d'or à M. le Professeur Meneghini. — La Société regrette de n'avoir aucun délégué à y envoyer.

La Société Royale Linnéenne de Bruxelles nous envoie le programme des conférences qu'elle donne pendant les mois de novembre et décembre.

M. Wood-Mason, directeur du Musée de Calcutta, après nous avoir fait hommage de nombreux opuscules, demande à obtenir le dernier travail publié par feu Stål dans les comptes-rendus de notre Société. — Accordé.

M. le Dr Schaufuss nous fait hommage d'un ouvrage.

La Société Pro Fauna et Flora Fennica, à Helsingfors, nous adresse ses publications en nous accusant réception de nos Annales.

La Société Entomologique de Silésie nous complète la série de ses publications.

La rédaction de la revue *Science* accuse réception de nos Comptes-rendus.

La Société Asiatique du Bengale nous annonce l'envoi de ses publications à partir de 1866. — Une collection de nos Annales lui sera adressée, et l'échange de publications sera continué.

La Société a reçu un numéro du *Mesos* et deux de *Insekten-Börse*.

Rapports, lectures, communications.

Après avoir entendu la lecture des rapports de MM. Fairmaire et de Borre sur les *Notes pour servir à une Monographie des Mélœides du Mexique*, par M. le Dr Dugès, l'assemblée ajourne sa décision, en attendant une réponse de l'auteur à une lettre des rapporteurs.

M. Roelofs nous adresse un travail intitulé : *Deux espèces de Curculionides trouvées dans les Orchidées de l'Équateur*. La lettre d'envoi nous dit : M. le professeur E. Morren m'a communiqué, il y a quelque temps, deux Curculionides trouvés vivants sur des Orchidées à Londres. L'un est une espèce de *Cholus*, *Ch. Farbesii* Pascoe, déjà trouvée en Europe dans des circonstances analogues. L'autre est une nouvelle espèce de *Sphenophorus*, que j'ai appelée *Sph. Morreni* et dont je présente la description pour nos Annales. »

Le Secrétaire fait remarquer que ce travail, qui ne comporte qu'environ trois pages d'impression, est cependant destiné par l'auteur aux *Annales* et non au *Bulletin*. M. Roelofs a voulu donner le premier l'exemple, à la suite d'une discussion où le Conseil d'administration avait reconnu la nécessité de prendre des mesures pour que nos Comptes-rendus ne prissent pas des dimensions de plus en plus énormes au détriment de nos Annales et au plus grand péril de nos finances.

M. de Selys prend la parole dans le même sens. Il y a eu cette année une augmentation dans les matières des Comptes-rendus qui en a presque doublé l'étendue et démenti toutes les prévisions budgétaires. Il est urgent de s'arrêter dans cette voie, ainsi que le fera comprendre, à l'assemblée générale prochaine, l'exposé de notre situation financière. Les auteurs sont trop empressés à se faire imprimer dans le Bulletin pour des travaux qui, par leur nature et même parfois par leur dimension, rentreraient mieux dans le cadre de nos Annales; c'est une lourde charge pour nous, puisque le Bulletin s'imprime actuellement à 800 exemplaires, les Annales à 450 seulement, et aussi parce que les travaux ne peuvent alors s'ajourner d'un volume à l'autre, en cas d'insuffisance de ressources. Le Conseil s'en est encore préoccupé à un autre point de vue : Le plus grand nombre des travaux ainsi lus en séance ne sont pas lus en réalité, mais déposés par les auteurs, qui n'en lisent que le titre et tout au plus quelques lignes; ils passent à l'impression sans avoir été jugés par l'audition de l'assemblée, ce qui serait absolument nécessaire. Supposons, en effet, qu'un auteur, dans un travail ainsi présenté, ait laissé des erreurs grossières, ou ait inscrit des personnalités offensantes, des agressions et critiques dépassant les bornes permises, tout cela s'imprimerait sans avoir pu être arrêté au passage et compromettrait singulièrement notre Société. Il ne peut en être de même des travaux présentés par les Annales. Des commissaires, étant désignés, les examinent, font un rapport et mettent à couvert la responsabilité morale de la Société. C'est pourquoi, dit en terminant M. de Selys, le Conseil vous engage à vous montrer dorénavant très sévères dans l'admission des travaux

et notices au compte-rendu, celui-ci étant réellement destiné avant tout aux discussions scientifiques et aux petites communications. Le Conseil et le Secrétaire feront leur possible pour que les petits mémoires renvoyés aux Annales soient promptement imprimés dans celles-ci.

L'assemblée désigne MM. de Borre et Lameere comme rapporteurs pour le travail de M. Roelofs.

M. Belon nous adresse un travail ayant pour titre : *Énumération des Lathridiidae du Japon*. — MM. Everts et de Borre sont désignés comme rapporteurs.

Le Secrétaire présente une série d'*additions et rectifications* que M. le Dr Karsch, de Berlin, lui a envoyées pour les *Catalogues des Glomérises et Julides décrits jusqu'à ce jour*. Lesdits catalogues ayant été imprimés dans le volume de cette année, l'assemblée décide que ces *addenda* doivent également y prendre place, M. de Borre étant chargé de les examiner au préalable.

M. L. Fairmaire adresse un travail consistant en huit diagnoses, dont l'impression au compte-rendu est votée par l'assemblée :

DIAGNOSSES DE COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE

par M. Léon Fairmaire.

Somalibia multiguttata. — Long., 7 à 8 mill.

S. guttifera similima, sed brevior, albo magis punctata, prothorace minus fortiter ac minus dense punctato, linea media minus elevata, basi albo-guttato, epimeris apice albo-guttatis, elytrorum macula apicali magis terminali, vix transversa, pygidio evidentius carinato. — Makdischu.

Mesostenopa sericea. — Long., 14 mill.

Oblonga, nigra, sericeo-nitens, capite prothoraceque sat subtiliter dense punctatis, hoc subcordato, postice impresso, elytris ovatis, medio ampliatis, leviter striatis, striis sat fortiter punctatis, intervallis fere planatis, 3^e paulo convexiore. — Makdischu.

M. infima. — Long., 8 1/2 mill.

M. carinata Gestro affinis, sed brevior, capite prothoraceque evidentius punctatis, antennarum articulo 3^o secundo paulo longiore, elytris subtilius punctato-substriatis, intervallis minus fortiter punctatis, pectore laxo punctato. — Makdischu.

Rhytinota angulicollis. — Long., 15 à 18 mill.

R. acuticollis affinis, sed prothorace latiore, minus convexo, margine postico rectis, angulis posticis sat magnis, retroversis, parum acutis, capite fere, plicis ocularibus minus parallelis, scu-

tello paulo majore, prosterno planato, haud impresso distincta. — Makdischu, Guélidi.

R. oxyoma. — Long., 17 mill.

Præcedenti simillima, capite minore, prothorace angustiore, lateribus minus rotundato, margine postico utrinque sinuato, unde angulis magis retroversis, elytris basi fere rectis, humeris in dentem acutum productis, capite subtus minus triangulariter impresso, mento haud punctato distincta. — Makdischu.

Platynotus foveipennis. — Long., 15 mill.

Ovatus, parum convexus, niger, nitidus, prothorace transversim quadrato, elytris foveis seriatis, apice subacuminatis; *P. platessæ* affinis, sed elytris longioribus, fere acuminatis et foveatis distinctus. — Makdischu.

Systates prolixus. — Long., 9 mill.

Elongatus, convexus, fusco-ænescens, nitidus, griseo-pubescent prothorace utrinque, vitta densius albido-pubescente, elytris maculis similibus sparsutis, rostro tenuiter carinato, antennarum scapo crassiusculo, funiculi articulo 1^o duobus sequentibus conjunctis æquali, prothorace angusto, rugosulo, elytris punctato-substriatis, intervallis subtiliter rugosulis. — Makdischu.

S. albido-vittatus. — Long., 6 mill.

Oblongus, valde convexus, fuscus, indumento cervino dense vestitus, prothoracis elytrorumque lateribus late albidis, illo linea dorsali angusta, his vitta prope suturam albidis, antennarum scapo tenui, funiculi articulo 1^o elongato, prothorace sat parvo, subtiliter dense punctato-rugosulo, elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, intervallis planis, abdomine basi late impresso. — Makdischu.

M. de Bormans écrit pour faire remarquer que la note de M. Kerremans sur la liqueur de Wickersheimer indique la *potasse* parmi les substances entrant dans la composition de ce liquide. Il lui semble qu'il faut entendre par là non la potasse caustique, mais la *potasse du commerce* ou *carbonate de potasse*, puisque la liqueur doit être neutre; la potasse chimique la rendrait évidemment alcaline. Il signale ce point à l'auteur de la note.

La séance est levée à 8 3/4 heures.

A V I S.

Les membres qui ont emprunté des livres à la bibliothèque sont invités à les réintégrer dans le courant de décembre, conformément au règlement. Un recatement général doit être exécuté cette année.

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES.

SÉRIE III. — N° 53.

Assemblée générale du 26 décembre 1884.

PRÉSIDENCE DE M. DE SELYS-LONGCHAMPS.

Présents : MM. Arnold, Becker, Bergé, E. Candèze, Capronnier, De Lafontaine, De Le Court, J. Devaux, Dabois, Fologne, Fondu, Jacobs, Kerremans, Lameere, L'Arbalestrier, Mèlise, Remy, Renard, Roelofs, Vanden Branden, Van Nerom, Van Rossen, Weinmann et Preudhomme de Borre, secrétaire.

M. L. Candèze, membre associé, assiste à la séance.

Ont fait excuser leur absence : MM. Lallemand, Plateau, Van Segvelt et Willems.

La séance est ouverte à une heure et un quart.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 décembre 1883 est approuvé.

Le Président, prenant la parole, s'exprime comme suit :

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Le nombre des membres de la Société ne s'est point accru pendant la présente année; il a même légèrement diminué.

Nous avons, il est vrai, admis dix nouveaux sociétaires effectifs, mais la mort a frappé cruellement parmi nous. Nous en avons de ce chef perdu cinq, parmi les quels le très anciens et très distingués : MM. Th. Lecomte (de Lessines), Finet, sir Sydney Smith Saunders, Chevrolat et, en dernier lieu, Mors, notre si sympathique compatriote.

De sorte que, avec les démissions et radiations, nous ne sommes plus que 150 (159 en 1883).

Parmi nos douze membres honoraires nous avons à regretter la mort de l'illustre John Leconte, que vous avez à remplacer.

Cinq nouveaux membres associés ont été reçus. Il en existe en tout dix-neuf.

Le tome XXVIII de nos Annales, dont on vient d'achever l'impression, contient les mémoires suivants :

1^{re} PARTIE.

1. *Catalogue des Coléoptères carnassiers aquatiques*, par C. VANDEN BRANDEN.

2. *Énumération des Buprestides décrits postérieurement au catalogue de MM. Gemminger et de Harold*, par CH. KERREMANS.

3. *Premiers états de quelques Cassidides exotiques*, par H. DONCKIER DE DONCEEL, avec une planche.

2^e PARTIE.

1, 2 et 3. *Notices du D^r DUGÈS sur les métamorphoses de Coléoptères mexicains*, avec deux planches.

4. *Catologue des Glomérider*, par A. PREUDHOMME DE BORRE.

5. *Révision des Diplax paléarctiques*, par DE SELYS-LONGCHAMPS.

6. *Catalogue des Lysiopétalides, Julides, etc.*, par A. PREUDHOMME DE BORRE.

7, 8, 9 et 10. *Mémoires de M. A. LAMEERE sur des Longicornes américains* (2 genres et 22 espèces nouvelles).

11. *Énumération des Cétonides décrits postérieurement au Catalogue de MM. Gemminger et de Harold*, par A. BERGÉ.

Notre Bulletin (Compte-rendu des séances) a pris cette année une grande, je dirai presque une trop grande extension. Il contient près de 400 pages, à peu près le double de celui de 1883.

Il est rempli de travaux importants, dont plusieurs sont de véritables mémoires, ainsi que vous pourrez en juger par le court résumé méthodique que j'ai l'honneur de vous présenter.

Indépendamment des nombreuses informations qu'on y rencontre concernant les localités, les époques d'apparition, les mœurs de différents insectes, des rectifications synonymiques, excursions faites par des membres de la Société, des diagnoses de genres et espèces nouvelles, il contient des travaux spéciaux qui sont, comme je l'ai dit, de véritables mémoires. On remarquera que tous les ordres d'insectes y sont représentés, ce qui donne satisfaction aux

différents spécialistes, chose qui n'existe pas souvent dans les recueils de ce genre.

Pour ces travaux, nous avons été favorisés de la collaboration à peu près en nombre égal de collègues belges et étrangers.

Les membres résidents ont principalement traité :

CRUSTACÉS : M. le professeur Félix Plateau. Sur les espèces recueillies par M. Weyers.

ARACHNIDES : M. Becker. Fin du Catalogue des espèces belges.

MYRIAPODES : M. P. de Borre. Espèces des Glomérîdes et Julides de Belgique.

COLÉOPTÈRES : M. le Dr Fromont. Sur des Larves, etc.;

— M. Duvivier. Sur les Phytophages et Criocérîdes;

— M. H. Donckier de Donceel. Sur les Anthribides et Brenthides décrits depuis le catalogue de MM. Gemminger et de Harold;

— M. Lameere. Sur les Pytheus et l'Hypocephalus;

— M. Roelofs. Sur des Curculionides nouveaux;

— M. Weyers. Sur ses chasses à Sumatra.

ORTHOPTÈRES : M. de Bormans. Observations diverses.

NÉVROPTÈRES : MM. de Bormans et de Selys.

HYMÉNOPTÈRES : M. le Dr Jacobs. Tenthredinîdes et Siricîdes des environs de Bruxelles.

DIPTÈRES : M. le Dr Jacobs. Sur les larves d'Œstrîdes.

Les principaux travaux publiés dans le Bulletin par nos collègues étrangers se répartissent ainsi qu'il suit :

ARACHNIDES : Faunes locales et espèces et genres nouveaux, par M. Eug. Simon.

COLÉOPTÈRES : M. Léon Fairmaire. Espèces de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique orientale.

— M. Sharp. Sur l'Hypocephalus et sur des espèces de la Nouvelle-Zélande, etc.

— Le Père Belon. Espèces de la Nouvelle-Zélande.

— M. Dietz. Sur la Cicindela maritima.

— M. Et. Lefèvre. Sur les Eumolpîdes.

ORTHOPTÈRES : M. le professeur Ign. Bolivar. Sur des espèces nouvelles du type européen.

NÉVROPTÈRES : M. R. Mac Lachlan. Espèces nouvelles de Gomphines.

HÉMIPTÈRES : M. Lethierry. Espèces nouvelles pour la Faune de la Belgique.

LÉPIDOPTÈRES: M. Heylaerts. Plusieurs mémoires étendus sur les Psychides et sur d'autres familles. Les espèces belges sont énumérées;

— M. Mabille. Sur des genres et espèces nouvelles de Madagascar, etc.

DIPTÈRES : M. Van der Wulp. Espèces nouvelles.

Il est à retenir que parmi ces travaux on en remarquera plusieurs qui élucident différentes parties de la faune belge et qui font entrevoir le moment où un travail général pourra être entrepris.

D'autre part, des catalogues d'ensemble et des suites au catalogue de MM. Gemminger et de Harold, qui sont d'une utilité incontestable pour les travailleurs nouveaux.

Cette analyse rapide de nos comptes-rendus en démontre suffisamment l'importance. Ils ont ce grand avantage de procurer une prise de date rapide à la publication des genres et espèces nouvelles, qui y figurent en grand nombre.

Cependant, au point de vue administratif, une publication mensuelle qui est reproduite une seconde fois dans nos volumes d'Annales charge notablement le budget, et il semble nécessaire que ceux des travaux qui présentent le caractère de mémoires soient soumis à l'examen d'hommes compétents. Je crois que pour satisfaire à cet objet, il serait bon d'ajourner au mois suivant la publication de ceux dont je viens de parler, et de réserver pour le corps même des Annales les mémoires trop étendus, sauf à donner dans le Bulletin mensuel les diagnoses des genres et des espèces nouvelles.

J'attire sur ces remarques l'attention du Président qui va me succéder, et du Conseil renouvelé.

Il est d'autant plus nécessaire de restreindre pour le moment nos dépenses, que le Ministère dont dépend la division des sciences nous a informés, le 11 mars dernier, que le subsidé que notre Société ainsi que d'autres associations analogues recevaient, sera supprimé.

Je suis de ceux qui, au Sénat, ainsi que l'honorable M. Bergé à la Chambre, ont combattu cette suppression, si contraire au développement des sciences en Belgique. Nos protestations y ont rencontré un accueil sympathique, et l'honorable M. Rolin-Jaequemyns, alors Ministre de l'Intérieur, nous a fait des déclarations assez favorables; mais jusqu'ici le Gouvernement ne nous a pas informés de sa décision.

La perte de plusieurs de nos membres diminue également nos ressources. Nous devons donc marcher avec beaucoup de prudence.

Le champ de travail offert à nos collègues est des plus vastes; les

Insectes exotiques inédits continuent à nous arriver, grâce aux explorations de plus en plus fréquentes et à la facilité des communications. C'est une mine bien loin d'être épuisée.

Mais aussi la tâche devient de plus en plus ardue dans cette direction, parce que l'on travaille et que l'on publie dans tous les pays du monde en même temps et que beaucoup d'entre nous n'ont pas une collection générale, une bibliothèque, des relations à l'étranger et enfin le temps nécessaire pour être à même d'écartier les difficultés qu'ils rencontrent dans l'étude des insectes exotiques.

Dans un cercle plus modeste, en Belgique même, il y a à faire encore bien des recherches et des observations utiles.

Il s'agit d'abord de compléter peu à peu la connaissance de la Faune entomologique de la Belgique, dont la constatation fut le premier article de notre programme lorsque fut formée notre Société. Chacun peut facilement apporter une pierre importante à l'achèvement de l'édifice, en s'adonnant à la recherche et à l'étude d'un groupe non encore élucidé; et il n'en manque pas parmi les Aptères, les Hémiptères, les Diptères et même les Hyménoptères.

Une autre étude, que je recommande surtout aux jeunes entomologistes, qui ont l'activité et les bons yeux indispensables, peut fournir des matériaux très appréciés et presque inépuisables: c'est celle des larves et de leurs mœurs, les premiers états d'un nombre énorme de nos insectes étant encore inconnus, même parmi les ordres, dont nous possédons à l'état parfait des collections et des catalogues que nous considérons comme à peu près complets.

MESSIEURS,

Je vais remettre en d'autres mains les fonctions si honorables auxquelles, en mon absence, vous m'avez appelé il y a deux ans.

J'ai fait mon possible pour en remplir les devoirs à votre satisfaction, malgré l'inconvénient grave de ne pas résider dans la capitale, qui est le siège de la Société.

Je remercie vivement mes honorables collègues, et particulièrement ceux du Conseil et des Commissions spéciales, du concours efficace qu'ils ont bien voulu m'accorder. (*Applaudissements.*)

Au nom de la Commission de vérification des comptes, M. Mélise prend la parole. Les recettes du compte de 1884 s'élèvent à 6,147 fr. 51 c., les dépenses effectuées à 4,788 fr. 80 c., d'où un excédent de 1,358 fr. 71 c. La Commission a vérifié les écritures du trésorier, M. Fologne, en a constaté l'entière exactitude et propose de lui voter des remerciements pour le soin avec lequel il continue à remplir ses fonctions. (*Applaudissements.*)

M. Fologne donne lecture de l'exposé suivant de la situation financière de la Société :

MESSIEURS,

La situation financière différerait notablement des prévisions du budget, si la Société ne recevait plus entièrement les subsides que l'État lui paye annuellement.

La lettre écrite par le Ministre de l'Intérieur à notre secrétaire laisse peu de doutes à cet égard. Nous ne recevrons plus que 450 francs pour les abonnements aux Annales. Ce sera une diminution de recette annuelle de 1,000 francs. Espérons que l'on reviendra sur cette mesure, au sujet de laquelle le Conseil a adressé, ces jours derniers, une lettre au nouveau Ministre; mais, en attendant, il faut tenir compte de l'avis reçu, pour rétablir notre situation.

Le nombre des membres a diminué par suite des décès, démissions et radiations. Nos recettes s'en ressentiront l'année prochaine. Les frais de bureau, envoi d'Annales, ont coûté plus que la somme prévue. Cela résulte de ce que les frais d'envoi des comptes-rendus mensuels et des Annales augmentent en rapport de l'importance croissante de nos travaux.

L'assurance a coûté aussi un peu plus que les prévisions. C'est l'effet de l'impôt dont l'État a frappé les compagnies d'assurances, lesquelles n'ont rien trouvé de mieux que de le faire payer par leurs assurés.

La vente des Annales a rapporté beaucoup moins que les années précédentes. Enfin, la publication du tome XXVII des Annales a coûté près de 300 francs en plus de la somme inscrite au budget, et le tome XXVIII coûtera environ 4,000 francs, soit 400 de plus que les prévisions. Cette augmentation, que je signale tout particulièrement, résulte de l'importance donnée aux comptes-rendus mensuels, dans lesquels on publie des listes, des catalogues et des mémoires très longs, qui ne sont pas toujours lus en séance, ni renvoyés à une commission. Ces comptes-rendus, qui occupent parfois plusieurs feuilles d'impression, joints aux Annales, donnent des volumes dont le coût dépasse toutes les prévisions.

En présence de la réduction de recettes dont nous sommes menacés, il faudra, si nous n'obtenons pas une réponse favorable à la lettre qui vient d'être envoyée au Ministre, réduire l'importance de ce tome XXVIII en publiant les comptes-rendus avec une partie des travaux présentés en 1884, et en réservant pour 1885 l'excédent. A moins d'agir ainsi, il faudra vendre des obligations de notre fonds de réserve provenant des cotisations à vie, ce qui serait, à mon avis, un acte de mauvaise administration.

En résumé, Messieurs, voici la situation exposée en chiffres :

ACTIF.

Recettes non prévues :

Cotisations arriérées	fr.	44 00
Payé en moins pour reliures		239 00
— sur l'achat de livres		7 60
	Fr.	<u>290 60</u>

PASSIF.

Recette en moins sur les cotisations de 1884 . fr.	132 06
— sur la vente des Annales . .	168 42
Payé en plus pour assurances	3 71
— pour frais de bureau	49 19
— pour le tome XXVII	297 11
A payer en plus pour le tome XXVIII . . .	400 00
Total des dépenses imprévues fr.	<u>1,050 49</u>
Total des recettes imprévues	290 60
Différence entre les prévisions fr.	<u>759 89</u>

Cette somme sera majorée de mille francs si nous ne recevons plus le subside de l'État.

Telle est la situation, qui est compromise par une cause indépendante de l'Administration : le retrait du subside.

Je crois avoir donné suffisamment de détails et je vous demande, Messieurs, l'approbation des comptes, qui ont été vus et approuvés par la Commission de vérification.

L'Assemblée donne son approbation aux comptes.

Elle s'occupe ensuite de l'examen du budget pour 1885.

Le chiffre de la cotisation est maintenu à seize francs.

M. Weinmann propose à l'Assemblée d'autoriser le Conseil à scinder en deux parties le volume très considérable formé par les comptes-rendus de 1884 et les mémoires imprimés pendant l'année, et de n'en publier comme tome XXVIII qu'une partie, si les démarches faites auprès de l'État pour obtenir que le subside dont nous avons joui jusqu'ici nous soit continué, n'aboutissaient pas. — Cette proposition est adoptée.

Pour le cas où le volume ne serait pas scindé, M. de Borre fait remarquer que sa grosseur est telle qu'il conviendrait d'en fixer le prix pour la vente à un chiffre supérieur à celui du tome XXVII.

Il propose vingt-quatre francs, avec la réduction de deux francs en faveur des libraires et celle de huit francs pour les membres qui l'acquerraient ultérieurement. — Adopté.

Sur la proposition de M. Lameere, rappelant l'opinion émise par le Président, l'assemblée émet le vœu de voir les travaux d'entomologie exotique d'une certaine étendue et de nature à ne pas pouvoir être lus en séance, être renvoyés à l'examen de deux commissaires et insérés dans les Annales, le Bulletin étant réservé à des questions d'actualité ou à des communications concernant la faune indigène.

Il résulte de la discussion de cette proposition que les courtes diagnoses ayant pour but d'assurer la priorité de publication d'une espèce pourront toujours prendre place au Bulletin.

Le budget est voté en recettes à la somme de 6,220 fr. 11 c. (laissant de côté l'éventualité des subsides qu'on peut encore espérer obtenir), et en dépenses à celle de 8,481 fr. 32 c. Le déficit provisoire est de 2,261 fr. 21 c., dans l'hypothèse où le subside ne serait pas accordé et le volume XXVIII publié toutefois intégralement.

Le Conseil aura à tenir au courant la Société, dans les assemblées mensuelles, des résultats qu'il obtiendra pour l'amélioration de la situation financière et à convoquer, s'il devenait nécessaire, une assemblée générale extraordinaire.

M. le Dr Jacobs donne lecture du rapport de la Commission de surveillance des collections. Cette Commission croit devoir soumettre à l'Assemblée et à M. le Directeur du Musée la proposition de faire un dénombrement exact des espèces et des exemplaires contenus dans chaque caisse, d'exprimer ce total sur une étiquette officielle et de le transcrire sur un inventaire.

M. Bergé demande la parole pour développer sa proposition ainsi formulée : « La Société peut organiser chaque hiver une série de conférences ayant pour but de vulgariser l'entomologie. Les dispositions à prendre à cet effet sont laissées à l'initiative du Conseil. » Il fait connaître que, pour ces conférences, la grande salle des Herbiers du Jardin botanique serait mise à notre disposition par notre collègue M. Crépin.

La proposition, mise aux voix, est adoptée après quelque discussion.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre honoraire. La liste de présentation, qui avait porté quatre noms, se trouve réduite à trois, M. Aug. Chevrolat étant décédé le 16 de ce mois.

M. H. de Saussure, de Genève, déjà membre correspondant de la Société, est élu membre honoraire.

Il est ensuite procédé à l'élection du Président de la Société pour les années 1885 et 1886.

M. Preudhomme de Borre est élu. (*Applaudissements.*)

M. Preudhomme de Borre prend la parole pour remercier l'Assemblée de la marque d'estime qu'elle vient de lui accorder et à laquelle il est très sensible. Il eût voulu pouvoir décliner cette honorable mission, mais dans les circonstances fort difficiles où se trouve en ce moment la Société, il ne lui semble pas possible de paraître éluder les devoirs qu'elle impose. Il fait toutefois la réserve que des circonstances personnelles, étrangères aux affaires de la Société, pourraient peut-être lui faire déposer son mandat avant le terme de sa durée statutaire. Il termine en proposant un vote de remerciements à notre éminent Président d'honneur, qui a bien voulu, pendant les deux dernières années, assumer le fardeau de la direction active de la Société, ce qu'il a fait avec un véritable dévouement. (*Applaudissements.*)

L'Assemblée passe à l'élection de quatre membres du Conseil. MM. Fologne, Jacobs et Lameere sont élus pour deux ans, et M. Capronnier pour un an.

MM. Fondu, Kerremans et Mélise sont réélus membres de la Commission de vérification des comptes.

MM. Jacobs et Roelofs sont réélus membres de la Commission de surveillance des collections.

Sur la proposition de M. Lameere, la feuille 39 de la carte au 1:40,000 restera désignée comme champ spécial d'exploration entomologique en 1885.

Comme localité pour l'excursion des deux jours de la Pentecôte, M. Weinmann propose les environs d'Hérenthals, et M. Lameere, ceux de Dinant.

Après discussion, l'Assemblée se prononce pour Hérenthals.

La séance est levée à 3 1/2 heures.



ACCROISSEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE

DU 1^{er} DÉCEMBRE 1883 AU 30 NOVEMBRE 1884.

I. — Publications reçues à titre d'échange.

L'abondance des matières publiées cette année dans les comptes-rendus a décidé le Conseil d'administration à remettre l'impression de cette liste au volume suivant, en y réunissant les publications périodiques qui auront été reçues jusqu'au 30 novembre 1885.

II. — Dons des auteurs.

1. ALBRECHT (P.). — Note sur le pelvisternum des Édentés, avec des observations morphologiques sur l'appareil sternal des animaux vertébrés. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
2. — Sur la fente maxillaire double sous-muqueuse et les quatre os intermaxillaires de l'Ornitorhynche adulte normal. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
3. — Épiphyses osseuses sur les apophyses épineuses des vertèbres d'un reptile (*Hatteria punctata* Gray). — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
4. — Sur les copulæ intercostoïdales et les hémisternoïdes du sacrum des Mammifères. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
5. — Sur la fossette vermienne du crâne des Mammifères. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
6. — Sur les spondylocentres épipituitaires du crâne, la non-existence de la poche de Rathke et la présence de la chorde dorsale et de spondylocentres dans le cartilage de la cloison du nez des Vertébrés. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.

7. ALBRECHT (P.). — Sur la valeur morphologique de la trompe d'Eustache et les dérivés de l'arc palatin, de l'arc mandibulaire et de l'arc hyoïdien des Vertébrés, suivi de la preuve que le symplectico-hyomandibulaire est morphologiquement indépendant de l'arc hyoïdien. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
8. — Ueber die Zahl der Zähne bei den Hasenschartenkieferspalten. — 1884, 1 br. in-8°.
9. — Erwiderung auf Herrn Professor Dr Hermann von Meyer's Aufsatz : Der Zwischenkieferknochen und seine Beziehungen zur Hasenscharte und zur schrägen Gesichtspalte. — 1884, 1 br. in-8°.
10. OSTEN-SACKEN (C.-R.). — On the genus *Apiocera*. — Synonymica concerning exotic Dipterology. N° II. — A singular North-American Fly (*Opsebius pterodontinus*, n. sp.). — Berlin, 1883, 1 br. in-8°.
11. — Berichtigungen und Zusätze zum Verzeichnisse der entomologischen Schriften von Camillo Rondani. — Vienne, 1884, 1 feuille in-8°.
12. LINTNER (J.-A.). — First Annual Report on the injurious and other Insects of the State of New-York. — Albany, 1882, 1 vol. in-8°.
13. PLATEAU (F.). — Recherches sur la force absolue des muscles des Invertébrés. Première partie : Force absolue des muscles adducteurs des Mollusques Lamellibranches. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
14. — Idem. Deuxième partie : Force absolue des muscles fléchisseurs de la pince chez les Crustacés Décapodes. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
15. — Recherches expérimentales sur les mouvements respiratoires des Insectes. — Bruxelles, 1884, 1 vol. in-4°, avec 7 pl.
16. — Comment on devient spécialiste. — Morlaix, 1884, 1 br. gr. in-8°.
17. DUVIVIER (A.). — Énumération des Staphylinides décrits depuis la publication du catalogue de MM. Gemminger et de Harold. — Bruxelles, 1883, 1 vol. in-8°.
18. — Description de deux espèces nouvelles du Genre *Oïdes* Weber (*Galerucinae*). — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
19. — Description de quatre espèces nouvelles du genre *Paropsis* Olivier (*Coléoptères Phytophages*). — Leyde, 1 br. in-8°.
20. — Description de trois espèces nouvelles du genre *Oïdes* Weber (*Coléoptères Phytophages*). — Cinq espèces nouvelles du genre *Aulacophora* Chevr. (*Coléoptères Phytophages*). — Leyde, 1 br. in-8°.

21. DUVIVIER (A.). — Description de quelques Phytophages nouveaux. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
22. — Sur quelques espèces du genre *Oides* Weber (Galerucinae) du Musée de Leyde. — Leyde, 1884, 1 br. in-8°.
23. A Catalogue of the extensive and valuable Collection of British Lepidoptera, formed by E.-R. Sheppard, Esq., late of Lewisham, Kent, comprising named Series, arranged in three excellent Mahogany Cabinets, and Fifty-eight Double Store Boxes, containing a large number of un-arranged and mostly un-named specimens, in unusually fine condition, and consisting of upwards of twenty five thousand examples, including many rarities, and also numerous species from North America, etc., also five pairs of Alni. Which will be sold by Auction, by Mr J.-C. Stevens, at London, on Friday, the 11th Day of January 1884.
24. Tables dichotomiques pour servir à la détermination des familles et des genres des Coléoptères de Belgique, d'après L. Redtenbacher. — Bruxelles, 1884, 1 vol. in-18.
25. VAN SEGVELT (E.). — Les Galles utiles, par le Dr G.-E.-Ch. Beauvisage. Analyse. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
26. SCHAUFFUSS (L.-W.). — Giorgione's Werke, unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen von Crowe und Cavalcaselle, Jordan, Lermolieff. — Leipzig, 1884, 1 vol. in-8°, avec 2 photographies.
27. — Die Scydmaniden Nord-Ost Africa's, der Sunda-Inseln und Neu-Guinea's im Museo Civico di Storia naturale zu Genua untersucht und bearbeitet. — Gênes, 1884, 1 br. in-8°.
28. PACKARD (A.-S.). A Revision of the Lysiopetalidæ, a family of Chilognath Myriopoda, with a notice of the genus Cambala. — On the Morphology of the Myriopoda. — Philadelphie, 1883, 1 br. in-8°.
29. — The Systematic position of the Archipolypoda, a group of fossil Myriopods. — Philadelphie, 1883, 1 br. in-8°.
30. — The number of Segments in the Head of Winged Insects. Philadelphie, 1883, 1 br. in-8°.
31. — A New Species of Polydesmus with Eyes. — Philadelphie, 1883, 1 br. in-8°.
32. — Molting of the Shell in *Limulus*. — Philadelphie, 1883, 2 pages in-8°.
33. — Repugnatorial Pores in Lysiopetalidæ. — Philadelphie, 1883, 1 page in-8°.
34. SIMON (EUG.). — Description d'un genre nouveau d'Arachnides et remarques sur la famille des Archaïdæ. — Gênes, 1883, 1 br. in-8°.

35. SIMON (Eug.). — Matériaux pour servir à la Faune arachnologique des îles de l'océan Atlantique (Açores, Madère, Salvages, Canaries, Cap Vert, Sainte-Hélène et Bermudes). — Paris, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
36. — Arachnides recueillis en Birmanie par M. le chevalier J.-B. Comotto et appartenant au Musée Civique d'Histoire naturelle de Gênes. — Gênes, 1884, 1 br. in-8°.
37. — Notes complémentaires sur la famille des Archæidæ. — Gênes, 1884, 1 br. in-8°.
38. — Arachnides recueillis par la mission du Cap Horn en 1882-83. — Paris, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
39. — Arachnides recueillis à Khartoum (Soudan égyptien), par M. Vossion, vice-consul de France et appartenant au Muséum de Paris. — Paris, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
40. — Arachnides observés à Miranda de Ebro au mois d'août 1883. — BOURGUIGNAT (J.-B.) et DE UHAGON (S.). — Note sur les Mollusques et liste des Coléoptères recueillis dans la même localité par M. E. Simon. — Madrid, 1884, 1 br. in-8°.
41. GADEAU DE KERVILLE (H.). — Compte-rendu de la 21^e réunion des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne (Sciences naturelles). — Rouen, 1883, 1 br. in-12.
42. — Mélanges entomologiques. 1^{er} mémoire (1^{er} semestre 1883). — Rouen, 1883, 1 br. in-8°.
43. — Idem. 2^e mémoire. — Rouen, 1884, 1 br. in-8°.
44. — Sur la manière de décrire et de représenter en couleur les animaux à reflets métalliques. — Paris, 1883, 1 br. in-8°.
45. — Les Myriopodes de la Normandie. 1^{re} liste, suivie de Diagnoses d'Espèces et de Variétés nouvelles, par M. le Dr ROB. LATZEL. — Rouen, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
46. — Descriptions de quelques Espèces nouvelles de la famille des Coccinellidæ. — Paris, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
47. — La Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen en 1883. Compte-rendu annuel. — Rouen, 1884, 1 br. in-8°.
48. — Note sur une espèce nouvelle de Champignon entomogène (*Stilbum Kervillei* Quélet). — Rouen, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
49. HEYLAERTS (F.-J.-M.). — Les Macrolépidoptères de Brèda et de ses environs. Liste supplémentaire n° 8. Captures de 1877-1882. — La Haye, 1 br. in-8°.
50. — Description d'une espèce nouvelle de Psychide. — Bruxelles, 1883, 1 br. in-8°.
51. RILEY (Ch.-V.). — Report of the Entomologist for the year 1883. — Washington, 1883, 1 br. in-8° avec 13 pl.

52. RILEY (CH.-V.). — Reports of observations and experiments in the practical work of the division, made under the direction of the Entomologist. — Washington, 1883, 1 br. in-8°, avec 3 pl.
53. — Reports of observations on the Rocky Mountain Locust and the Chinch Bug, together with extracts from the correspondence of the division on Miscellaneous Insects. — Washington, 1883, 1 br. in-8°.
54. — Reports of experiments, chiefly with kerosine, upon the Insects injuriously affecting the Orange Tree and the Cotton Plant, made under the direction of the Entomologist. Washington, 1883, 1 br. in-8°.
55. BERG (C.). — Notas sinonimicas acerca de algunos Coleopteros y Lepidopteros. — Buenos-Ayres, 1883, 1 br. in-8°.
56. — Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina. — Buenos-Ayres, 1884, 1 vol. in-8°.
57. DE HORVATH (G.). — Révision du genre Eremocoris Fieb. — Caen, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
58. — Az Eremocoris-Fajok Maganrajza. — Budapest, 1883, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
59. — Heteroptera Anatolica in regione Brussæ collecta. — Budapest, 1883, 1 br. in-8°.
60. — Die europäischen Podoparien. — Vienne, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
61. — Le Phylloxera et le froid d'hiver. — Budapest, 1883, 1 br. in-8°.
62. — Diagnoses Hemipterorum. — Budapest, 1884, 1 br. in-8°.
63. — Jelentés az 1883-ek éyben Magyarország területén fellépett és megfigyelt Kartekony Rovarokrol. — Budapest, 1884, 1 br. in-8°.
64. Phylloxera szölő pusztító rovar. — Budapest, 1884, 1 planche avec texte in plano.
65. Rapport sur la situation phylloxérique en Hongrie pendant l'année 1883. — Budapest, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 carte.
66. Rovartani Lapok. Havi folyóirat, különös tekintettel a hasznos és káros rovarokra, szerkeszti es kiadja HORVATH GÉZA. Kötet I, füzet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
67. MILLIÈRE (P.). — Lépidoptérologie. Huitième fascicule. — Lyon, 1882, 1 vol. relié avec 4 pl.
68. — Lépidoptères inédits et notes entomologiques. — Caen, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
69. A Catalogue of the first portion of the valuable and extensive Collection of Lepidoptera formed, regardless of expense, by the late Ph.-H. Harper, Esq., F. R. C. S., including the

unique British Specimen of *Nyssia Lapponaria* and most of the rarer Species of British Macro and Micro-Lepidoptera; also a large number of exceedingly fine varieties and local forms. Which will be sold by Auction, by Mr J.-C. Stevens, at London, on Thursday and Friday, the 20th and 21st of March 1884.

70. SALLÉ (AUG.). — Note nécrologique sur John L. Leconte. — Paris, 1884, 1 br. in-8°.
71. Catalogue of the valuable Entomological Library of the late John L. Leconte, M. D. of Philadelphia, being the Most Important Library on Entomology ever offered at Public Sale either in Europa or America. To be sold tuesday, wednesday and thursday afternoons, May 6th, 7th and 8th 1884, at Philadelphia.
72. MAYER (P.). — Zur Naturgeschichte der Feigeninsecten. — Naples, 1882, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
73. — Contribuzione alla storia naturale degli Insetti del Fico. — Florence, 1882, 1 page in-8°.
74. WESTWOOD (J.-O.). — Descriptions of some new exotic Coleoptera. — La Haye, 1883, 1 br. in-8°, avec 3 pl.
75. — Observations on the Hymenopterous genus *Scleroderma* Klug, and some allied groups. — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 4 pl.
76. — Descriptions of some new Exotic Species of Moths. — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
77. — Observations on two Species of Indien Butterflies (*Papilio castor* and *P. pollux*). — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
78. — Two new species of the Coleopterous genus *Acanthocerus*. — Leyde, 1882, 2 pages in-8°.
79. — On *Cetonia aurata* and *Protætia Bensoni*. — Londres, 1880, 1 br. in-8°.
80. — On two Gynandromorphous specimens of *Cirrhochroa Aoris* Doubleday, an Indian species of Nymphalideous Butterflies. — Londres, 1880, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
81. — On some unusual monstrous Insects. — Londres, 1879, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
82. — Description of a new genus of Hymenopterous insects. — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
83. — Descriptions of the insects infesting the seeds of *Ficus Sycomorus* and *Carica*. — Londres, 1882, 1 br. in-8°, avec 4 pl.
84. — Further descriptions of insects infesting figs. — Londres, 1883, 1 br. in-8°, avec 7 pl.

85. WESTWOOD (J. -O.). — Further notice concerning the fig-insects of Ceylon. — Londres, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
86. — Description of the immature state of a Ceylonese insect apparently belonging to an undescribed genus. — Londres, 1881, 1 br. in-8° avec 1 pl.
87. — On the supposed abnormal habits of certain species of Eurytomides, a group of the Hymenopterous family Chalcididae. — Londres, 1882, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
88. — An Address read at the Entomological Society of London, June 6th 1883, on his Election as Honorary Life-President. — Londres, 1883, 1 br. in-8°.
89. — Notæ Dipterologicae. N° 5. Descriptions of new species of Exotic Tipulidae, with an annotated summary of species belonging to the same family previously described. — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 3 pl.
90. — Idem. N° 6. On the minute species of Dipterous insects, especially Muscidae, which attack the different kinds of Cereal crops. — Londres, 1881, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
91. — Matabele Land and the Victoria Falls, from the letters and journals of the late Frank Oates, F. R. G. S. Appendix IV. Entomology. — Londres, 1882, 1 br. in-8°, avec 5 pl.
92. SCUDDER (S.-H.). — Two new and diverse types of Carboniferous Myriapods. — The species of Mylacriss, a carboniferous genus of Cockroaches. — Boston, 1884, 1 br. in-4°, avec 2 pl.
93. — A Contribution to our Knowledge of Palæozoic Arachnida. — Boston, 1884, 1 br. in-8°.
94. — Triassic Insects from the Rocky Mountains. — New-Haven, 1884, 1 br. in-8°.
95. Le Naturaliste. Journal des échanges et des nouvelles. 1^{re} année, n° 15 (1^{er} novembre 1879).
96. DE SELYS-LONGCHAMPS (E.). — Révision des *Diplax* palæarctiques. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
97. Encouragements aux sociétés scientifiques. Discours prononcés dans les séances des 22 et 25 avril 1884, par M. le baron DE SELYS-LONGCHAMPS, président du Sénat, pendant la discussion du budget de l'intérieur. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-12.
98. A Catalogue of the second and concluding portion of the valuable and extensive Collection of Lepidoptera formed, regardless of expense, by the late Philip. H. Harper, Esq. F. R. C. S., including most of the rarer species of British Micro-Lepidoptera; also a number of Fine Varieties and Local Forms, duplicate Macro-Lepidoptera, a twenty-

drawer cabinet, store boxes, etc., likewise the named Collection of British Coleoptera, comprising many Scarce Species; and the Library of Natural History, medical and other books. Which will be sold by Auction, by Mr J.-C. Stevens, at London, on thursday and friday, the 8th and 9th of May 1884.

99. MURRAY (J.) et RENARD (A.-F.). — Les caractères microscopiques des cendres volcaniques et des poussières cosmiques et leur rôle dans les sédiments de mer profonde. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
100. — et — Notice sur la classification, le mode de formation et la distribution géographique des sédiments de mer profonde. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
101. VANDEN BRANDEN (C.). — Énumération des Coléoptères Phytophages décrits postérieurement au catalogue de MM. Gemminger et de Harold. Hispides et Cassidides. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
102. — Catalogue des Coléoptères carnassiers aquatiques (Haliplidæ, Amphizoïdæ, Pelobiidæ et Dytiscidæ). — Bruxelles, 1884, 1 vol. in-8°.
103. REUTER (O.-M.). — Två nya Piezostethus Arter från Sverige och Finland. — Stockholm, 1883, 1 br. in-8°.
104. — Sibiriska Hemiptera antecknade. — Helsingfors, 1884, 1 br. in-8°.
105. MAC LACHLAN (R.). — A Monographic Revision and Synopsis of the Trichoptera of the European Fauna. First additional Supplement.—Londres, 1884, 1 vol. in-8° avec 7 pl.
106. LAMEERE (AUG.). — Contributions à l'histoire des métamorphoses des Longicornes de la famille des Prionidæ. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
107. — Note sur l'Hypocephalus armatus. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
108. — Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et à La Plata. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
109. — Longicornes des voyages du Dr E. Fromont au Brésil et à La Plata. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
110. — Matériaux pour la Faune des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves à Antioa. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
111. — Matériaux pour servir à la Faune de la République de Vénézuéla. Longicornes nouveaux ou peu connus. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
112. BELON (M.-J.). — Sur la place systématique du Genre Langelandia Aubé et note synonymique. — Lyon, 1882, 1 br. in-8°.

113. PREUDHOMME DE BORRE (A.). — Les Méléoides de l'Europe centrale, d'après Redtenbacher et Guttleisch. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
114. A Catalogue of the Collection of British Lepidoptera of the late M^r William Prest, of York, comprising many Rare Species. The Collections of the late Sir Sidney Smith Saunders, C. M. G., consisting of fine Series of British and Foreign Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Microscopical Preparations, etc., together with a first-class Microscope by Smith and Beek, and numerous Important entomological and other works, comprising a complete Set of the Transactions of the Entomological Society of London; a nearly complete Set of the Annales de la Société Entomologique de France, L. Reeves's Conchologia Iconica., 20 vol., etc. Entomological Cabinets, Indian, Ceylon and Australian Insects, a few Birds-Eggs, etc. Which will be sold by Auction, by M. J.-C. Stevens, at London, on tuesday the 15th day or July 1884.
115. LECONTE (J.-L.) et HORN (G.-H.). — Classification of the Coleoptera of North America, prepared for the Smithsonian Institution. — Washington, 1883, 1 vol. in-8° sur papier fort (*édition réservée pour les Sociétés savantes*).
116. DUBOIS (ALPH.). — Les Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et leurs chrysalides. Livraisons 132 à 145 (fin).
117. WOOD-MASON (JAMES). — On Indian and Malayan Telphusidæ. Part. I (suite). — Calcutta, 1871, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
118. — Note on certain species of Phasmidæ hitherto referred to the genus Bacillus. — Calcutta, 1873, 1 br. in-8°.
119. — On a new Genus and Species (*Hylæocarcinus Humei*) of Landcrabs from the Nicobar Islands. — Calcutta, 1873, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
120. — On new or little-known species of Phasmidæ. — Calcutta, 1873, 1 br. in-8°, avec 3 pl.
121. — On *Rhopalorhynchus Kröyeri*, a new genus and species of Pycnogonida. — Calcutta, 1873, 1 br. in-8° avec 1 pl.
122. — On new or little-known species of Phasmidæ, with a brief preliminary Notice of the Occurrence of a Clasp ing Apparatus in the Males throughout the Family. — Calcutta, 1875, 1 br. in-8° avec 2 pl.
123. — On some new species of Paratelfusa. On *Entrichochelus modestus* Herbst. On some new species of Stomatopod Crustaceans. — Calcutta, 1875, 1 br. in-8°.
124. — Description of a new species of Mantidæ with pointed eyes. — Londres, 1876, 1 br. in-8°.

125. WOOD-MASON (JAMES). — On some remarkable species of Mantidæ. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
126. — Description of a new species of Phasmidæ. — Calcutta, 1876, 1 br. in-8° avec 1 pl.
127. — Description of a new species of Cetoniidæ. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
128. — Description of a new species of Mantidæ. — Londres, 1876, 1 feuille in-8°.
129. — On the femoral Brushes of the Mantidæ and their Function. On the Geographical Distribution of Schizocephala, a Genus of Mantidæ. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
130. — Description of a new Species of Portunidæ from the Bay of Bengal. — Londres, 1876, 1 feuille in-8°.
131. — Descriptions of new Species of Blattidæ belonging to the Genus Panesthia. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
132. — On the Mode in which the Young of the New-Zealand Astacidæ attach themselves to the Mother. — Londres, 1876, 1 feuille in-8°.
133. — On a new species of freshwater Astacidæ from New-Zealand. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
134. — A Conspectus of the species of Paratelphusa, an Indo-Malayan Genus of freshwater Crabs. — Londres, 1876, 1 br. in-8°.
135. — On a species of Japyx discovered at Calcutta. — Calcutta, 1876, 1 feuille in-8°.
136. — On a Caterpillar allied to Epipyrops Westw. — Londres, 1877, 1 feuille in-8°.
137. — Note on Mygale stridulans. — Londres, 1877, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
138. — On the discovery of stridulating organs in Scorpions. — Londres, 1877, 1 feuille in-8°.
139. — On new and little-known insects collected by Mr Ossian Limborg in Upper Tenasserim. — Calcutta, 1877, 1 br. in-8°.
140. — Descriptions of two new genera and species of Indian Mantidæ. — Londres, 1877, 1 br. in-8°.
141. — Notes on Phasmidæ. — Calcutta, 1877, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
142. — The Vater Ashmolianus of Westwood, the type of a new genus of Mantidæ. — Londres, 1877, 1 br. in-8°.
143. — On a sound-producing Crustacean. On Gongylus gongyloides L. On Schizocephala bicornis. — Londres, 1877, 1 br. in-8°.
144. — Description of a new species of Phasmidæ from the Malay Peninsula. — Londres, 1877, 1 br. in-8°.

145. WOOD-MASON (JAMES). — On a small collection of Orthopterous Insects of the families Phasmidæ and Mantidæ from Australia and New Britain, with descriptions of four new species. — Londres, 1877, 1 br. in-8°.
146. — Entomological Notes. I. On the difference in the form of the Antennæ between the Males of Idolomorpha and those of other genera of Empusidæ, a subfamily of Mantidæ. II. On the presence of a Stridulating Apparatus in certain Mantidæ. III. On a saltatorial Mantis. IV. On the Hatching Period of Mantidæ in Eastern Bengal. — Londres, 1878, 1 br. in-8°.
147. — Notes on new and little-known Mantidæ. — Londres, 1878, 1 br. in-8°.
148. — On new and little-known Mantidæ. — Londres, 1878, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
149. — Description of a new Lepidopterous Insect belonging to the genus *Thaumantis*. — Calcutta, 1878, 1 br. in-8° avec 1 pl.
150. — Description of *Didrepanephorus bifalcifer*, the type of a new genus and species of Rutelidæ, remarkable for the huge sickle-shaped mandibular horns in the males. — Londres, 1878, 1 br. in-8°.
151. — Morphological Notes bearing on the Origin of Insects. — Londres, 1879, 1 br. in-8°.
152. — Preliminary Notice of a new Genus (*Parectatosoma*) of Phasmidæ from Madagascar, with brief Descriptions of its two Species. — Calcutta, 1879, 1 feuille in-8°.
153. — On the Systematic Position of some little-known Asiatic Mantidæ, with Descriptions of two new Species, belonging to the Genus *Hestias*. — Description of *Sigerpes occidentalis*, the Type of a new Genus of Mantodea from West Africa. — Calcutta, 1879, 1 br. in-8°.
154. — Synopsis of the Species of *Chœradodis*, a remarkable Genus of Mantodea, common to India and Tropical America. — Calcutta, 1880, 1 br. in-8°.
155. — Description of a new Species of Diurnal Lepidoptera belonging to the Genus *Hebomoia*. — Calcutta, 1880, 1 feuille in-8°.
156. — Description of the Female of *Hebomoia Roepstorffii*. — Calcutta, 1880, 1 feuille in-8°.
157. — On the Lepidopterous Genus *Æmona*, with the Description of a new Species. — Description of a new *Papilio* from the Andaman Islands. — Calcutta, 1880, 1 br. in-8°, avec 1 pl.

158. WOOD-MASON (JAMES). — On a new Species of *Papilio* from South India, with Remarks on the Species allied thereto. — Calcutta, 1880, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
159. — Description of a new Species of the Lepidopterous Genus *Euripus* from north-eastern India. — Calcutta, 1881, 1 br. in-8°.
160. — On some Lepidopterous Insects belonging to the Rhopalocerous Genera *Euripus* and *Penthema* from India and Burmah. — Calcutta, 1881, 1 br. in-8° avec 2 pl.
161. — Description of a new Cornuted Species of *Cetoniidæ* from north-eastern India. — Londres, 1881, 1 br. in-8° avec 1 pl.
162. — Description of *Parantirrhæa Marshalli*, the type of a new genus and species of Rhopalocerous Lepidoptera from South India. — Londres, 1881, 1 br. in-8°.
163. — On new and little-known Mantodea. — Calcutta, 1882, 1 br. in-8°.
164. — Notes on the Anatomy of the Scorpion-Spiders (*Thelyphonus*). Part. I. The Scentglands. — Calcutta, 1882, 1 feuille in-8°.
165. — Descriptions of two new Species of *Papilio* from north-eastern India, with a Preliminary Indication of an apparently new and remarkable Case of Mimicry between the two distinct Groups which they represent. — Londres, 1882, 1 br. in-8°.
166. — Notes on the structure, postembryonic development and systematic position of *Scolopendrella*. — Londres, 1883, 1 br. in-8°.
167. — Description of a new Species of the Lepidopterous Genus *Elymnias*. — Londres, 1883, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
168. — On the *Mantis metallica* of Westwood. — Londres, 1884, 1 br. in-8°.
169. WOOD-MASON (JAMES) et DE NICÉVILLE (L.). — List of Diurnal Lepidoptera from Port Blair, Andaman Islands, with Descriptions of some new or little-known Species and of a new Species of *Hestia* from Burmah. — Calcutta, 1880, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
170. — Second List of Diurnal Lepidoptera inhabiting the Andaman Islands. — Calcutta, 1881, 1 br. in-8°, avec 1 pl.
171. — List of Diurnal Lepidoptera inhabiting the Nicobar Islands. — Calcutta, 1881, 1 br. in-8°.
172. — Second List of Diurnal Lepidoptera inhabiting the Nicobar Islands. — Calcutta, 1882, 1 br. in-8°.

173. CASEY (TH.-L.). — Contributions to the Descriptive and Systematic Coleopterology of North America. Part. I. — 1884, 1 br. in-8°.
174. MAC LEOD (J.). — Recherches sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire des Arachnides. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°, avec 2 pl.
175. — Communication préliminaire relative à l'anatomie des Acariens. — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
176. SHARP (D.). — Notice sur l'*Hypocephalus armatus* (traduite par A. LAMEERE). — Bruxelles, 1884, 1 br. in-8°.
177. BOLIVAR (J.). — Artropodos del Viage al Pacifico verificado de 1862 à 1865 por una comision de naturalistas enviada por el gobierno español. Insectos Neuropteros y Ortopteros. — Madrid, 1884, 1 vol. in-4°, avec 3 pl.
178. VON DALLA TORRE (C.-W.). — Bibliographia hymenopterologica. — Leipzig, 26 pages.
179. KERREMANS (CH.). — Les Jeudis du docteur Kaferman. — Bruxelles, 1 vol. in-12.
180. LICHTENSTEIN (J.). — La Flore des Aphidiens. — Montpellier, 1884, 1 br. in-8°.
181. WYTSMAN (P.). — Catalogue systématique des Passalides. — Gênes, 1884, 1 br. in-8°.
182. FAIRMAIRE (L.). — Notes complémentaires sur le genre *Cyrtonus*. — Madrid, 1883, 1 br. in-8°.
183. — Liste complémentaire des espèces du genre *Timarcha*. — Madrid, 1884, 1 br. in-8°.
184. — Histoire naturelle de France. XI^e partie. Hémiptères (Punaises, Cigales, Pucerons, Cochenilles, etc.). — Paris, 1884, 1 vol. in-12, avec 9 pl.
185. DES GOZIS (M.). — Étude du groupe des Charançons Cionidæ (espèces françaises). — Paris, 1884, 1 br. in-8°.

III. — Divers dons.

a. — De M. H. Donckier de Donceel.

1. LACORDAIRE (TH.). — Histoire naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères. Tome VI. — Paris, 1863, 1 vol. in-8°.

b. — De M. Aug. Sallé.

2. DE CHAUDOIR. — Essai monographique sur les Morionides. — Moscou, 1880, 1 br. in-8°.

IV. — Acquis sur le crédit voté par l'assemblée générale
du 26 décembre 1883.

1. Cistula entomologica. I, II, III (part. 26, 27).
2. Wiener entomologische Zeitung. Jahrg. I, II, III (H. 1 à 9).



LISTE DES MEMBRES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE

26 DÉCEMBRE 1884.

Les noms précédés d'un astérisque (*) sont ceux des membres fondateurs.

Les noms en caractères gras sont ceux des membres à vie.

Membres effectifs.

MM.

Abeille de Perrin (Elzéar), membre de la Société entomologique de France, place des Palmiers, 11, à Hyères (Var). — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

ALBRECHT (Paul), docteur en médecine et en philosophie, membre de diverses sociétés savantes, rue d'Isabelle, 38, à Bruxelles. — Entomologie générale.

ALLARD (Ernest), membre de la Société entomologique de France, etc., rue Paradis-Poissonnière, 2, à Paris. — Coléoptères.

ARNOLD (Léon), rue de Cologne, 71, à Schaerbeek. — Coléoptères.

BAR (Constant), propriétaire à Cayenne (Guyane française). — Entomologie générale, Lépidoptères.

BECKER (Léon), artiste peintre, rue Godecharles, 28, à Ixelles. — Arachnides.

BELLIER de la CHAVIGNERIE, membre de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, des Sociétés entomologiques de Berlin, de Stettin, de France, d'Italie, etc., rue St-Louis, 35, à Evreux (Eure). — Lépidoptères et Coléoptères d'Europe.

BELON (frère M.-J.), de l'Ordre des Frères prêcheurs, professeur à l'École supérieure de théologie de Lyon, membre de la Société entomologique de France, etc., rue du Plat, 25, à Lyon. — Coléoptères.

BERGÉ (Albert), étudiant, rue de la Poste, 122, à Schaerbeek. — Coléoptères (Buprestides) et Lépidoptères.

BIVORT (Arthur), banquier à Fleurus (province de Hainaut). — Entomologie générale, Coléoptères.

- Bolivar y Urrutia** (Ignacio), membre de diverses Sociétés savantes, Museo de Historia natural, calle de Alcalá, 41, à Madrid. — Coléoptères et Orthoptères d'Europe.
- BONVOULOIR** (v^{te} Henri de), membre des Sociétés entomologiques de France, Londres, Berlin, Stettin, Vienne, Lyon et Suisse, boulevard St-Germain, 245, à Paris. — Coléoptères.
- BORMANS** (Auguste de), rue Saint-Georges, 38, à Ixelles. — Orthoptères.
- BOURDON** (Jules), docteur en sciences naturelles, place Saint-Pierre, 15, à Liège. — Coléoptères.
- BOURGEOIS** (Jules), rue de l'Echiquier, 38, à Paris. — Coléoptères d'Europe, Malacodermes exotiques.
- BRONGNIART** (Ch.), officier d'Académie, membre de diverses Académies et Sociétés savantes, préparateur de Zoologie à l'École supérieure de Pharmacie, rue Guy de la Brosse, 8, à Paris. — Insectes fossiles.
- CANDÈZE** (E.), docteur en médecine, membre honoraire de la Société entomologique de France, membre de l'Académie royale de Belgique, etc., à Glain-lez-Liège. — Entomologie générale, Coléoptères (Élatérides, Lamellicornes et Longicornes).
- CAPRONNIER** (J.-B.), artiste peintre, membre de la Société entomologique de France, rue Rogier, 254, à Schaerbeek. — Entomologie générale, Lépidoptères de Belgique et exotiques.
- CARVALHO-MONTEIRO** (Antonio-Augusto de), docteur en droit et en sciences naturelles, rua do Alecrim, 72 (Largo do Barao de Quintella), à Lisbonne. — Lépidoptères.
- CATTERSEL** (Joseph), étudiant, à Heyst-op-den-Berg (province d'Anvers). — Entomologie générale.
- CHICOTE DEL RIEGO** (César), membre de la Société espagnole d'histoire naturelle, calle San-Bernardo, 41 principal, à Madrid. — Vésicants, Hémiptères d'Europe.
- CHYZER** (Dr Corneille), médecin en chef du Comitad de Zemlén, membre de l'Académie hongroise, du Conseil sanitaire, chevalier de l'ordre de François-Joseph, etc., à Sator-Alja-Ujhely (Hongrie). — Arachnides.
- CLAVAREAU** (Camille), notaire à Noville-les-Bois, province de Namur. — Lépidoptères de Belgique.
- CLEMM** (Frédéric), libraire, rue de l'Université, 24, à Gand. — Entomologie générale.
- CRAYEN** (Alfred), membre de diverses Sociétés scientifiques belges et anglaises, 132, Cambridge street, Warwick Square, SW, à Londres. — Entomologie générale, Crustacés.
- CRÉPIN** (François), directeur du Jardin botanique de l'État, secrétaire général de la Société royale de Botanique, membre de l'Académie royale de Belgique, rue de l'Esplanade, 8, à Bruxelles. — Entomologie générale.
- CRICK** (Ch.), docteur en médecine à Clermont (province de Namur), par Strée. — Entomologie générale, Coléoptères.
- CUNI Y MARTORELL** (Miguel), membre de l'Académie des sciences de Barcelone, de la Société entomologique de France et de la Société espagnole d'Histoire naturelle, calle de Codols, 18, à Barcelone. — Insectes de Catalogne.

- *DE LAFONTAINE (Jules), conservateur des collections de l'Université, à Gand. — Coléoptères, Lépidoptères, Hyménoptères et Diptères.
- DE LE COURT (Henri), étudiant, rue du Trône, 113, à Ixelles. — Coléoptères.
- DESBROCHERS DES LOGES (J.), membre de la Société entomologique de France, à Ardentes, près Châteauroux (Indre). — Coléoptères européens, Curculionides européens et exotiques.
- DETERMÉ (Stanislas), étudiant, rue de la Paix, 31, à Ixelles. — Entomologie générale.
- DEVAUX (Jules), rue Pascale, 47, à Bruxelles. — Coléoptères et Diptères.
- DEYROLLE (Henri), naturaliste, membre de la Société entomologique de France, faubourg Saint-Honoré, 191, à Paris. — Coléoptères, Lépidoptères exotiques.
- DIETZ (François), rue de Vénus, 10, à Anvers. — Coléoptères (Staphylinides).
- DONCKIER DE DONCEEL (Ch.), rentier, rue Mandeville, 128, à Liège. — Lépidoptères.
- DONNER (Ernest), rue de l'Industrie, 9, à Bruxelles. — Sériciculture.
- DORMER (lord), membre de la Société entomologique de Londres, Grove Park, Warwick (Angleterre). — Coléoptères.
- DUBOIS (Alphonse), docteur en sciences naturelles, conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle, à Bruxelles. — Entomologie générale, Lépidoptères.
- DUGÈS (Eugène), docteur en médecine à Guanajuato, Mexique. — Coléoptères.
- DUPONT (E.), directeur du Musée royal d'Histoire naturelle, membre de l'Académie royale de Belgique et de plusieurs autres Sociétés savantes, au Musée d'Histoire naturelle à Bruxelles. — Entomologie générale.
- DR PRÉ (Gaston), docteur en médecine, rue du Pépin, 2, à Bruxelles. — Coléoptères.
- DUVIVIER (Antoine), Schuhstrasse, 31, II, à Stettin. — Coléoptères (Staphylinides, Phytophages du globe).
- EGERICKX (Martin), boulevard Gambetta, 3, à Alger et à Watermael. — Entomologie générale.
- EHLERS (G.), membre de plusieurs Sociétés savantes, Muralla del Mar, 27, 2^o, à Carthagène (Espagne). — Coléoptères (Cicindélides et Carabiques).
- EMICH (Gustave d'), secrétaire adjoint au Ministère royal hongrois du commerce, chevalier de plusieurs ordres et membre de plusieurs Sociétés savantes, à Pest (Hongrie). — Coléoptères.
- ESGELS (Ch.), contrôleur des contributions directes et accises de Dinant, à Neffe-Anseremme, près Dinant. — Coléoptères.
- EVERTS (Géneyer E.-J.-G.), docteur en philosophie, professeur à l'École moyenne, Stationsweg, 79, à La Haye. — Coléoptères.
- FLEUTIAUX (Edmond), membre des Sociétés Entomologique de France et Française d'Entomologie, rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères.
- *FOLOGNE (Egide), architecte, membre de la Société malacologique de Belgique, rue de Namur, 12, à Bruxelles. — Lépidoptères d'Europe.
- *FONDU (Nicolas), contrôleur des contributions directes et accises, rue du Progrès, 334, à Schaerbeek. — Lépidoptères.
- FONTAINE (César), membre de la Société royale de Botanique de Belgique, à Papiognies, canton de Lessines (Hainaut). — Lépidoptères et Coléoptères.

- FROMONT** (Edmond), docteur en médecine, attaché aux steamers de la ligne d'Anvers à La Plata, avenue Brugmann, 80, à Forest lez-Bruxelles. — Coléoptères; mœurs et métamorphoses.
- FUISSEAU** (Georges de), étudiant, rue Blanche, 20, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Coléoptères.
- Gadeau de Kerville** (Henri), membre de la Société entomologique de France, secrétaire de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen, membre correspondant de la Société d'Études scientifiques d'Angers, etc., rue du Pont, 7, à Rouen. — Coléoptères (Coccinellides), Orthoptères, Névroptères, Myriapodes.
- Gallegos y Sardina** (Ventura), médecin-chirurgien et professeur d'histoire naturelle, membre de diverses sociétés savantes, à Mendoza (République Argentine). — Coléoptères.
- GIRARD** (Maurice), docteur en sciences naturelles, professeur de sciences physiques et naturelles au Collège Rollin, membre de la Société entomologique de France, du Conseil de la Société zoologique d'Acclimatation, etc., rue Gay-Lussac, 28, à Paris. — Entomologie générale, anatomie, physiologie, insectes nuisibles et utiles, sériciculture.
- GIRON** (Alfred), conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, rue Goffart, 16, à Ixelles. — Lépidoptères.
- GOBERT** (Émile), docteur à Mont-de-Marsan, département des Landes (France). — Diptères, Coléoptères.
- GONZALO Y GOYA** (Angel), professeur d'histoire naturelle, plaza de la Verdura, 70, Salamanca (Espagne). — Entomologie générale.
- GOZIS** (Maurice des), membre de la Société entomologique de France, à Montluçon (Allier). — Coléoptères et Orthoptères.
- Grenier** (A.-D.), membre de la Société entomologique de France, rue de Vaugirard, 55, à Paris. — Coléoptères de France.
- HALLÉZ** (Henri), docteur en médecine, à Binche (Hainaut). — Coléoptères.
- HEYDEN** (Lucas von), capitaine en retraite, Doctor philosophiæ honoris causâ, chevalier des ordres de Saint-Jean et de la Croix de Fer de 2^e classe, etc., second directeur de la Société d'Histoire naturelle de Senckenberg et membre de diverses sociétés entomologiques, Schlossstrasse, 54, à Boekenheim, près de Francfort-sur-le-Mein. — Insectes d'Europe de tous ordres, surtout Coléoptères.
- HEYLAERTS** (F.-J.-M.), docteur en médecine, membre de la Société entomologique néerlandaise, Sint-Jan' straat, A-503, à Breda (Brabant néerlandais). — Lépidoptères, Coléoptères.
- HORVATH** (Geyza de), docteur en médecine, directeur de la station phylloxérique, membre de diverses Sociétés savantes, Délibab-ueza, à Budapest (Hongrie). — Coléoptères et Hémiptères.
- *JACOBS** (J.-Ch.), docteur en médecine, rue des Ursulines, 28, à Bruxelles. — Hyménoptères, Diptères, Coléoptères.
- JEKEL** (Henri), naturaliste, membre de la Société entomologique de France: cabinet entomologique, rue de Dunkerque, 62, à Paris. — Coléoptères européens et exotiques (Curculionides).

- JONSSON (J.-V.)**, candidat en philosophie, à Annestad (ecclésiast. de Christianstad), Suède. — Entomologie générale.
- KERREMAES (Charles)**, lieutenant d'infanterie, rue du Lac, 58, à Ixelles. — Coléoptères (Buprestides, Lamellicornes, Cicindélides et Carabiques du globe).
- KOCH (Carl-Ludwig)**, docteur en médecine, Strasse nach Wohrd, 3, à Nuremberg (Bavière). — Arachnides.
- Kokouyew (N.)**, libraire, à Jaroslavl (Russie). — Coléoptères.
- LACERDA (Antonio de)**, membre de diverses sociétés savantes, à Bahia, Brésil. — Coléoptères.
- LALLEMAND (Amédée)**, candidat notaire, rue Berckmans, 12, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Lépidoptères.
- LAMARCHE (Oscar)**, industriel, membre de la Société royale de Botanique, rue Louvrex, 70, à Liège. — Lépidoptères (spécialement les Papilionides).
- LAMFERE (Auguste)**, étudiant, chaussée de Charleroi, 121, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Entomologie générale, Longicornes.
- LAMOTTE (G.)**, docteur en droit, membre de la Société Royale de Botanique, à Navaugle, près Rochefort, province de Namur. — Coléoptères.
- LANSBERGE (G. van)**, ancien gouverneur général des Indes néerlandaises, membre de diverses Sociétés savantes, au château du Rees, Brummen, province de Gueldre (Pays-Bas). — Coléoptères, spécialement Lamellicornes.
- L'ARBALESTRIER (Aristide)**, directeur de l'Hôpital militaire, à Bruxelles. — Lépidoptères.
- LECATTE (Louis)**, rue Linnée, 79, à Saint-Josse-ten-Noode. — Lépidoptères.
- LEFÈVRE (Edouard)**, membre de la Société entomologique de France, rue du Bac, 112, à Paris. — Coléoptères, spécialement Clytrides.
- LETHIERRY (Lucien)**, membre de la Société entomologique de France, rue Blanche, 16, à Saint-Maurice lez-Lille. — Coléoptères et Hémiptères.
- LICHTENSTEIN (Jules)**, membre de la Société entomologique de France, membre correspondant de l'Académie des sciences de Madrid, à la Lironde, près Montpellier (Hérault). — Entomologie générale et appliquée, Hyménoptères.
- LIÉNARD (Valère)**, préparateur d'anatomie comparée à la Faculté des sciences, boulevard des Hospices, 228, à Gand. — Entomologie générale; anatomie et physiologie comparées; Tipulaires.
- LINTNER (J.-A.)**, entomologiste de l'État de New-York, à Albany (États-Unis). — Entomologie générale et appliquée.
- LOOZ-CORSWAREM (prince Guillaume de)**, au château d'Athin, près Huy. — Lépidoptères.
- MABILLE (Paul)**, professeur au Lycée de Vanves, membre de la Société entomologique de France, rue du Cardinal Lemoine, 75, à Paris. — Lépidoptères.
- MAC LEOD (Jules)**, docteur en sciences naturelles, préparateur à l'Université de Gand, Pêcherie, 45, à Gand. — Anatomie, Crustacés et Arachnides.
- MALPERTUIS (Lucien)**, étudiant, rue du Poinçon, 39, à Bruxelles. — Coléoptères (Cicindélides et Carabides).
- MARÉCHAL (Jules)**, instituteur communal à Méry, commune de Tilff (province de Liège). — Entomologie générale.

- MAURISSEN (A.-H.)**, membre de la Société entomologique néerlandaise, rue de Tongres, à Maestricht. — Insectes d'Europe.
- Mazarredo (Carlos de)**, ingénieur forestier, calle del Almirante, 2 cuadruplicado, 2º izquierda, à Madrid. — Entomologie générale.
- MÉLISE (Louis)**, employé au ministère de l'instruction publique, rue Faider, 16, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Coléoptères.
- MEYER-DARCIS (Georges)**, membre des Sociétés entomologiques de Suisse et de France, à Wohlen (canton d'Argovie, Suisse). — Coléoptères (Carabides et Buprestides).
- MICHELS (Louis)**, naturaliste, Galerie du Roi, 19, à Bruxelles. — Entomologie générale.
- MIEDEL (Joseph)**, membre de la Société entomologique de France, rue Lairesse, 105, à Liège. — Coléoptères.
- MOERENHOUT (Victor)**, à Comblain-au-Pont, province de Liège. — Hyménoptères.
- MOURLON (Michel)**, docteur agrégé à la faculté des sciences de l'Université de Bruxelles, conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle, membre correspondant de l'Académie royale de Belgique, rue Belliard, 107, à Ixelles. — Entomologie générale.
- NILIS (V.)**, docteur en médecine, médecin de bataillon au 2º de ligne, à Vivi (Congo), ou aux soins de M. Delcommune, à Boma (Congo). — Entomologie générale, Névroptères.
- OBERTHUR (Ch.)**, imprimeur, faubourg de Paris, 21, à Rennes (département d'Ille-et-Vilaine, France). — Lépidoptères.
- Oberthur (René)**, imprimeur, faubourg de Paris, 20, à Rennes (Ille-et-Vilaine, France). — Coléoptères.
- ODIER (James)**, banquier, rue de la Cité, 24, à Genève. — Coléoptères.
- OLIVIER (Ernest)**, membre de la Société entomologique de France, aux Ramillons, près Moulins (Allier). — Coléoptères.
- PATERNOTTE (L.)**, rue Alphonse Vandenpeereboom, 23, à Molenbeek-Saint-Jean. — Coléoptères.
- PAULINO DE OLIVEIRA (Manoël)**, membre de la Société entomol. de France, etc., professeur à l'Université de Coïmbre (Portugal). — Coléoptères et Lépidoptères.
- PFAFF (Ernest)**, directeur de l'Usine de Corphalie, près Huy. — Coléoptères d'Europe.
- PIERRET (Émile)**, industriel à Vilvorde. — Hémiptères-Hétéroptères.
- PLATEAU (Félix)**, docteur en sciences naturelles et en sciences zoologiques, professeur de zoologie à l'Université de Gand, membre de l'Académie royale de Belgique, boulevard du Jardin Zoologique, 64, à Gand. — Entomologie générale, anatomie et physiologie, Crustacés, Myriapodes.
- PREUDHOMME DE BORRE (Alfred)**, membre de plusieurs Sociétés savantes, conservateur-secrétaire du Musée royal d'Histoire naturelle, rue de Dublin, 19, à Ixelles. — Entomologie générale, géographie entomologique, Coléoptères.
- PULS (Jacques)**, membre des Sociétés entomologiques de France, de Berlin, etc., pharmacien, place de la Calandre, 6, à Gand. — Diptères, Hyménoptères.

- P^UTON (Auguste), docteur en médecine, membre de la Société entomologique de France, à Remiremont (Vosges). — Coléoptères, Hémiptères, Hyménoptères.
- R^AGUSA (Enrico), membre de la Société entomologique italienne, etc., Hôtel des Palmes, à Palerme. — Coléoptères.
- R^EM^Y (Jules), directeur de l'Hospice des Enfants assistés, rue du Marais, à Bruxelles. — Coléoptères.
- R^ENARD (abbé Alphonse), conservateur au Musée royal d'histoire naturelle, membre correspondant de l'Académie royale de Belgique, membre de la Société belge de Microscopie, etc., avenue Brugmann, 426, à Uccle, près Bruxelles. — Micrographie entomologique.
- R^EUTER (O.-M.), professeur agrégé à l'Université d'Helsingfors, membre de diverses Sociétés savantes, Fredsgatan, 4, à Helsingfors (Finlande). — Hémiptères.
- R^ICHARD (Félix), chaussée de Tervueren, 36, à Etterbeek. — Coléoptères.
- R^OELOFS (W.), artiste peintre, chaussée de Haecht, 218, à Schaerbeek. — Coléoptères (Curculionides).
- R^OLIN (Paul), étudiant, avenue de la Toison d'Or, 67, à Saint-Gilles lez-Bruxelles. — Coléoptères.
- S^AUVIER (Jules), secrétaire général du Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique, rue Juste-Lipse, 40, à Bruxelles. — Faune entomologique de Belgique.
- S^COTT (Robert), Miller street, à Richmond (Victoria, Australie). — Coléoptères (spécialement Curculionides, Anthribides, Brenthides, Bruchides et Scolytides).
- S^EDILLOT (Maurice), avocat, membre de la Société entomologique de France, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères.
- S^ELYS-LONGCHAMPS (baron Edmond de), sénateur, membre de l'Académie royale de Belgique et de plusieurs autres Académies et Sociétés savantes, **Président d'honneur de la Société**, boulevard de la Sauvenière, 34, à Liège. — Névroptères (principalement Odonates) et Lépidoptères d'Europe.
- S^HARP (David), membre de plusieurs Sociétés savantes, à Blackley, Shirley Warren, Southampton (Angleterre). — Coléoptères.
- S^IMON (Eugène), membre de la Société entomologique de France, etc., Villa Saïd, avenue du Bois de Boulogne, 56, à Paris. — Entomologie générale, Arachnides.
- S^IMSON (Auguste), à Launceston (Tasmanie). — Coléoptères.
- S^MITH, docteur en médecine, rue de la Révolution, 15, à Bruxelles. — Entomologie générale.
- S^PANGBERG (Jacob), docteur en philosophie, professeur agrégé à l'Université, membre des Sociétés entomologiques de France, Stettin et Suisse, à Upsal (Suède). — Hémiptères, Lépidoptères et Névroptères.
- S^TAUDINGER (de Otto), Blasewitz, près Dresde (Saxe). — Lépidoptères d'Europe.
- T^EIRLINCK (G.), professeur de mathématiques et de sciences naturelles aux Écoles normales de Bruxelles, rue Saint-Joseph, 18, à Molenbeek-Saint-Jean. — Entomologie générale.
- T^HIROT (Edouard), chef de bureau à l'Administration communale de Schaerbeek, rue de l'Orient, 19, à Etterbeek. — Lépidoptères et Coléoptères.

- THIROUX (Eugène), membre de la Société royale Linnéenne, boulevard de la Senne, 101, à Bruxelles. — Insectes nuisibles ou utiles à la culture.
- TOURNIER (Henri), membre de la Société entomologique de France, villa Tournier, à Peney, près Genève. — Coléoptères.
- TRIEU DE TERDONCK (Joseph du), étudiant, rue du Poivre, 2, à Malines. — Coléoptères (Carabiques, Rhynchophores), Lépidoptères (genre *Vanessa*).
- TROOSTEMBERGH (Max de), place Saint-Jacques, 22, à Louvain. — Coléoptères.
- VAN BENEDEN (Édouard), docteur en sciences naturelles, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Université de Liège, rue des Augustins, 43, à Liège. — Entomologie générale, biologie, embryogénie, Crustacés et Annélides.
- VANDEN BRANDEN (Constant), étudiant, à Charleroi. — Coléoptères.
- VANDERKINDERE (Marcel), étudiant, rue de Livourne, 64, à Ixelles. — Coléoptères (Lamellicornes).
- VANDERNOOT (Louis), instituteur communal, rue Marcq, 1, à Bruxelles. — Coléoptères.
- VAN NEROM (Prosper), étudiant en droit, rue Saint-Guidon, 54, à Anderlecht. — Insectes utiles et nuisibles à l'agriculture.
- VAN RIEMSDIJK (H.-M.-D.), docteur en philosophie, inspecteur de l'enseignement, à Fort de Kock (Sumatra). — Lépidoptères de Sumatra.
- VAN ROSSEN (Albert), ingénieur civil des mines, rue Malibran, 45, à Ixelles. — Coléoptères (Carabides, Chrysomélides).
- VAN SEGVELT (Edmond), pharmacien, membre de la Société royale de Botanique, boulevard des Arbalétriers, 112, à Malines. — Entomologie générale, mœurs des insectes, galles et gallicoles, genre *Donacia*, Lépidoptères.
- VAN TRICHT (Rév. P. Victor), professeur de sciences naturelles à l'Institut Saint-Ignace, à Anvers. — Entomologie générale.
- VAUX (Benoît-Adolphe de), ingénieur, rue des Anges, 15, à Liège. — Lépidoptères d'Europe.
- VERDIANI-BANDI (Luigi), membre des Sociétés entomologiques d'Italie et de France, via Ricasoli, 52, à Sienne (Italie). — Coléoptères.
- VERNIEUWE (Télesphore), employé au Ministère de l'Agriculture et des Travaux publics, rue de la Ruche, 50, à Schaerbeek. — Entomologie générale.
- WEINMANN (Rodolphe), industriel, rue Berckmans, 36, à Saint-Gilles lez-Bruxelles, — Lépidoptères d'Europe, Lycénides européens et exotiques.
- WEYERS (Joseph-Léopold), membre de diverses Sociétés savantes, à Padang (Sumatra), et rue Joseph II, 35, à Bruxelles. — Coléoptères (Buprestides).
- WILLAIN (D.), instituteur communal et géomètre juré à Trivières, près Bracquegnies (Hainaut.) — Entomologie générale, Coléoptères.
- WILLEMS (Albert), rue du Persil, 48⁴, à Bruges. — Coléoptères et Lépidoptères.

Membres honoraires.**MM.**

- BURMEISTER (Herm.), directeur du Musée public d'Histoire naturelle, membre de diverses Sociétés savantes, à Buenos-Ayres.
- DOHRN (C.-A.), président de la Société entomologique de Stettin, etc., Lindenstrasse, 22, à Stettin (Prusse).
- FAIRMAIRE (Léon), membre des Sociétés entomologiques de France, de Stettin et de Berlin, d'Histoire naturelle de Maine-et-Loire et de Savoie, zoologique et botanique de Vienne, et royale d'Édimbourg, licencié en droit, rue du Bac, 94, à Paris.
- HAGEN (Herman-Auguste), docteur à l'Université de Cambridge, État de Massachusetts (États-Unis de l'Amérique du Nord).
- HAROLD (baron Edgar von), membre de diverses Sociétés savantes, Barerstrasse, 56, à Munich.
- KRAATZ (G.), docteur en philosophie, président de la Société entomologique d'Allemagne, membre honoraire de diverses Sociétés entomologiques, Linkstrasse, 28, W, à Berlin.
- MAC LACHLAN (Robert), membre des Sociétés Royale, Linnéenne et Entomologique de Londres, etc., Westview, Clarendon Road, Lewisham, SE, London.
- MILLIÈRE (Pierre), membre de la Société entomologique de France, villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Maritimes).
- OSTEN-SACKEN (baron Ch.-R.), membre du corps diplomatique de Russie, etc., Maison Mai, Wredeplatz, à Heidelberg.
- SAUSSURE (Henri de), membre de diverses Sociétés savantes, Cité, 24, à Genève.
- STANTON (H.-T.), membre de la Société entomologique de Londres, etc., Mountsfield, Lewisham, SE, London.
- WESTWOOD (John-Obadiah), président d'honneur de la Société Entomologique de Londres, membre de diverses Sociétés savantes, professeur de zoologie à l'Université, Walton Manor, à Oxford.

Membres correspondants.**MM.**

- GOBANZ (Joseph), docteur, inspecteur de l'enseignement primaire à Klagenfurt (Carinthie).
- KÖPPEN (Fr.-Th.), employé au ministère, Grande Morskaya, 24, à St-Pétersbourg.
- MARSEUL (abbé S.-A. de), membre de diverses Sociétés savantes, boulevard Pereire, 271 (porte Maillot), Ternes, à Paris.
- PACKARD (Dr A.-S.), professeur de zoologie et de géologie, Bronn University, Providence, Rhode-Island (États-Unis).
- PALLANDT (baron Henri de), Oranje straat, 4, à La Haye.
- PEREZ ARCAS (Laureano), professeur de zoologie à l'Université, membre de l'Académie royale des sciences, calle de las Huertas, 44, à Madrid.
- ROGENHOFER (Moi), conservateur au Musée impérial d'Histoire naturelle de Vienne, secrétaire de la Soc. Imp. et R. Zoolog.-Botan., Josefstädterstrasse, 49, à Vienne.
- SCUDDER (Samuel), bibliothécaire adjoint au Harvard College, à Cambridge, Massachusetts (États-Unis de l'Amérique du Nord).

Membres associés.**MM.**

- BARLET (Émile), étudiant, rue Regnier, 46, à Liège. — Lépidoptères de Belgique.
- CANDÈZE (Léon), étudiant, à Glain, près Liège. — Lépidoptères, spécialement Bombycides.
- CARION (François), étudiant, rue Linnée, 77, à Saint-Josse-ten-Noode. — Entomologie générale.
- CLUYSENAAR (Pierre-Gustave), professeur à l'école normale de Huy, à Statte, près Huy. — Entomologie générale.
- COYON (A.), professeur à l'athénée royal, à Dinant. — Entomologie générale.
- DE GLAIN (Paul), étudiant, rue Godecharles, 14, à Ixelles. — Coléoptères.
- DEGOUVE DE NUNCQUES (William), élève architecte, Petite rue de la Concorde, 14, à Ixelles. — Entomologie générale.
- DEMOOR (J.), étudiant, chaussée Saint-Pierre, 225, à Etterbeek. — Coléoptères.
- DE RAECK (Léon), étudiant, avenue d'Auderghem, 215, à Etterbeek. — Coléoptères et Lépidoptères.
- DUCARME (Aimé), professeur à l'école moyenne de Thuin (Hainaut). — Entomologie générale.
- ENGELMANN (Paul), instituteur à l'école moyenne de Huy. — Entomologie générale.
- KRAUS (Mathias), instituteur communal, rue d'Arlon, à Luxembourg. — Entomologie générale.
- MEUNIER (Fernand), étudiant, rue Berckmans, 93, à Saint-Gilles. — Entomologie générale, Lépidoptères, Coléoptères.
- PUTZEYS (Silvère), étudiant, rue des Champs-Élysées, 34, à Ixelles. — Coléoptères.
- ROBIE (François), instituteur communal, président de l'Union agricole et horticole de Forest et du Cercle pédagogique de Bruxelles, à Forest, près Bruxelles. — Entomologie générale.
- SCHAMBERGER (Pierre), attaché à l'athénée royal, rue de l'Agneau, 10, à Anvers. — Entomologie générale.
- SIGUET (Jean-Michel), instituteur à l'école moyenne de Huy. — Entomologie générale.
- VAN BEVER (Alfred), étudiant, rue Léopold, 71, à Malines. — Coléoptères.
- VAN DER HART (Maurice), étudiant, boulevard du Hainaut, 56, à Bruxelles. — Entomologie générale.
- VANDERVELDE (Paul), étudiant, rue du Prince-Royal, 72, à Ixelles. — Coléoptères.

Membres décédés.**MM.**

- CHEVROLAT (Auguste), à Paris (membre effectif).
- FINEZ (Jules), à Douzies, près Maubeuge (membre effectif).
- LE COMTE (Théophile), à Lessines (membre effectif).
- MORS (Louis), à Paris (membre effectif et fondateur).
- SAUNDERS (sir Sidney Smith), à Londres (membre effectif).



ORGANISATION ADMINISTRATIVE

POUR L'ANNÉE SOCIALE 1884.

Conseil d'administration.

MM. DE SELYS-LONGCHAMPS, *président*.

WEINMANN, *vice-président*.

PREUDHOMME DE BORRE, *secrétaire et bibliothécaire*.

FOLOGNE, *trésorier*.

CAPRONNIER.

LALLEMAND, *secrétaire-adjoint*.

ROELOFS.

Commission de vérification des comptes.

MM. FONDU.

KERREMANS.

MÉLISE.

Commission de surveillance des collections.

MM. DE SELYS-LONGCHAMPS, *président*.

JACOBS.

ROELOFS.

TABLE DES COMPTES-RENDUS



	Pages.
Séance du 5 janvier 1884.	V
(Description de deux espèces nouvelles de Gomphines orientales. — M. Mac Lachlan.) (Diagnose d'un nouveau <i>Macrogomphus</i>. — M. de Selys-Longchamps.) (Note sur les Glomérides de la Belgique. — M. Preudhomme de Borre), avec 2 figures. (Tenthredînes, Céphides et Siricides des environs de Bruxelles, avec nom et description de quelques espèces des genres <i>Blennocampa</i> Hartig, <i>Nematus</i> Jurine, <i>Cephus</i> Latr. et <i>Phyllæcus</i> Newman, dénommées par feu le professeur Wesmael. — M. Jacobs.) (Observations synonymiques et autres relatives à des Psychides, avec description de <i>novæ species</i>. — M. Heylaerts.) (Description de deux Bombycides exotiques nouvelles. — M. Heylaerts.) (Sur un ouvrage de don A. Nunez Ortega : <i>Apuntes historicos sobre el cultivo de la seda en Mexico</i>. — M. Preudhomme de Borre.) (Note relative au mémoire de D. A. Nunez Ortega sur la sériciculture mexicaine. — M. Donner.) (Sur la <i>Cicindela maritima</i> Dejean et la variété <i>maritima</i> de la <i>Cicindela hybrida</i> L. — MM. Weyers et Preudhomme de Borre.)	
Séance du 2 février 1884	LVII
(Descriptions de Coléoptères recueillis par le baron Bonnaire en Algérie. — M. Fairmaire.) (Diagnoses de Coléoptères de l'Afrique orientale. — M. Fairmaire.) (Notes on the nomenclature of New Zealand Lucanidæ. — M. Sharp.) (Seconde note sur l'identité de l'<i>Erionispa Badeni</i> Chap. et du <i>Pytheus pulcherrimus</i> Pasc. — M. Lameere.) (Observations faites pendant un voyage le long de la côte orientale de l'Amérique du Sud. — M. Fromont.)	

Séance du 1^{er} mars 1884

- (Les Psychides de la Hollande et de la Belgique. — M. Heylaerts.)
- (Notes synonymiques relatives à des Psychides. — M. Heylaerts.)
- (Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle appartenant aux Cossina H.-S. — M. Heylaerts), avec 1 figure.
- (*Labedera Staudingeri* n. sp. — M. Heylaerts.)
- (Le fourreau, la chrysalide du mâle et la femelle de l'*Animula dichroa* H.-S. — M. Heylaerts.)
- (Fourreau inédit et chenille de Psychide de l'Afrique méridionale. *Eumeta? Zelleri* m. — M. Heylaerts.)
- (*Danaïs Chrysippus* L. var. *Vigellii* m. — M. Heylaerts.)
- (Quatre espèces nouvelles de Psychides de la République Argentine, par M. Weyenberg. — M. Heylaerts.)
- (Psychide nouvelle de l'Amérique septentrionale. — M. Heylaerts.)
- (Observations sur les Orthoptères d'Europe et du bassin de la Méditerranée, et description de cinq espèces nouvelles. — M. Bolivar.)
- (Some observations on *Hypocephalus armatus*. — M. Sharp.)
- (Premier supplément aux Tenthredines, Céphides et Siricides des environs de Bruxelles. — M. Jacobs.)
- (Anomalies dans les nervulations des ailes chez deux Hyménoptères. — M. Jacobs), avec 3 figures.
- (Note sur les Hémiptères du Haut-Balkan et de la Dobroudja. — M. de Horvath.)
- (Description de Coléoptères nouveaux du Maroc. — M. Fairmaire.)
- (Diagnoses de Coléoptères de l'Afrique orientale (suite). — M. Fairmaire.)
- (Types de Boisduval et espèces rares de la collection de Papilionides du Musée Royal de Belgique. — M. Preudhomme de Borre.)
- (Hémiptères nouveaux pour la Faune belge. — M. Lethierry.)
- (Les genres *Cylindrogaster* Fauvel et *Sphingnotus* Fairmaire faisant double emploi avec les genres *Cylindrogaster* Stål et *Sphingnotus* Fieber. — M. de Bormans.)

Séance du 5 avril 1884.

CXXIX

- (Description de quelques Phytophages nouveaux. — M. Duvivier.)
- (Description de quelques Arachnides des genres *Miltia* E. S. et *Zimiris* E. S. — M. Simon.)

- (Diagnoses de Coléoptères de l'Afrique orientale (suite). — M. Fairmaire.)
 (Note synonymique : *Psychoglene basinigra* Feld. = ? *Animula dimidiata* Heyl. — M. Heylaerts.)
 (La chenille de l'*Æcophora flavifrontella* Hüb. — M. Heylaerts.)
 (Errata relatifs à la *Romanoffia imperialis*. — M. Heylaerts), avec 1 figure.
 (Nouveaux cas de larves d'OEstrides d'Amérique dans le corps de l'homme, observés en Europe. — M. Jacobs.)
 (Phytophages recueillis par M. le Dr Edm. Fromont dans le Brésil et la Plata en 1883. — MM. H. Donckier de Donceel, Lefèvre et Duvivier.)
 (Lettre relative aux excès dans les changements de noms. — M. Puton.)

Séance du 3 mai 1884

CLXI

- (Description d'un Coléoptère nouveau du Chili. — M. Belon.)
 (A propos de la lettre de M. Puton. — M. Kerremans.)
 (De la validité spécifique des *Gyrinus colymbus* Er., *distinctus* Aubé, *caspicus* Ménétrics, *libanus* Aubé et *Suffriani* Scriba. — M. Preudhomme de Borre.)
 (Monstruosité observée chez un *Carabus auratus*. — M. Preudhomme de Borre.)
 (Note sur l'élevage des larves de Longicornes et autres xylophages. — M. Fromont.)
 (Note sur les mœurs du *Prionus coriarius*. — M. Fromont.)
 (Monstruosité observée chez un *Aromia moschata*. — M. Lameere), avec 1 figure.
 (Note sur les Orthoptères recueillis par M. Weyers à Aguilas, province de Murcie (Espagne). — M. de Bormans.)
 (Anomalie observée chez la variété *confluens* du *Polyommatus Hippothoe*. — M. Van Segvelt.)

Séance du 7 juin 1884.

CLXXXIV

- (Descriptions de Lépidoptères exotiques. — M. Mabille.)
 (Note sur quelques espèces du genre *Cartodere* Thoms. — M. Belon.)
 (Description de quatre genres nouveaux et de plusieurs espèces nouvelles de Coléoptères de la famille des Eumolpides. — M. Lefèvre.)
 (Buprestides recueillis en Espagne par M. Weyers. — M. Kerremans.)
 (Longicornes recueillis en Espagne par M. Weyers. — M. Lameere.)

- (Chrysomélides recueillis en Espagne par M. Weyers. — M. H. Donckier de Donceel.)
 (Remarques psychidologiques. — M. Heylaerts.)
 (Description d'une nouvelle espèce de Psychide des États-Unis de l'Amérique septentrionale. — M. Heylaerts.)
 Sur deux excursions à Calmthout et sur l'excursion de la Société à Arlon. — M. Preudhomme de Borre.)

Séance du 5 juillet 1884

CCXV

- (Sur un petit groupe de *Corticaria* propres à la Nouvelle-Zélande. — M. Belon.)
 (Notes synonymiques sur quelques Lathridiidae de la Nouvelle-Zélande. — M. Belon.)
 (Sur un *Metopthalmus* de la Nouvelle-Zélande. — M. Belon.)
 (Note sur le groupe des Diolenii (famille des Attidae) et descriptions d'espèces nouvelles. — M. Simon.)
 (Note sur les Arachnides recueillis par M. Weyers à Aguilas, province de Murcie. — M. Simon.)
 (Appréciation d'ouvrages sur les Lépidoptères. — M. Heylaerts.)
 (Anomalies chez un *Syrphus ribesii* ♀. — M. Jacobs), avec 1 figure.
 (Anomalies chez un *Carabus auratus*. — M. Preudhomme de Borre.)

Séance du 2 août 1884.

CCXLI

- (Note sur les Julides de la Belgique. — M. Preudhomme de Borre.)
 (Description d'une espèce nouvelle du genre *Julus*. — M. Latzel), avec 1 figure.
 (Note sur l'*Hypocephalus armatus*. — M. Sharp, trad. par M. Lameere.)
 (OEdémérides recueillis en Portugal et au Maroc par feu C. Van Volxem, déterminés par M. Fl. Baudi. — M. H. Donckier de Donceel.)
 (Cryptocéphalides recueillis au Brésil et à La Plata par feu C. Van Volxem, déterminés par M. G. Tappes. — M. H. Donckier de Donceel.)
 (Cryptocéphalides recueillis en Portugal et au Maroc par feu C. Van Volxem. — M. H. Donckier de Donceel.)
 (Description d'un Cryptocéphale nouveau d'Arabie. — M. Tappes), avec 1 figure.
 (Liste des Hémiptères trouvés à Aguilas (Espagne) par M. Weyers. — M. Lethierry.)

- (Hémiptères nouveaux pour la faune belge, ou dont la localité n'a pas encore été précisée. — M. Lethierry.)
 (Sur deux Crustacés recueillis en 1883 dans l'île de Chypre par M. Julien Deby. — M. Plateau.)
 (Note sur des Crustacés et des Myriapodes recueillis par M. Weyers aux environs d'Aguilas (sud-ouest de Carthagène), Espagne. — M. Plateau.)

Séance du 6 septembre 1884. CCLXIII

- (Note sur l'*Hypocephalus armatus*. — M. Lameere), avec 3 figures.
 (Sur la *Cicindela maritima*. — M. Dietz.)
 (Note sur quelques Odonates. — M. de Bormans.)
 (Note nécrologique sur le Dr Arn. Færster. — M. Van Segvelt.)
 (Sur une deuxième génération de l'*Acronycta Psi* et sur un exemplaire non caudé de la variété *Eleus* du *Polyommatus Phlœas*. — Van Segvelt.)
 (Description de cinq espèces nouvelles de Phytophages. — M. Lefèvre.)
 (Formicides recueillies à Aguilas par M. Weyers. — M. Ern. André.)
 (Revendication de priorité de l'explication du vol apparent des araignées. — M. Dugès.)
 (Catalogue des Arachnides de Belgique. Cinquième partie. — M. Becker.)

Séance du 4 octobre 1884. CCLXXXVII

- (Quelques Diptères exotiques. — M. van der Wulp), avec 3 figures.
 (Description d'une nouvelle famille de l'ordre des Araneæ (Bradystichidæ). — M. Simon.)
 (Description d'une espèce nouvelle du genre *Cryptothela* L. Koch. — M. Simon.)
 (Note synonymique sur les genres *Prodidomus* Hentz et *Miltia* E. Simon. — M. Simon.)
 (Liste des Brenthides décrits postérieurement au catalogue de MM. Gemminger et von Harold. — M. H. Donckier de Donceel.)
 (Description de quelques Phytophages nouveaux et notes rectificatives. — M. Duvivier.)
 (Longicornes capturés aux États-Unis par le Dr E. Fromont. — M. Lameere.)

Séance du 8 novembre 1884	CCXXIII
-------------------------------------	---------

(Liste des Anthribides décrits postérieurement au catalogue de MM. Gemminger et von Harold. — M. H. Donckier de Donceel.)

(Sur la liqueur de Wickersheimer. — M. Kerremans.)

(Lettre écrite de Sumatra. — M. Weyers.)

(Les premières chasses de M. Weyers à Sumatra. — M. Candèze.)

(Lépidoptères récoltés par M. Weyers à Sumatra, à Fort de Kock, etc. — M. Lamarche.)

Séance du 6 décembre 1884	CCXXLIII
-------------------------------------	----------

(Diagnoses de Coléoptères de l'Afrique orientale. — M. Fairmaire.)

Assemblée générale du 26 décembre 1884	CCXXLIX
--	---------

Ouvrages reçus pour la bibliothèque de la Société, du 1^{er} décembre 1883 au 30 novembre 1884 :

Dons des auteurs	CCCLIX
Divers dons.	CCCLXXI
Acquis sur le crédit voté par l'assemblée générale du 26 décembre 1883	CCCLXXII

Liste des membres de la Société	CCCLXXIII
---	-----------

Organisation administrative en 1884	CCCLXXXIII
---	------------

Table des comptes-rendus	CCCLXXXV
------------------------------------	----------





3 2044 106 291 636

Date Due

JUN 28 1956

